

입상수화제 **new**

# 인섹타

유효성분 및 함량	플로니카미드 10%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	100g × 100병 / 박스 250g × 40병 / 박스
작용기작 코드	29

## 제품특징

01

### 저항성 진딧물에 효과적입니다

진딧물의 구침을 마비시켜 섭식을 억제하는 작용 기작으로 기존 살충제에 저항성이 생긴 포장에도 작물 피해가 줄어듭니다.

02

### 약효가 오래 지속됩니다

작물체 내로 빠르게 침투하여 약효를 나타내며, 오래 기간동안 지속됩니다.

03

### 꿀벌에 안전성이 높습니다

작물의 개화기에도 살포 가능하며, 천적 및 유용곤충에 대한 영향이 없습니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	복숭아혹진딧물	다발생기경엽처리	10g	수확 3일 전	2회이내
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	싸리수염진딧물			수확 14일 전	
고추 (단고추류포함)	목화진딧물		6.7g	수확 2일 전	3회이내
	복숭아혹진딧물			수확 7일 전	1회이내
고추(잎)	목화진딧물	10g	수확 14일 전		2회이내
근대	복숭아혹진딧물			다발생기경엽처리	수확 3일 전
금감(금굴)	조팝나무진딧물	6.7g	수확 7일 전		
녹색꽃양배추 (브로콜리)	무테두리진딧물			다발생기경엽처리	수확 3일 전
	복숭아혹진딧물				
단호박	진딧물	다발생기경엽처리	6.7g	수확 3일 전	3회이내
당귀(잎, 뿌리)	목화진딧물				



주요 병충해



고추 복숭아혹진딧물



사과 조팝나무진딧물

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
당귀(잎, 뿌리)	복숭아혹진딧물	다발생기경엽처리	10g	수확7일 전	2회이내	
당근	목화진딧물		6.7g	수확 21일 전		
돌나물	복숭아혹진딧물		10g	10g	수확 7일 전	1회이내
들깨(잎)					수확 30일 전	2회이내
레몬(라임포함)	조팝나무진딧물				수확 14일 전	
매실					수확 7일 전	
머위	복숭아혹진딧물				수확 21일 전	3회이내
모과	조팝나무진딧물				수확 7일 전	2회이내
무	복숭아혹진딧물				수확 5일 전	1회이내
무화과	목화진딧물				수확 7일 전	
복분자(라즈베리)		다발생기경엽처리			수확 7일 전	2회이내
블루베리	담배가루이	발생초기7일간격경엽처리			6.7g	수확14일 전
	조팝나무진딧물	다발생기경엽처리				
비름	아카시아진딧물		10g	10g	수확 21일 전	2회이내
사과	사과혹진딧물					
	조팝나무진딧물					
상추	복숭아혹진딧물		10g	10g	수확 21일 전	2회이내
석류	목화진딧물					
	석류가루이		발생초기7일간격경엽처리			

# 인섹타 입상수화제

## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
순무	복숭아혹진딧물	다발생기경엽처리	10g	수확 21일 전	2회이내
순무양배추(콜라비)				수확 7일 전	
시금치				수확 14일 전	
숙갓	목화진딧물		6.7g	수확 7일 전	
아스파라거스	복숭아혹진딧물		10g		
아욱	목화진딧물		6.7g		
양미나리(셀러리)	복숭아혹진딧물		10g	수확 14일 전	
양앵두(체리)	미국선녀벌레				
어수리	어수리쌍꼬리진딧물				
옥수수	보리수염진딧물		6.7g	수확 21일 전	
용과	목화진딧물				
우엉	복숭아혹진딧물				
유자	조팝나무진딧물		10g	수확 30일 전	
유채	복숭아혹진딧물				
차즈기	목화진딧물				
참나물 (파드득나물포함)	복숭아혹진딧물	다발생기경엽처리	6.7g	수확 14일 전	
치커리					
케일					
토란	목화진딧물	10g	수확 7일 전		
토란	복숭아혹진딧물	6.7g			
토란	복숭아혹진딧물	10g			
파세리(향미나리)	목화진딧물	6.7g	수확 3일 전		
호박	복숭아혹진딧물	10g		3회이내	



**사용상  
주의사항**

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 아다마코리아(주)에서 제 공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 살포전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.
3. 꿀벌은 습도가 높은 경우 활동성이 떨어지므로, 꿀벌과 동시에 사용할 경우에는 환 기 후 습도가 낮아진 후에 사용하는 것이 좋습니다.
4. 이 농약은 처리 직후 해충의 흡즙활동이 중단되나 치사되기까지는 다소 시간이 걸 릴 수 있으므로 중복살포하지 않도록 주의하여 주십시오.