



유제

론400

경제적인 일년생 논 잡초 방제제

유효성분 및 함량	옥사디아존 12%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	400ml × 30병/박스
제 조 원	아다마코리아(주)
작용기작 코드	E

| 제품특징

01

일년생잡초 방제와 다년생 잡초의 발생을 억제하는 효과가 있습니다.

02

따로 희석할 필요 없이 원액을 그대로 논에 살포하므로 노동력이 절감됩니다.

| 사용방법

1. 썩레질로 논 지면을 잘 고른 직후 흙탕물 상태에서 원액을 살포하고 반드시 정지판 작업을 하여 주십시오.
2. 반드시 논 지면의 흙이 물 위로 보이지 않는 상태의 수심을 유지하고 살포하십시오.
3. 약제 살포는 병 밑 오목한 부분을 손으로 쥐어 잡고 살포 폭을 10m 정도로 하여 걸어가면서 5~6보마다 좌우로 한번씩 휘둘러 뿌리십시오.
4. 정지작업을 균일하게 하고, 약제 살포 후 최소한 2일 이후에 이앙해야 하며, 이앙 후에는 벼 엽신이 물에 잠기면 약해 우려가 있으므로 반드시 논물을 얇게(벼 엽신이 물에 잠기지 않는 3cm 정도) 유지 하십시오.
5. 논 지면이 고르지 못한 경우에는 바람에 약액이 몰릴 염려가 있으니 중앙부에 간이 논둑을 설치하여 사용하십시오.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용량
기계이앙벼 (중묘)	일년생잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 가막사리)	썩레질직후부터 이앙 2일전까지 원액 수면점적처리	원액 400ml



**사용상
주의사항**

1. 모래땅, 물 빠짐이 심한 논, 가스 발생 논, 침수우려가 있는 논, 염해지에는 사용하지 마십시오.
2. 병에 걸린 모, 병해를 받은 모 또는 생육이 극히 불량한 모가 이앙될 논에는 사용하지 마십시오.
3. 논 바닥이 고르지 못하여 일부는 논 바닥이 보이고 일부는 모가 물 속에 잠기는 등 물 관리가 어려운 논에는 사용하지 마십시오.
4. 심한 바람이 불 때는 사용을 피하시고 약액이 바람에 날리거나 물의 흐름에 따라 한 곳으로 몰리지 않도록 주의 하십시오.
5. 모내기 후 비가 오거나 물 관리 부주의 등으로 모가 절반 이상 물에 잠길 경우에는 약해의 우려가 있으니 발견 즉시 1~2cm정도까지 물을 빼 주십시오.
6. 살포 초기 엽초에 약반이 나타나는 경우가 있으나 생육이 진전됨에 따라 회복되어 생육 및 수량에는 영향이 없습니다.
7. 이 약제는 쓰레질 할 때 사용하는 토양처리형 제초제로서 반드시 이앙 2일 이전에 사용해야 작물에 안전 합니다.
8. 이 약제는 중묘기계이앙벼에 사용하도록 되어 있는 약제로서 어린모에 사용할 경우에는 약해의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.