



살균제

# 두아졸 유제

유효성분 및 함량	프로클로라즈 25%
	테부코나졸 12.5%
독성구분	저독성/어독성 Ⅲ급
포장단위	100ml × 50병/박스 250ml × 40병/박스
제 조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	서1

두아졸 유제로  
더욱 좋아진 잇점을  
누리 보세요



## 01 효과가 좋습니다

왜냐하면 침투 이행성 전문 살균제인 이미다졸계와 트리아졸계의 대표적인 두성분간의 혼합제로 예방 및 치료효과가 더욱 강화된 새로운 제품 입니다.

## 02 벼 종자소독에도 등록되었습니다

벼 종자소독용으로 사용하여 도열병, 키다리병, 깨씨무늬병의 예방이 가능하며, 벼 생육기에 살포하면 생장기 주요 병해인 세균성벼알마름병, 잎집무늬마름병, 이삭누룩병에도 우수한 방제 효과를 나타냅니다.

## 03 강력합니다

탄저병 전문 약제인 프로클로라즈의 혼합으로 효과가 더욱 강화 되었습니다. 유제형으로서 살포된 약액이 작물에 골고루 묻게 되므로 더 우수한 방제효과를 나타냅니다.



# 두아졸 유제는? 보다 강력한 효과! 보다 광범위한 적용병해!

## 적용대상 및 사용량



작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추(단고추류포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	3회 이내
미늘	잎마름병			수확 14일 전까지	4회 이내
벼	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기 경엽처리		수확 40일 전까지	3회 이내
	세균성벼알마름병	출수직전부터 7일간격 경엽처리			
	이삭누룩병	출수7일전 7일간격 경엽처리			
	종자소독	침종전 24시간 침지처리			
수박(복수박포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
잔디	라이족토티아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리		-	-
	동전마름병	발병초 10일간격 토양관주처리			
	갈색잎마름병	발병초 7일간격 토양관주처리			
파(쪽파포함)	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 14일 전까지	3회 이내	

## 처리/무처리구 비교

고추 탄저병 처리방법	무처리구		처리구	
			발병초 10일 간격 2,000배 희석살포	
수박 탄저병 처리방법	무처리구		처리구	
			발병초 10일 간격 2,000배 희석살포	


## 사용상 주의사항

- 고농도로 살포시 작물의 생육 억제 및 어린 잎에 엽소 현상을 일으키는 경우가 있으니 반드시 희석배수 및 사용량을 지켜 사용하십시오.
- 수박 신초의 절간장 생육을 3~4일 간 지연시킬 수 있으니 주의하여 사용하십시오.
- 수박 이외의 박과 작물(오이, 참외, 호박 등)에는 약해 우려가 있으니 살포시 약액이 바람에 날려 박과 작물에 묻지 않도록 주의 하십시오.



DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE  
 DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE DUAZOLE

### ☉ 벼 종자소독 방법

처리방법	세부방법	주의사항
	<b>종자준비</b> · 선별이 끝난 마른 종자를 준비합니다.	
	<b>볍씨의 침지처리</b> · 두아졸 유제를 2,000배로 희석한 약액 50ℓ에 준비된 볍씨 40kg을 24시간 동안 담가 주십시오. · 약액의 온도를 10~30℃ 사이가 되도록 유지하십시오.	2,000배액은 물 50ℓ와 두아졸 25ml를 희석하면 됩니다. 볍씨 싹이 틀 수 있게 침지시간 및 약액 온도를 준수하십시오. 또한 볍씨가 충분히 잠기도록 주의하십시오.
	<b>볍씨의 세척(수세)</b> · 24시간 동안 담근 후 맑은 물로 2회 볍씨를 세척하십시오.	세척하지 않을 경우 발아율 저하의 원인이 될 수 있으므로 반드시 2회 이상 맑은 물로 세척하십시오.
	<b>볍씨의 발아</b> · 발아 전용기를 사용하여 충분히 싹트게 하십시오(최저 온도 20℃ 이상 유지). · 전용 발아가 없는 경우, 농가 관행 방법으로 충분히 싹트게 하십시오.	완전 밀봉하여 싹 틔우기를 하면 발아율이 저하될 수 있으므로 완전 밀봉은 하지 마십시오. 볍씨 전용발아기 사용을 권장합니다.
	<b>볍씨의 파종</b> · 충분히 싹이 튼 후 육묘상자에 파종(또는 직파) 하십시오.	볍씨가 충분히 발아된 것을 확인 후 파종하십시오.

### ☉ 고추 혼용자료 (단고추류 포함)

살균제	살충제
메가폰(입상), 포룸(수), 델란(수), 미리카트(액상), 미라도(액상), 앙콜(수), 벨쿠트(수), 텔도(수)	라이몬(액상), 데시스(유), 매치(유), 코니도(수), 에이팜(유), 빅카드(액상)

### ☉ 수박 혼용자료 (복수박 포함)

살균제	살충제
균자비(수), 다이센엠45(수), 미리카트(액상), 미라도(액상), 비온엠(수), 벨쿠트(수), 안트라콜(수), 에이플(입상)	부메랑(액상), 모스피란(수), 스투어드골드(액상), 코니도(수), 아타라(입상), 빅카드(액상)