

수도 초기 제초제 **론400** 유제

유효성분 및 함량	옥사디아존 12%
독성구분	저독성/어독성 Ⅲ 급
포장단위	400mℓ × 30병/박스
제 조 원	아다마코리아(주)
작용기작 코드	E



경제적인 일년생
논 잡초 방제제

특징

1. 일년생잡초 방제와 다년생 잡초의 발생을 억제하는 효과가 있습니다.
2. 따로 희석할 필요 없이 원액을 그대로 논에 살포하므로 노동력이 절감됩니다.

적용대상 및 사용량

작물	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용량
기계이앙벼 (중묘)	일년생잡초 (피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌비늘, 가막사리)	씨레질직후부터 이앙 2일전까지 원액 수면점적처리	원액 400mℓ

RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400
 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400
 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400
 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400
 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400 RON400

RON400

론 400 유제

● 사용방법

1. 씨레질로 논 지면을 잘 고른 직후 흙탕물 상태에서 원액을 살포하고 반드시 정지판 작업을 하여 주십시오.
2. 반드시 논 지면의 흙이 물 위로 보이지 않는 상태의 수심을 유지하고 살포하십시오.
3. 약제 살포는 병 밑 오목한 부분을 손으로 쥐어 잡고 살포 폭을 10m 정도로 하여 걸어가면서 5~6보마다 좌우로 한번씩 휘둘러 뿌리십시오.
4. 정지작업을 균일하게 하고, 약제 살포 후 최소한 2일 이후에 이앙해야 하며, 이앙 후에는 벼 엽신이 물에 잠기면 약해 우려가 있으므로 반드시 논물을 얹게(벼 엽신이 물에 잠기지 않는 3cm 정도) 유지 하십시오.
5. 논 지면이 고르지 못한 경우에는 바람에 약액이 물릴 염려가 있으니 중앙부에 간이 논둑을 설치하여 사용 하십시오.

● 논 잡초의 체계적인 방제방법

다년생 잡초가 많거나, 저항성 잡초가 발생하는 논에는 론400유제를 처리하고 이앙 30일 후에 밭사그란엠60액제를 2차 처리 하십시오.

● 주의 사항

1. 모래땅, 물 빠짐이 심한 논, 가스 발생 논, 침수우려가 있는 논, 염해지에는 사용하지 마십시오.
2. 병에 걸린 모, 병해를 받은 모 또는 생육이 극히 불량한 모가 이앙될 논에는 사용하지 마십시오.
3. 논 바닥이 고르지 못하여 일부는 논 바닥이 보이고 일부는 모가 물 속에 잠기는 등 물 관리가 어려운 논에는 사용하지 마십시오.
4. 심한 바람이 불 때는 사용을 피하시고 약액이 바람에 날리거나 물의 흐름에 따라 한곳으로 몰리지 않도록 주의 하십시오.
5. 모내기 후 비가 오거나 물 관리 부주의 등으로 모가 절반 이상 물에 잠길 경우에는 약해의 우려가 있으니 발견 즉시 1~2cm정도까지 물을 빼 주십시오.
6. 살포 초기 엽초에 약반이 나타나는 경우가 있으나 생육이 진전됨에 따라 회복되어 생육 및 수량에는 영향이 없습니다.
7. 이 약제는 씨레질 할 때 사용하는 토양처리형 제초제로서 반드시 이앙 2일 이전에 사용해야 작물에 안전 합니다.
8. 이 약제는 중묘기계이앙벼에 사용하도록 되어 있는 약제로서 어린모에 사용할 경우에는 약해의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.