



살균제

머판

입상수화제

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 유효성분 및 함량 | 캡탄 80% |
| 독성구분 | 저독성 / 어독성 I 급 |
| 포장단위 | 200g × 50봉/박스 500g × 40봉/박스 |
| 제조사 | 아다마 막테심(이스라엘) |
| 작용기작 코드 | 카 |

머판 입상수화제의
제품에 대한
확실성은
의심할 필요가
없습니다



01 효과 우수한 보호살균제 입니다.

아다마에서 캡탄 원제 생산부터 머판 완제까지 만들어 효과가 우수하며 저항성 관리에 꼭 필요한 약제 입니다.

02 사용 편리

입상수화제 제형으로 수화제 타입 제품대비 분진등이 적어 사용이 편리 합니다.

03 약혼이 적습니다.

입상수화제 제형 및 높은 희석배수(20mL)로 기존 제품 대비 약혼이 적습니다.

MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN
 MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN

MERPAN


머판
 인산수화제

적용대상 및 사용량

| 작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물20ℓ(1말)당 사용약량 | 안전사용기준 | |
|--------------|--------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | | 사용시기 | 사용횟수 |
| 감(단감포함) | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 20g | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 고추(단고추류포함) | | 발병초 10일간격 경엽처리 | | 수확 3일 전까지 | |
| 딸기(육묘상) | | 발병초 7일간격 경엽처리 | | 수확 3일전 | 2회 이내 |
| 마늘 | 잎마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
| 배 | 검은별무늬병 | | | 수확 14일 전까지 | |
| 보리 | 붉은곰팡이병 | 출수기 및 개화기 경엽처리 | | 수확 21일 전까지 | 4회 이내 |
| 복숭아 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | | | |
| 사과 | | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | | | |
| | 검무늬썩음병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | | | |
| | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | | | |
| 갈색무늬병 | | | | | |
| 양파 | 노균병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 인삼 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 30일전 | | |
| 토마토(방울토마토포함) | 잎곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 수확 3일전 | | |
| 포도 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 21일 전까지 | | |

특징

- 머판은 병원균의 포자를 직접 관통하여 사멸 시킵니다.
- 머판은 티올(-SH)그룹의 단백질 합성과 화학적 공정을 억제하여 병원균의 세포 증식을 억제 합니다.



MERPAN

M
E
M
E
M
M
M



🔴 사과 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|---|---|
| 가벤다(수), 다이센엠45(수), 다코닐(수), 로브랄(수), 바리톤(수), 바이코(수), 벨쿠트(수), 싱그롱(액상), 안트라콜(수), 엄지(수), 적토마(수), 지오판(수), 카스텔란(수), 파리사드(액상), 포리옥신(수), 헥사코니졸(액상), 휘나리(유) | 구사치온(수), 나크(수), 더스반(수), 데시스(유), 리무진(캡슐), 무쇠팔(수), 비락탄(액상), 빅카드(액상), 살비왕(액상), 섹큐어(액상), 송골매(수), 스타터(수), 아타리(입상), 올스타(유), 침병(유), 청실홍실(수), 코니도(수), 톱단(유), 트레본(수), 프리트란(수), 하이메트릭스(유) |

🔴 복숭아 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|---|---|
| 나티보(액상), 부라마이신(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 한우물(수용) | 나티보(액상), 부라마이신(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 한우물(수용) |

🔴 배 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|---|--|
| 나티보(액상), 매카니(유현), 실바코(수), 아미스타(수), 한빛(액상) | 모멘토(액상), 세티스(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 히어로(유) |

MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN
 MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN MERPAN



○ 감 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|---|---------------------------------------|
| 보가드(입상), 실바코(수), 아미스타탑(액상), 에이플(입상), 프린트(액상) | 데시스(유), 백승(액상), 오신(수), 킬충(액상), 트레본(수) |

○ 인삼 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|--------|--------|
| 푸르겐(수) | 피레탄(유) |

○ 포도 혼용 자료

| 살균제 | 살충제 |
|-----------------------------|---|
| 에이플(입상), 칸투스(입상), 팜한농베노밀(수) | 알타코아(입상), 오신(수), 트레본(수), 코니도(수), 모스피란(수), 쇼크(액상) |

○ 사용상 주의사항

1. 약해의 우려가 있으므로 꽃이 피어있는 기간중에는 살포를 금하여 주십시오.