



살균제

땅지기 입제

유효성분 및 함량	테부코나졸 2%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	2 kg × 10봉 / 박스 3 kg × 8봉 / 박스
작용기작 코드	사1



01

고추 탄저병 예방 약제

정식전 두둑처리로 초기 고추 탄저병을 예방합니다.

02

잔디 병해 방제용 입제

강우 시나 경사지등에 편리하게 살포할 수 있습니다.

03

마늘 흑색썩음균핵병 예방 약제

정식 전 토양 혼화처리를 통하여 보다 간편하게 흑색썩음균핵병을 예방합니다.

DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI
DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI
DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI
DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI
DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI DDANGJIGI

DDANGJIGI

땅지기 앞제



적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추 (단고추류 포함)	탄저병	정식전 두둑처리	3kg/10a	정식기	1회 이내
	흰비단병				
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 토양훈화처리	4kg/10a	파종기	
상추 (양상추포함)	균핵병	정식 전 토양훈화처리	3kg/10a	정식기	
잔디	동전마름병	발병초 10일간격 토양살포처리	4kg/10a	-	-

사용상 주의사항

1. 이 농약은 물에 희석하지 마시고 사용방법에 따라 사용하십시오.
2. 종구파종전 또는 정식전 사용량을 지켜 토양 전면에 골고루 살포한 후 토양과 잘 섞어 주십시오.
3. 이 농약을 기준량 보다 많이 사용할 경우, 이어짓는 작물(벼, 콩, 오이, 토마토, 배추, 무 등)의 생육에 영향이 있을 수 있으니 반드시 기준사용량을 지켜 사용하십시오.