

수화제 **new**

킬러펜서

유효성분 및 함량	옥솔린산 20%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	500g × 40봉 / 박스
작용기작 코드	가4

제품특징

01

세균성 전문 방제 약제

기존 항상제에 내성이 생긴 병원균에도 약효가 우수하며, 정균 및 살균 작용이 뛰어 납니다.

02

우수한 침투이행성 및 잔효성

퀴노리논계의 세균성 전문 약제로 세포분열 증식을 억제하며, 약효 지속 기간이 길어 예방 및 치료 효과가 뛰어 납니다.

03

안전한 약제

동제나 항상제와는 전혀 다른 약제로, 어패류, 꿀벌, 누에 등 유용 곤충에 영향이 적습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감초	세균점무늬병	발병초7일간격경엽처리	20g	수확 14일 전	3회이내
갯	무름병	발병직전부터7일간격경엽처리		수확 7일 전	
강활	궤양병	발병초7일간격경엽처리		수확 30일 전	
고추 (단고추류포함)	세균점무늬병	발병초부터7일간격경엽처리		수확 7일 전	
근대	무름병	발병초7일간격수간처리		수확 14일 전	
기장	세균줄무늬병	발병초7일간격경엽처리		수확 7일 전	
냉이	무름병	발병초경엽처리		수확 14일 전	
녹색꽃양배추 (브로콜리)				수확 21일 전	2회이내
담배	줄기속마름병	적심후7일간격경엽처리		수확 14일 전	3회이내
당근	무름병	발병초7일간격경엽처리		수확 7일 전	4회이내
대추	세균열매썩음병			수확 14일 전	2회이내
마늘	무름병			수확 21일 전	3회이내
무					
방울다다기양배추	검은썩음병	발병초10일간격경엽처리			

| 주요 병충해



고추 세균점무늬병



마늘 무름병



배추 무름병



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
방울다다기양배추	무름병	발병초7일간격경엽처리	20g	수확 21일 전	3회이내	
배추		발병초기부터7일간격경엽처리		수확 3일 전	5회이내	
부추		발병초7일간격경엽처리		수확 7일 전	2회이내	
비름				수확 14일 전	3회이내	
비트				수확 7일 전		
산마늘				수확 30일 전		
삼주	세균썩음병	발병초기7일간격경엽처리		수확 7일 전	3회이내	
상추 (양상추포함)	무름병			수확 14일 전		
수박	과일썩음병	발병초기부터7일간격경엽처리		수확 7일 전		
순무양배추 (콜라비)	무름병	발병초7일간격경엽처리		수확 14일 전		
쌈추				수확 7일 전	2회이내	
쑥갓				수확 7일 전	3회이내	
양배추	검은썩음병	발병초경엽처리		수확 21일 전		3회이내
청경채	무름병	발병초7일간격경엽처리		수확 7일 전		
콩(태광)	들불병	발병초10일간격경엽처리		수확 14일 전	1회이내	
	세균점무늬병					
파(쪽파포함)	무름병	발병초7일간격경엽처리				

사용상
주의사항

1. 고온 살포 시 약해를 일으킬 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.
2. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도 아다마코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
3. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.