



유제

# 론400



논농사에는 론400!

|           |                |
|-----------|----------------|
| 유효성분 및 함량 | 옥사디아존 12%      |
| 독성구분      | 저독성 / 어독성 Ⅲ급   |
| 포장단위      | 400ml × 30병/박스 |
| 작용기작 코드   | H14            |

## 제품특징

01

일년생잡초 방제와 다년생 잡초의 발생을 억제하는 효과가 있습니다.

02

따로 희석할 필요 없이 원액을 그대로 논에 살포하므로 노동력이 절감됩니다.

## 사용방법

1. 쓰레질로 논 지면을 잘 고른 직후 흠탕물 상태에서 원액을 살포하고 반드시 정지판 작업을 하여 주십시오.
2. 반드시 논 지면의 흠이 물 위로 보이지 않는 상태의 수심을 유지하고 살포하십시오.
3. 약제 살포는 병 밑 오목한 부분을 손으로 쥐어 잡고 살포 폭을 10m 정도로 하여 걸어가면서 5~6보마다 좌우로 한번씩 휘둘러 뿌리십시오.
4. 정지작업을 균일하게 하고, 약제 살포 후 최소한 2일 이후에 이양해야 하며, 이양 후에는 벼 엽신이 물에 잠기면 약해 우려가 있으므로 반드시 논물을 얇게(벼 엽신이 물에 잠기지 않는 3cm 정도) 유지 하십시오.
5. 논 지면이 고르지 못한 경우에는 바람에 약액이 몰릴 염려가 있으니 중앙부에 간이 논둑을 설치하여 사용하십시오.

## 적용대상 및 사용량

| 작물명        | 적용대상                              | 사용시기 및 방법                  | 1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용량 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 기계이양벼 (중묘) | 일년생잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 가막사리) | 쓰레질직후부터 이양 2일전까지 원액 수면점적처리 | 400ml원액/10a                    |



Z-400  
유제



### 사용상 주의사항

1. 모래땅, 물 빠짐이 심한 논, 가스 발생 논, 침수우려가 있는 논, 염해지에는 사용하지 마십시오.
2. 병에 걸린 모, 병해를 받은 모 또는 생육이 극히 불량한 모가 이앙될 논에는 사용하지 마십시오.
3. 논 바닥이 고르지 못하여 일부는 논 바닥이 보이고 일부는 모가 물 속에 잠기는 등 물 관리가 어려운 논에는 사용하지 마십시오.
4. 심한 바람이 불 때는 사용을 피하시고 약액이 바람에 날리거나 물의 흐름에 따라 한 곳으로 몰리지 않도록 주의 하십시오.
5. 모내기 후 비가 오거나 물 관리 부주의 등으로 모가 절반 이상 물에 잠길 경우에는 약해의 우려가 있으니 발견 즉시 1~2cm정도까지 물을 빼 주십시오.
6. 살포 초기 엽초에 약반이 나타나는 경우가 있으나 생육이 진전됨에 따라 회복되어 생육 및 수량에는 영향이 없습니다.
7. 이 약제는 쓰레질 할 때 사용하는 토양처리형 제초제로서 반드시 이앙 2일 이전에 사용해야 작물에 안전 합니다.
8. 이 약제는 종묘(기계이앙벼)에 사용하도록 되어 있는 약제로서 어린모에 사용할 경우에는 약해의 우려가 있으니 주의 하십시오.