

“전 세계 **19개국**에서 같이 사용합니다”

액상수화제

마스터콕



드디어 소개합니다. 구리 마스터 마스터콕!

유효성분 및 함량	코퍼설페이트펜타하이드레이트 21.6%
독성구분	보통독성 / 어독성 I 급
포장단위	1ℓ × 16병 / 박스
작용기작 코드	카

제품특징

- 01 동제 최적화 제형**
 국내 최초의 독특한 제형 및 성분의 신제품으로 효과가 우수합니다.
- 02 침전, 약흔 최소화**
 수용해도가 높아서 약흔 및 침전물이 거의 없어 살포가 용이 합니다.
- 03 구리 이온 최대화**
 생물 활성을 나타내는 구리 이온의 생성이 매우 높습니다.
- 04 토양, 환경에 안전**
 내우성이 좋으며, 토양 및 환경에 영향이 적습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	검은점무늬병	발생초기 경엽처리	40mℓ	발생초기	-
딸기	시들음병	정식후 토양관주처리	40mℓ(1ℓ/m ²)	정식기	1회 이내
배	화상병	수확 후부터 개화 전까지 경엽처리	40mℓ	개화전	-
사과					



주요 병충해



딸기 시들음병



사과 화상병



작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
딸기(관주)	사파이어(액상), 미라도(액상), 보가드(입상), 카디스(액상), 마금(액상)	칼립소(액상), 스트레이트(입상), 워록(유), 버티멕(유), 스투어드울트라(액상), 렘페이지(유)

※ 사과, 배 화상병 개화전 방제시 기계유나 석회유황합제와 혼용이 가능합니다.

사용상
주의사항

1. 이 농약은 이상고온이나 작물이 연약한 상태에서 과량 및 연속 사용할 경우에는 약해의 우려가 있으니 사용량을 반드시 지켜주십시오.
2. 이 농약은 예방효과를 가진 약제이므로 병 발생 후 약제 처리는 효과가 떨어집니다.
3. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 아다마코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
4. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.