

유제

조반니



뭘 쳐야할 지 모를때, 이거 한 번 조반니?

유효성분 및 함량 피라클로스트로빈 22.9%

독성구분 저독성 / 어독성 I 급

포장단위 50ml × 50병 / 박스
125ml × 50병 / 박스

작용기작 코드 다3

제품특징

01

적용 병해폭이 매우 넓은 스펙트럼을 자랑합니다.

02

작물체에서 예방 및 침투효과가 있어 사용시기 및 방제기간이 깁니다.

03

강한 침달성 및 침투이행성을 겸비 하였습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가죽나무	녹병	발생초기 경엽처리	5mℓ	발생초기	-
감귤	검은점무늬병			수확 10일 전까지	4회 이내
	더듬이병				
갯기름나물(방풍)	탄저병			수확 7일 전까지	2회 이내
갯기름나물(식방풍)	녹병				
고구마	덩굴썩김병	파종·정식기 관주처리	5mℓ(1ℓ/m ²)	파종·정식기	1회 이내
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	탄저병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병				
고추(단고추류포함)	탄저병			수확 2일 전까지	3회 이내
고추(잎)				수확 7일 전까지	1회 이내




| 주요 병충해



고추 탄저병



사과 탄저병



마늘 잎마름병

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
고추냉이잎	먹들이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내		
	잿빛곰팡이병		5mℓ				
곤달비	점무늬병			3회 이내			
	흰가루병						
공심채	점무늬병						
구기자	탄저병						
근대	균핵병						
금감(금굴)	검은점무늬병						
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함)	균핵병				수확 14일 전까지		
낙엽송	잎떨림병				6.7mℓ	발생초기	-
냉이	흰가루병				5mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
녹두	갈색무늬병		수확 21일 전까지			3회 이내	
	탄저병						
눈개승마	잿빛곰팡이병		수확 7일 전까지				
	탄저병						
다채(비타민)	균핵병		수확 14일 전까지				
당귀(잎)							
당근	잿빛곰팡이병		수확 30일 전까지				
대추	탄저병		수확 14일 전까지				
더덕	갈색무늬병						

조반니 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
더덕	탄저병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내	
돌나물	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내	
들깨(잎)	균핵병			수확 5일 전까지	3회 이내	
	녹병					
땅콩	흰비단병	정식(파종) 후 관주처리	5mℓ(1ℓ/m ²)	파종(정식)기	1회 이내	
레몬	검은점무늬병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내	
마(산약)	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지		
	탄저병					
마늘	잎마름병			수확 14일 전까지	5회 이내	
망고	탄저병			수확 7일 전까지	3회 이내	
매실				수확 14일 전까지		
모과						수확 3일 전까지
무화과						
민들레	점무늬병				2회 이내	
배암차즈기 (곰보배추)	탄저병				3회 이내	
				수확 7일 전까지	2회 이내	
복분자					3회 이내	
부추	잿빛곰팡이병					
비름	균핵병					
뽕나무(오디)	오디균핵병					
사과	탄저병				수확 21일 전까지	4회 이내
산딸기					수확 7일 전까지	3회 이내
살구					수확 14일 전까지	4회 이내
삼주					수확 30일 전까지	3회 이내
상추	균핵병			수확 7일 전까지	2회 이내	
	흰가루병					
생강	잎마름병				수확 21일 전까지	3회 이내



조반니
균제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
생강	잎집무늬마름병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내
석류	열매썩음병			수확 14일 전까지	
	탄저병				
소나무류	모잘록병	발생초기 토양분무처리	6.7mℓ	발생초기	-
	잎마름병				
수박(복수박포함)	덩굴마름병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 3일 전까지	5회 이내
	탄저병				
순무유채	균핵병				3회 이내
신선초					
쑥	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내
쑥갓	균핵병				3회 이내
쑥부쟁이					
아스파라거스	콩잎줄기마름병			수확 14일 전까지	2회 이내
아욱	균핵병			수확 7일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 14일 전까지	
앵두					
양미나리(샐러리)	검은무늬병			수확 21일 전까지	2회 이내
	균핵병			수확 14일 전까지	3회 이내
양배추					
양상추	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내
양앵두(체리)	탄저병			수확 14일 전까지	3회 이내
양파	노균병				
영경귀	흰가루병			수확 7일 전까지	
영산홍	녹병			발생초기	-
오미자	점무늬병	수확 21일 전까지	4회 이내		

조반니 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
옥수수	깜부기병	출수직전 경엽처리	5mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
왕고들빼기	흰가루병	발생초기 경엽처리			2회 이내
유자	탄저병			수확 10일 전까지	4회 이내
유채(잎)	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지	3회 이내
인삼	잘록병	파종 1일전 종자 분의처리	10g/kg(종자)	파종기	1회 이내
	점무늬병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내
잇꽃(홍화)	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지	3회 이내
	탄저병				
자두					
잔디	라이쵸독니아마름병	발생초기 관주처리	5mℓ(1ℓ/m ²)	발생초기	-
조	점무늬병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 30일 전까지	2회 이내
차나무	탄저병			수확 14일 전까지	3회 이내
참다래(키위)					
취나물	균핵병			수확 7일 전까지	
	흰가루병				
치커리	균핵병				
케일	검은무늬병			수확 30일 전까지	1회 이내
	균핵병				
콩	균핵마름병			수확 14일 전까지	3회 이내
	노균병				
	탄저병				
파(쪽파포함)	녹병			수확 7일 전까지	
파세리(향미나리)	흰가루병				
팥	갈색무늬병			수확 14일 전까지	3회 이내
	탄저병				
호두				수확 7일 전까지	



작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
감 (단감포함)		히어로(유)
감귤	델란(수), 탄자비(수), 스포르곤(수), 차단(액상), 펜피라(입상), 베푸란(액), 푸르겐(수), 확시란(수), 후론사이드(수)	렘페이지(유), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 제라진(유), 천하평정(수), 케레스(유), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 만장일치(수), 유토피아(액상), 주렁(유), 코니도(수), 왕중왕(입상), 슈퍼펀치(액상), 미네토스타(입상), 젠토런(액상), 산마루(수), 쇼크(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 엔비도(액상), 주움(액상)
고추 (단고추류 포함)	킬러팬서(수), 오리우스(유탕), 반조(액상), 금모아(수), 델란(수), 명작(액상), 삼공홀렛(수), 승부처(수), 스포르곤(수), 용마루(수용), 자부심(수), 초우크(수), 피리오(액상), 포룸디(수), 힌트(액상), 가스란(수), 고추탄(수), 곤케이(수), 깨꼬탄(수), 더마니(수용), 리도밀엠지(수), 미리카트(액상), 베노밀(수), 삼진왕(미탁), 스미렉스(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 앙콜(수), 오티바(액상), 일품(수), 참조네(수), 쿠퍼(수), 포룸(수), 포룸만(수), 포리옥신(수), 해비치(입상), 벨쿠트(수), 새빈나(액상), 차세대(수), 창가탄(수), 다코닐(수), 후론사이드(수)	위록(유), 아피스(액상), 스코프(분액), 플레토라(액상), 벌컨(유), 나노진(액상), 금관충(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 빅스톤(입상), 애니충(액상), 특명(수), 패키지(수), 화스탁(유), 히어로(유), 데시스(유), 디밀린(수), 라피탄(액), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 스미사이드(유), 아타라(입상), 아타브론(유), 암메이트(수), 에이팜(유), 적시타(유), 주렁(유), 캡틴(유), 코니도(수), 파발마(수), 쇼크(액상), 밀베노크(유), 피라니카(유), 스투어드(액상)
들깨(잎)	명작(액상)	빅카드(액상), 애니충(액상), 화스탁(유), 파밤탄(유)
마늘	용마루(수용)	디메토(유), 빅카드(액상), 렘페이지(유)
배	머판(입상), 델란(수), 가벤다(수), 헥사코나졸(액상), 탄자비(수), 농용신(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 시스텐(수), 실바코(수), 아미스타(수), 아그라마이신(수), 차세대(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 휘나리(유), 로브랄(수), 베푸란(액), 다이센엠-45(수), 삼진왕(미탁), 스포르곤(수), 안트라콜(수), 초우크(수), 캡탄(수), 헥사코나졸(액상)	라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 천하평정(수), 에스지블루밍(액상), 애니충(액상), 충모리(수), 케레스(유), 히어로(유), 히로인(수), 데시스(유), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 아타라(입상), 온누리(수), 코니도(수), 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 다니톨(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 주움(액상), 테디온(유), 페노팔(수), 노몰트(액상), 팔콘(수), 가네마이트(액상), 만루포(액상), 빅카드(액상), 프리트란(수), 강타자(유), 디밀린(수), 밀베노크(유), 세베로(유), 아크라마이트(액상), 오마이트(수), 파워샷(액상), 화스탁(유)

조반니 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	살균제	살충제
사과	머판(입상), 가벤다(수), 탄자비(수), 삼공홀팻(수), 스포르곤(수), 헥사코나졸(액상), 초우크(수), 트리플캡(액상), 로브랄(수), 바이코(수), 베노밀(수), 벨쿠트(수), 삼진왕(미탁), 시스템엠(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 켈탄(수), 톱신엠(수), 트리후민(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수), 해비치(입상)	나노진(액상), 라이몬(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 천하평정(수), 충모리(수), 케레스(유), 패키지(수), 화스탁(유), 노몰트(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 라피탄(액), 만장일치(수), 매치(유), 모스피란(수), 세베로(유), 아타라(입상), 알시스틴(수), 주령(수), 카스케이드(분액), 코니도(수), 타스타(수), 팔콘(수), 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 노블레스(액상), 다니톨(유), 밀베노크(유), 살비왕(액상), 시나위(수), 아크라마이트(액상), 오마이트(수), 주움(액상), 파워샷(액상), 페로팔(수)
수박 (복수박 포함)	승부처(수), 명작(액상), 탄자비(수), 스포르곤(수), 홀팻(수), 헥사코나졸(액상), 트리플캡(액상), 피리오(액상), 펜피라(입상), 프리키온(액상), 베노밀(수), 안트라콜(수), 포리옥신(수)	금관충(액상), 로맥틴(유), 만루포(액상), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 특명(수), 패키지(수), 런너(액상), 미믹(수), 에이팜(유), 타스타(수), 산마루(수), 쇼크(액상), 가네마이트(액상), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 주움(액상), 카스케이드(분액), 가네마이트(액상)
양배추		라이몬(액상)
양파	금모아(수), 금모리(액상), 펜피라(입상), 스포르곤(수), 차단(액상), 발리펜(액상)	빅카드(액상)
인삼	금모아(수), 탄자비(수), 포리옥신(수)	렘페이지(유), 빅카드(액상), 케레스(유), 히어로(유)
파 (쪽파포함)	명작(액상), 스포르곤(수)	금관충(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 애니충(액상), 제라진(유), 타르보(유), 특명(수), 패키지(수), 런너(액상), 매치(유), 미믹(수), 부메랑(입상), 세베로(유), 스튜어드(액상), 에이팜(유), 파단(수용), 로맥틴(유)

사용상 주의사항

1. 이 농약은 3회 이상 연용 하지 말고, 저항성 관리를 위해 작용기작이 다른 제품과 번갈아 살포하시기 바랍니다.
2. 이 농약은 부착성과 흡수성이 매우 우수하므로 흡수력을 높여주는 기능성 전착제와는 혼용하여 사용하지 마십시오.
3. 이 농약은 인삼의 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후 사용하십시오.