


액상수화제

커스토디아

언제 뿌려도 효과 좋은 살균제 커스토디아!



유효성분 및 함량	아족시스트로빈 11% 테부코나졸 18.5%
독성구분	보통독성 / 어독성 II 급
포장단위	100㎖ × 50병 / 박스 167㎖ × 50병 / 박스
제조원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	다3+사1

| 제품특징
01
광범위한 효과

작물에 발생하는 다양한 병해를 동시 방제 합니다.

02
언제 처리해도 효과적입니다.

예방과 치료효과를 동시에 나타내므로 언제 처리해도 효과적입니다.

03
약액이 잘 처리되지 않은 곳에도 고른 효과가 나타납니다.

침투이행성 약제로서 약액이 직접 처리되지 않은 부분에도 약액이 침투이행하여 고른 효과를 나타냅니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감포함)	동근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	6.7㎖	수확 21일 전까지	4회 이내
	탄저병			수확 21일전	
감귤	더뎅이병	춘지발생초 15일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	
고추 (단고추류포함)	역병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 7일 전까지	
근대	균핵병	발생초기 경엽처리		수확 21일 전까지	2회 이내
더덕	녹병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
딸기(육묘상)	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		육묘기	
마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	

| 주요 병충해



감 등근무늬낙엽병



딸기 탄저병



포도 탄저병




| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
배	검은별무늬병	발병초 10일간격 경업처리	6.7㎖	수확 21일 전까지	4회 이내	
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경업처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
	탄저병	발병초 10일간격 경업처리			4회 이내	
수박(복수박포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격 경업처리		수확 2일 전까지	3회 이내	
양파	노균병				4회 이내	
오이	흰가루병	발병초 10일간격 경업처리		수확 14일 전까지	4회 이내	
인삼	점무늬병				수확 7일 전까지	
자두	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경업처리	6.7㎖(1ℓ/m ³)	발생초기	3회 이내	
잔디	갈색잎마름병	발생초기 7일간격 관주처리			-	
	동전마름병	발병초 10일간격 경업처리				
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리				
참깨	잎마름병	발병초 10일간격 경업처리	6.7㎖	수확 14일 전까지	3회 이내	
파(쪽파포함)	녹병					
포도	갈색무늬병				4회 이내	
	잿빛곰팡이병	발생초기 7일간격 경업처리	6.7㎖(1ℓ/m ³)			
	탄저병	발병초 10일간격 경업처리				


커스토디아 액상수화제

| 시험성적

- 배 검은별무늬병 (공주대학교 2011)



- 감 등근무늬낙엽병 (순천대학교 2011)



| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
고추 (단고추류)	마판(입상), 반조(액상), 마금(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 도마크(유), 캐피즈(액상), 다코닐(수), 델란(액상), 모두랑(액상), 안트라콜(수), 다이센(수), 에이플(입수), 베푸란(액), 포리옥신(수), 후론사이드(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 워록(유제), 써커데드(액상), 트리보(분액), 인센타(입상), 벌컨(유), 검객(수), 격파(입상), 귀공자(수), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터팜(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 베네비아(유상), 송골매(수), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 아버타(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 첨병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상), 히트린(입상), 산마루(수), 스미사이딘(유), 주령(수), 카스케이드(분액), 모스피란(수)



| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
복숭아	머판(입상), 반조(액상), 살루스(액상), 아그리마이신(수), 한우물(수용), 일풀(수)	서마리(입상), 플레토라(액상), 알타코아(입상), 가이던스(입상), 아타라(입상), 코니도(수), 빅카드(액상), 세티스(입상), 모스피란(수), 다이몬파스트(액상), 쇼크(액상), 가네마이트(액상)
감 (단감포함)	머판(입상), 캐피즈(액상), 살루스(액상), 도마크(유), 델란(수), 포리옥신(수), 푸르겐(액상), 살림꾼(액상), 다이센엠-45(수), 톱신엠(수), 헥사코나졸(액상), 후론사이드(수), 카브리오(유), 나이보(액상)	트리보(분액), 플레토라(액상), 아피스(액상), 백승(액상), 빅카드(액상), 볼리암타고(액상), 암메이트(수), 오신(수), 청실홍실(수), 칼립소(액상), 코니도(액상), 트레본(수), 화스탁(유), 알리세(입상), 시나위(수), 모벤토(액상), 승자(유탁), 선두플러스(입상), 팡파레에스(액상), 알타코아(입상), 팬텀(입상), 보스(수용), 똑소리(입상), 스타터(수), 총사리(유탁), 캡처(입상), 리무진(캡슐)
배	머판(입상), 도마크(유), 캐피즈(액상), 금모리(액상), 델란(수), 사천왕(수), 포리옥신(수), 살림꾼(액상), 다이센엠-45(수), 베노밀(수), 스포르곤(수), 푸르겐(수), 헥사코나졸(액상), 후론사이드(수)	트리보(분액), 플레토라(액상), 라이몬(액상), 렘페이지(유제), 빅카드(액상), 산마루(수), 세티스(입상), 쇼크(액상), 오신(수), 피レス(유제), 스크프(분액)
인삼	머판(입상), 반조포르테(액상), 반조(액상), 리도밀(수), 다이센엠45(수), 벨쿠트(수), 포리옥신(수), 푸르겐(수)	워록(유), 델리게이트(입상), 렘페이지(유), 트랜스폼(액상), 피レス(유)
파	두아졸(유), 명작(액상), 벨리스플러스(입상), 스트로비(액상), 시스텐엠(수), 카브리오(유)	워록(유), 플레토라(액상), 코로란(유), 베네비아(유상), 벨스모(유), 부메랑(입상), 세베로(유), 프레오(유탁), 아피스(액상)
포도	머판(입상), 캐피즈(액상), 마금(액상), 선방(액상), 래버스(액상), 사파이어(액상), 미리카트(액상)	스크프(분액), 모스피란(수), 아타라(입상), 칼립소(액상), 코니도(수), 알타코아(입상), 오신(수), 트레본(수), 쇼크(액상), 리무진(캡슐)

사용상
주의사항

1. 이 농약은 침투성이 빠른 농약이므로 전착제류나 침투촉진제 등과 혼용시 악해가 발생하오니 전착제류와는 혼용하지 마십시오.
2. 이 농약은 적용 대상 작물 이외에는 악해의 위험이 있으므로 사용하지 마십시오.