



LINATI® 800 EC



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/ koncentrūota
emulsija/ emulsioonikontsentraat
(EC)



Darbīgā viela/Veikļioji medžiaga/Toimeaine

● prosulfokarbs/prosulfokarbas/prosulfokarb 800 g/L



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIA

Reģistrācijas Nr.: 0790

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums: skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

oriģinālā, neatvērtā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30



ESTONIA

Eesti reg. nr.: 823/06.05.22

Partii nr. ja valmistamise kuupaev:

vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat

Importētājs/Platintojas/Maaletooja:

UAB "ADAMA Northern Europe"

Viršuliškių skg. 34-1

LT-05132, Vilnius

Lietuva/Lietuva/Leedu



LITHUANIA

Registrācijas numurs: AS2-
58H(2021)

Partijas numurs ir pagaminimo

data: ziūrēti ant pakuotēs

Galiojimo laiks: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +370 52 42 00 17

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,

tā adrese/Registrācijas savininkas/

Registreerimise haldaja:

Syngenta Polska Sp. z o.o. Ul.

Szamocka 8 01-748 Warszawa

Polska/Polska/Poola

Tālr./Tel./Tel.: +370

52420017

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/

Tootja/pakendaja:

Syngenta Crop Protection AG

Bāzele/Bazelis/Basel

Šveice/Šveicarija/Šveits

**BRIESMAS
PAVOJINGA
ETTEVAATUST**



UN3082

**NO VARNISH
AREA**

L40768IPFR_01

10 L e



Skaneit informacijai /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine



SKALAIK TEISINGAI

Product name	LINATI® 800 EC		
Country	BAL		
Package size	10 L		
Label code	L40768IPFR_01		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	10-41-42 10.06.25	Status	
Smallest font on page	6.27 pt	Template	Rect_SLT_3Lang_NA_TB.indt



ADAMA



LINATI[®] 800 EC



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija/
emulsioonikonsentraat (EC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga/Toimeaine

• prosulfokarbs/prosulfokarbas/prosulfokarb 800 g/L



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIA

Reģistrācijas Nr.: 0790
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un
izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot oriģinālā, neatvērtā
iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas/Tootja/
pakendaja:
Syngenta Crop Protection AG
Bāzele/Bazelis/Basel
Šveice/Šveicarija/Šveits



LITHUANIA

Registracijos numeris: AS2-
58H(2021)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 52 42 00 17

Importētājs/Platintojas/
Maaletoojaja:
UAB "ADAMA Northern
Europe"
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132, Vilnius
Lietuva/Lietuva/Leedu



ESTONIA

Eesti reg. nr.: 823/06.05.22
Partii nr. ja valmistamise
kuupaev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības
ipašnieks, tā adrese/
Registrācijas savininkas/
Registreerimise haldaja:
Syngenta Polska Sp. z o.o. Ul.
Szamocka 8 01-748 Warszawa
Polska/Polska/Poola
Tālr./Tel./Tel.: +370 52420017

LATVIJA

Linati[®] 800 EC – Herbicīds īsmāzā viendīgļlapju un
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas
miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka
pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un
stādītie no sīkspolnīiem), kļopiku, lupīnas (graudiem) un
saulspēku sējumos un stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norīt. • H304 Var izraisīt nāvi, ja norīt
vai iekļūst elpceļos. • H315 Kairina ādu. • H317 Var izraisīt
alerģisku ādas reakciju. • H319 Izraisa nopietnu acu
kairinājumu. • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar
ilgtstošām sekām. • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un videi, ievērojiet lietošanas instrukciju. • P280
Izmantojot aizsargācīdus/aizsargdrēbes/ācu aizsargus/
sejas aizsargus. • P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMA:
Nekavējoties sazināties ar SAINĒŠANAS CENTRU vai
ārstu. • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi
izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas,
ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt
skalot. • P331 Neizraisīt vemšanu. • P332+P313 Ja rodas
ādas iekaisums: lūdziet medicīnu palīdzību. • P337+P313
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību. • P362
Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas
lietošanas izmazgāt. • P391 Savākt izsīkstošos šķidrumus.
• P501 Atbrīvoties no satura iepakojumā, ievērojot spēkā
esošo normatīvo aktu prasības. • SPI Nepiesāpēt ūdeni
ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netrīt
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.
Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem
un ceļiem. • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus,
ziemās kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu
un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos
ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

Avārijas gadījumā zīņot Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā,
sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t°
no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Linati[®] 800 EC – kontaktnio veikimo herbicidas, priklausantis tiokarbomaty cheminei grupei, naudojamas vienameči vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvieturiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir krmynuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus • Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. • Dirgina odą. • Gali sukelti alerginę odos reakciją. • Sukeilia smarkų akių dirginimą. • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. • Laikyti užrakintą. • Mūvėti apsauginius pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. • Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolių. • PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. • NESKATINTI vėmimo. • Jeigu sudirginama oda arba ja šberia: kreiptis į gydytoją. • Jeigu akių dirginimas neproieina: kreiptis į gydytoją. • Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis. • Nusivilkinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsiliekant. • Surinkti išteklėjusį medžiagą. • Talpyklą šalinti pagal nacionalines teises aktyvavimui. • Neužteršti vandens dugali apsaugos produktą ar jo pakute (nepaluti purkimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinį) vengti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių. • Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršius nuolaidis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/šviežųjų atviro liepsnos/karštų paviršių. • Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves.

EESTI

Linati[®] 800 EC – Herbistsiid lühiegaliste kõrreliste ja lühiegaliste kaheleheliste umbrohtude tõrjeks talinisel, talialdral, rukkil, talitritikalel, kartulil, hemel, põldaal, kõõmmel.

Sisaldab ohtlikke aineid prosulfokarb ja lahustibensiini (nafta), kerged aromaatsed ühendid. Kasutuspiirangud: Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Linati[®] 800 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

H302 Allaneelamisel kahjulik • H304 Allaneelamisel või hingamisteedes sattumisel võib olla surmav. • H315 Põhjustab nahaärritust. • H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. • H410 Võib mürine veekogumidele, pikaajaline toime. • P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivast, kaitseprille ja kaitsemaski. • P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL võtta viivitamatult ühendust MÜRISTUSTEABEKESKUS või arstiga. • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL pesta enne korduskasutust. • P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. • P391 Mahavoolanud toode koguda kokku. • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. • SPI Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seedmeid pinna veel lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi looda ja teede drenaažide). • SPe3 Veekogumistele kaitsemiseks pida kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinna-veekogudest.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Hädababi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine – Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Mitte laduda konteinereid kargematesse virmadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.



BRIESMAS
PAVOJINGA
ETTEVAATUST

2 x 10 L



SKALAUK TEISINGAI



8 718077 010328

UN3082

GRUPA
GRUPĖ
GRUPP

15


HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

Product name	LINATI [®] 800 EC		
Country	BAL		
Package size	10 L		
Label code	L40768OCFR_01		
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Name	
Label date	10.41.42 10.06.25	Status	
Smallest font on page	4.8 pt	Template	Rect_5LT_3Lang_NA_TB.indt

**ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(PROSULFOCARB
AND SOLVENT
NAPHTHA)**



UN3082





LINATI[®] 800 EC



ADAMA



LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA



BRIESMAS/PAVOJINGA/ETTEVAATUST



UN3082

L40768PAAR_01

30 x 20 L



LINATI® 800 EC



ADAMA

LATVIJA

Linati® 800 EC – Herbicids ismūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sipolu (sētie un stādītie no sīksipoliņiem), ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuku sējumos un stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norīts. ● **H304** Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpvadā. ● **H315** Kairina ādu. ● **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. ● **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. ● **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas instrukciju. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P301+P310** NORĪŠANAS GADĪJUMA: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu. ● **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemot kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. ● **P331** Neizrīst vemšanā. ● **P332+P313** Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīniskā palīdzību. ● **P337+P313** Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīniskā palīdzību. ● **P362** Novilt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. ● **P391** Savākt izsīkstošos šķidrumus. ● **P501** Atbrīvoties no atkritumiem iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SPI** Nepiesārņojiet ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Neīrīt savdabīgās tehnikas ūdenstilpi un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

Avārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Linati® 800 EC – kontaktnio veidma herbicids, priklausantis tiokarbomati cheminei grupei, naudojamas vienaamečiui vienasikių ir dviskikių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietručiuose, miežuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus ● Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. ● Dirgina odą. ● Gali sukelti alerginę odos reakciją. ● Sukelia smarkų akių dirginimą. ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Laikyti užrakintą. ● Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ● Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. ● PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. ● NESKATINTI vėmimo. ● Jeigu sudirginama oda arba į šeria: kreiptis į gydytoją. ● Jeigu akių dirginimas nepašalina: kreiptis į gydytoją. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis. ● Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsiliekant. ● Surinkti ištekėjusią medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teises aktu reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio / vengti taršos per drenąž iš sodybių ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonais: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. ● Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves.

ESTI

Linati® 800 EC – Herbitsiid lühialeliste kõrreliste ja lühialeliste kaheleduleheliste umbratud tärkles talinisel, talialoral, rukkil, talitritikalel, kartulil, hernel, põldool, kõõnemel.

Sisaldab ohtlikke aineid prosulfokarb ja lahustisinsin (nafta), kerged aatomased ühendid. Kasutuspiirangud: Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.

Linati® 800 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetehnoloogidele või spetsialistidele. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

H302 Allaneelamisel kahjulik. ● **H304** Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. ● **H315** Põhjustab nahaärritust. ● **H317** Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. ● **H319** Põhjustab tugevat silmade ärritust. ● **H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. ● **P261** Vältida pihustatud aine sissehingamist. ● **P280** Kanda kaitsekindaid, kaitseväestust, kaitseprille ja kaitsemaski. ● **P301+P310** ALLANEELAMISE KORRAL võtta viivitamatult ühendust MURGIJUS-ABEKS-KUS või arstiga. ● **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL pesta nahke vee ja seebiga. ● **P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult vee. Eemaldada kontaktläätsed, kui need kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ● **P362+P364** Võtta selgest saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. ● **P331** MITTE kutsuda esile oksendamist. ● **P391** Mahavoolanud toode koguda kokku. ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **SPI** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Veeorganismide kaitsemiseks pida kinni mittespitsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määruse nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veesaadusest tulevaleid kasutuspiiranguid. Häädaabi telefon 112. Mürgistusteaabeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine – Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Mitte ladada konteinereid kõrgematesse virdadesse kui 2 m, et vältida toote kokkumissimist ja kahjustamist.

UFI: XT8Q-RDC2-QV01-NK4R

GRUPA
GRUPĖ
GRUPP

15

HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID



8 718077 009827

atidaryti čia
atveriet šeit
avada siit



Product name	LINATI® 800 EC	Name	
Country	BAL	Status	
Package size	10 L	Template	Rect_5LT_3Lang_NA_TB.indt
Label code	L40768IPBB_01		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	10:41:42 10.06.25		
Smallest font on page	5.16 pt		

L40768IPBB_01

LATVIA

LIETUAVIA

ESTONIA



LINATI® 800 EC



LATVIJA

Linati® 800 EC – Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju neažļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un stādītie no sīksipoliņiem), ķiploku, lupiņas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norīts. • **H304** Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpvidos. • **H315** Kairina ādu. • **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. • **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas instrukciju. • **P280** Izmantojot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ācu aizsargus/sējas aizsargus. • **P301+P310** NORISĀNAS GADĪJUMA: Nekavējoties sazināties ar SAINEŠĀNAS CENTRU vai ārstu. • **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalojiet acis ūdenī vairākas minūtes. Izņemot vienkontakta, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • **P331** Neizrīnāt vemšanu. • **P332+P313** Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīniskā palīdzību. • **P337+P313** Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīniskā palīdzību. • **P362** Novilkiet piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgājiet. • **P391** Savākt izsīkstošos šķidrumus. • **P501** Atbrīvoties no saturs/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. • **SPI** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsgāziet no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu, ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zīpot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Linati® 800 EC – kontaktnio veikimo herbicidas, priklausantis tiokarbomatu cheminei grupei, naudojamas vienamečių vienasikičių ir dvisikičių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus • Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. • Dirgina odą. • Gali sukelti alerginę odos reakciją. • Sukelia smarkų akių dirginimą. • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. • Laikyti užrakintą. • Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. • Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. • PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. • NESKATINTI vėmimo. • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. • Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. • Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis. • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivilkiant. • Surinkti ištekiusią medžiagą. • Talpyklę šlinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenąžą iš sodybių ar nuo kelių). • Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiametiais žoliniais augalais.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. • Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves.

EESTI

Linati® 800 EC – Herbitsiid lühialeiste kõrrelisete ja lühialeiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisel, taliladral, rükkil, talitritikale, kartulil, hernel, põldoad, köömel.

Sisaldab ohtlikke aineid prosofokarb ja lahustibensiini (nafta), kerged aromaatsed ühendid. Kasutuspiirangud: Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.

Linati® 800 EC võib olla ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Väitmaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

H302 Allaneelamisel kahjulik. • **H304** Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. • **H315** Põhjustab nahärritust. • **H317** Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. • **H319** Põhjustab tugevat silmade ärritust. • **H410** Väga mürgine veorganismidele, pikaajaline toime. • **P261** Vältida pihustatud aine sissehingamist. • **P280** Kanda kaitsekindaid, kaitseriivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. • **P301 + P310** ALLANEELAMISE KORRAL võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUS või arstiga. • **P302 + P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL pesta rohke vee ja seebiga. • **P305 + P351 + P338** SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. • **P362+P364** Võtta seljast saastunud riivad ja pesta enne korduskasutust. • **P331** MITTE kutsuda esile oksendamist. • **P391** Mahavoolanud toode koguda kokku. • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seedmehi pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). • **SPe3** Veorganismide kaitsemiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimetikaveehendi kasutamise ja hoiukoha käpsemad nõuded“ ning Veesaadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine – Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Mitte laduda konteinerid kõrgematesse vinnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.



UFI: XT8Q-RDC2-QV01-NK4R



Product name	LINATI® 800 EC		
Country	BAL		
Package size	20 L		
Label code	L40768/IPBB_01		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	10:41:42 10.06.25	Status	
Smallest font on page	5.26 pt	Template	Rect_5LT_3Lang_NA_TB.indt



LATVIJA

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniski aktivētā ogle. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassegas, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS

Linati® 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojas pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

IEDARBĪBAS VEIDS

Prosulfokarbs kavē lipīdu sintēzi, kā rezultātā pārveidojas membrāna un pārtraucas vitāli svarīgi šūnu procesi. Preparāts darbojas gan pret dīgstošām, gan augošām nezālēm.

DEVAS UN IEDARBĪBAS SPEKTRS

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle:

Product name	LINATI® 800 EC		
Country	BAL		
Package size	10 L		
Label code			
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	10-01-22 10:00:25	Name	
Smallest font on page	7 pt	Template	Rect_5LT_3Lang_NA_TB.indt

Līdz sadīgšanai (AS 00-10) 2,0 - 2,5 L/ha.

Labā efektivitāte > 85%:
parastā rudzuzmilga (*Apera spica-venti*),
maura skarene (*Poa annua*),
parastā virza (*Stellaria media*),
veronikas (*Veronica spp.*).

Vidēja efektivitāte, 60 – 85%:
kumelītes (*Matricaria spp.*),
lauka vijolīte (*Viola arvensis*).

Pēc sadīgšanas līdz 3 lapām graudaugiem
(AS 11-13) 3,0 – 4,0 L/ha.

Labā efektivitāte > 85%:
parastā rudzuzmilga (*Apera spica-venti*),
maura skarene (*Poa annua*),
ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*).

Vidēja efektivitāte, 60 – 85%:
ķeraiņu madara (*Galium aparine*),
veronikas (*Veronica spp.*),
parastā virza (*Stellaria media*),
rapsis (*Brassica napus*),
tūruma zvēre (*Sinapis arvensis*),
kumelītes (*Matricaria spp.*),
tūruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*).

**Kartupeli, kimenes, zirni, lauka pupas, lupīna (graudiem), burkāni, sīpoli, ķiploki, selerijas (kātu un sakņu),
saulespuķes - 4.0 L/ha:**

Labā efektivitāte > 85%:
izplestā balodene (*Altriplex patula*),
ķeraiņu madara (*Galium aparine*),
melnā naktene (*Solanum nigrum*),
parastā virza (*Stellaria media*),
veronikas (*Veronica spp.*),
ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*).

Vidēja efektivitāte 60 – 85 %:
baltā balanda (*Chenopodium album*),
kumelītes (*Matricaria spp.*),
tūruma zvēre (*Sinapis arvensis*).

Zema efektivitāte < 60 %:
lauka vijolīte (*Viola arvensis*),
rapsis (*Brassica napus*).

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5	Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00- 10).	-	1

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
		3.0-4.0	Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11-21).		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00-10).	42	1
Ķīmenes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.	-	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.	75	1
Lupiņa* (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.	-	1
Pupas, lauka*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.	75	1
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus burkānu 2 īsto lapu stadijā (AS 12).	90	1
Sīpoli* (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķiploki*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad sējaijiem (sīpoliem) pirmā lapa parādīta formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa 3-4 cm (AS 11-13).	90	1
Selerijas* (sakņu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas.	90	1
Selerijas* (kātu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas.	60	1
Saulespuķes*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0	Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.

Atbildība.

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme.

Ir noteiktas papildus prasības Linati® 800 EC lietošanas tehnoloģijai: augu aizsardzības līdzekļu lietotājam smidzināšanas laikā jāstrādā slēgtā kabīnē, kas apgādāta ar gaisa kondicionēšanas iekārtu.

Graudaugus var apstrādāt uzreiz pēc sējas un līdz cerošanas sākumam (AS 00-21). Vislabākais laiks Linati® 800 EC lietošanai ir pirms nezāļu sadīgšanas. Sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā vismaz 3 cm dziļumā. Ieteicams lietot uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums samazina iedarbības efektivitāti. Jācenšas panākt vienmērīgu augsnes virskārtu bez cilām.

Linati® 800 EC efektivitāte ir mazāka augsnēs ar augstu humusa saturu.

Kartupeļos Linati® 800 EC var lietot visiem izmantošanas veidiem (pārtikai, sēklai, pārstrādei u.c.) paredzētajos kartupeļu stādījumos. Apstrāde jāveic pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu dīgšanas (AS 00-10). Apstrādāt jau uzdīgušus kartupeļus nav ieteicams.

Lai paplašinātu apkarojamo nezāļu spektru, pirms dīgšanas kartupeļu stādījumus var apstrādāt ar **Linati® 800 EC 4,0 L/ha + Mistral 700 WG 0,2 -0,3 kg/ha** maisījumu. Šim maisījumam ir ļoti laba efektivitāte vēl uz sekojošām nezālēm kartupeļu stādījumos: nesmaržīgā sunkumelīte (*Trileurospermum perforatum*) un sūrenes (*Polygonum spp.*). Ja nepieciešams, var papildus veikt apstrādi ar Mistral 700 WG, brīdī, kad kartupeļi ir apmēram 5 cm gari.

Smidzināt ir ieteicams uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums un augsta temperatūra samazina efektivitāti. Linati® 800 EC ir saudzējoša iedarbība uz kartupeļiem. To var lietot uz agrajiem kartupeļiem. Starp šķirnēm atšķirības līdz šim nav novērotas.

Bezlietus periods: 1 stunda.

Ūdens patēriņš: 200 - 400 L/ha.

IEROBEŽOJUMI

Nelietot Linati® 800 EC, ja augi ir apsaluši, cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, kultūraugus stipri bojājuši augu kaitēkļi vai slimības un ja ir liels diennakts temperatūru svārstības. Lai arī augi pilnībā atkopjas, var parādīties īslaicīga augu dzeltēšana.

Ziemāju sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā, vismaz 3 cm dziļumā.

Apstrādājot sadīgušus kultūraugus, tiem jābūt sausiem.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Linati® 800 EC daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisā arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens.

Ieteicamā smidzināšanas tehnika: 110° sprauslas ISO F 025/03.

KULTŪRAUGU IZTURĪBA

Ja tīrums apstrādāts ar Linati® 800 EC pirms kultūraugu sadīgšanas, retos gadījumos var palēnināties

dīgšanas process. Tas ir īslaicīgi un pieredze rāda, ka ražu tas nelabvēlīgi neietekmē. Linati® 800 EC nav iedarbības uz labības sēklām. Līdz šim nav novērotas atšķirības starp graudaugu sugām. Ja kultūraugs cieš no skābekļa trūkuma, kā, piemēram, pēc lieliem nokrišņiem, uz auga lapām var parādīties pārejoši dzeltenīgi plankumi, kas uz ražu neatstās negatīvu ietekmi.

PĒCAUGA IZVĒLE

Ja ziemāji rudenī ir apstrādāti tikai ar Linati® 800 EC un ja pavasarī tomēr šīs platības ir jāpārsēj, tad:

1. bez aršanas var audzēt: kukurūzu, saulespuķes, auzas, vasaras miežus, vasaras kviešus, zirņus, vasaras rapsi un linus.
2. ar aršanu var audzēt: burkānus, salātus, sīpolus, cukurbietes un kartupeļus.

IETEIKUMI REZISTENCES NOVĒRŠANAI

Linati® 800 EC darbīgā viela prosulfokarbs pieder tiokarbomātu ķīmiskajai klasei, kas pēc iedarbības veida ir lipīdu sintēzes inhibitori (15. grupa, pēc HRAC klasifikācijas). Katrā nezāļu populācijā var būt sastopami augi, kuri ir vairāk izturīgi vai dabiski rezistenti pret 15. grupas herbicīdiem. Lai novērstu rezistences izveidošanās risku, vienmēr sekojiet HRAC izstrādātajām vadlīnijām:

- praksē piemērojiet integrēto nezāļu vadības sistēmu;
- veidojot bākas/produktu maisījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas periodā vai pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem;
- lietojiet pilnu ieteikto herbicīda devu un piemērotu apstrādes laiku;
- pēc apstrādes sekojiet līdz nezāļu ierobežošanas efektivitātei un izpēti katru nepilnīgi ierobežoto nezāli, un nepieļaujiet, lai tā ražotu sēklas vai vairotos veģetatīvi.

SAVIETOJAMĪBA

Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Linati® 800 EC nedrīkst jaukt kopā ar vairāk, kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

1. Pēc darba šķidruma izsmidzināšanas, uz lauka nekavējoties izskalo smidzinātāju no iekšpuses un noskalot no ārpusē ar tīru ūdeni.
2. Smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalo ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti smidzinātāju tīrīšanai, piemēram, *All Clear Extra*.
3. Smidzināšanas aparāturu tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem līdzekļiem. Caurules, uzgaļi, ventiļi un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, maisot ūdeni, vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi – ūdenī, kam pievienots līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRAŠĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā/ aizsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

ŠĶIDRUMA IZŠĻAKSTĪŠANĀS VAI NOPLŪDE

Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, to apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Piezīme: izlijušo preparātu aizliegts izmantot.

UZGLABĀŠANA

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

® Reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Linati® 800 EC – kontaktinio veikimo herbicidas, priklausantis tiokarbomatų cheminei grupei, naudojamas vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

VEIKIMO BŪDAS

Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius procesus. Naudojant produktą, kol piktžolės yra nesudygusios, produktas yra pasisavinamas per šaknis ir taip sustabdomas jų dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.

HERBICIDO LINATI® 800 EC VEIKSMINGUMAS

Naudojant rudenį žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose:

Iki javų sudygimo, naudojant 2,0 - 2,5 L/ha
Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 85 %)

Dirvinė smilguolė* (*Apera spica venti*)
Vienmetė miglė (*Poa annua*)
Daržinė žliugė (*Stellaria media*)
Veronikos (*Veronica* spp.)
Kibusis lipikas (*Galium aparine*)

* - veiksmingumas daugiau 90%

Vidutiniškai jautrios piktžolės
(veiksmingumas 60 - 85 %)

Ramunės (*Matricaria* spp.)
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)

Javam sudygus, iki 3-jų lapelių, naudojant 3,0 - 4,0 L/ha
Jautrios piktžolės (veiksmingumas > 85%)

Dirvinė smilguolė* (*Apera spica venti*)
Vienmetė miglė (*Poa annua*)
Trikerė žvaginė (*Capsella bursa pastoris*)
Dirvinė čiuzutė (*Thlaspi arvense*)

Vidutiniškai jautrios piktžolės
(veiksmingumas 60 - 85 %)

Kibusis lipikas (*Galium aparine*)
Veronikos (*Veronica* spp.)
Daržinė žliugė (*Stellaria media*)
Rapsai (*Brassica napus*)

Naudojant pavasarį iki sudygimo bulvėse, žirniuose, kmynuose, naudojant 5,0 L/ha:

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas > 90 %)

Šiurkštusis burnotis (*Amaranthus retroflexus*)
Plačioji balandūnė (*Atriplex patula*)
Karpažolės (*Euphorbia* spp.)

Vaistinė žvirbliarūtė (*Fumaria officinalis*)
Smulkiažiedė galinzoga (*Galinsoga parviflora*)
Kibusis lipikas (*Galium aparine*)
Garstukas (*Sinapis arvensis*)
Juodoji kiauliuogė (*Solanum nigrum*)
Daržinė žliugė (*Stellaria media*)
Veronikos (*Veronica* spp.)

Jautrios piktžolės (veiksmingumas 70 - 90 %)

Paprastoji rietmenė (*Echinochloa crus galli*)
Baltoji balanda (*Chenopodium album*)
Ramunės (*Matricaria* spp.)
Paprastoji žilė (*Senecio vulgaris*)
Vijoklinis pelėvirkštis (*Fallopia convolvulus*)

Mažai jautrios piktžolės (< 70 %)

Rūgtys (*Polygonum* spp.)
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)
Aguona birulė (*Papaver rhoeas*)
Dirvinė pienė (*Sonchus arvensis*)
Dirvinis bobramunis (*Anthemis arvensis*)
Daugiametės šakniaatžalinės piktžolės.

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Dėl Linati® 800 EC maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Linati® 800 EC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

NAUDOJIMAS

Linati® 800 EC veiksmingumas gali priklausyti nuo dirvos mechaninės sudėties, dirvos drėgmės ir organinių medžiagų kiekio dirvoje. Todėl didesnės herbicido normos naudojamos organiniuose dirvožemiuose, o mažesnės - priesmėlio dirvose.

Javams sudygus, nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant didelei drėgmei, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu ir esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje. Stengtis, kad dirvos paviršiuje po sėjos nebūtų grumstų. Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose naudojant produktą po sudygimo, lietus po purškimo praėjus 1 valandai nepavojaingas.

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Augalai	Norma L/ha	Naudojimo laikas	Maksimalus apdorojimų skaičius per metus
Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	2,0-2,5	Po sėjos, iki sudygstant (BBCH 00-10)	1
	3,0-4,0	Pradėjus dygti iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11-21)	
Žirniai	4,0-5,0	Po sėjos, iki sudygstant (BBCH 00-10)	1
Kmynai	4,0-5,0	Po sėjos, iki sudygstant (BBCH 00-10)	1
Bulvės	4,0-5,0	Po sodinimo, iki sudygstant (BBCH 00-09)	1

KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo:
Ankstyvoms bulvėms – 42 dienos.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Linati® 800 EC sudėtyje esantis prosulfokarbas priklauso tiokarbomatų cheminei grupei (HRAC 15 grupė). Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis.

Linati® 800 EC galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.

*- HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas (www.hracglobal.com).

POVEIKIS KULTŪRINIAMS AUGALAMS

Jei susidaro žieminiam javams sudygti nepalankios oro ar dirvos sąlygos, Linati® 800 EC neturėtų būti naudojamas iki sudygimo. Tokiu atveju produkto naudojimas atidedamas kol javai sudygs ir sąlygos pagerės, bet ne vėliau krūmijimosi pradžios. Naudojant produkto didžiąją normą (5,0 L/ha) bulvėse iki sudygimo, lengvose dirvose, galimas lėtesnis dygimas. Tai laikinas poveikis, kuris neturi neigiamos įtakos derliui.

SĖJOMAINA

Išnykus žieminiams javams, kur rudenį buvo panaudotas produktas, tą patį rudenį galima persėti tik žieminius javais ar rapsais. Kitų metų pavasarį gali būti sėjami šie žemės ūkio augalai: kukurūzai, linai, saulėgrąžos, avižos, vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, vasariniai rapsai, cukriniai runkeliai, žirniai, pupos, morkos, salotos, sojos, taip pat sodinama bulvės, baltagūžiai kopūstai.

TIRPALO RUOŠIMAS

- Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 – 400 l/ha. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švari vandeniu. Produktą gerai suplakyti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį ir likusį vandens kiekį į purkštuvą. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurkšti nedelsiant.
- Norint išvengti galimo putojimo, būtina naudoti švarų ir etiketėje nurodytą vandens kiekį.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purškti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš dirvos paviršiaus. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų dirvos paviršių. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švari vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei

avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). **Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima eiti tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mėvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko purkštuvais privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Įkvėpus gali išsivystyti plaučių edema ir pneumonitas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0oC ir ne aukštesnėje negu + 35oC temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

EESTI

KESKKONNAOHTLIKKUS

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

ESMAABI

Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid.

Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silma sattumisel loputada avatud silmalaugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentrati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti poole.

Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist

SÄILITAMISTINGIMUSED

Preparaadi säilimisaaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virdadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaati katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

PAKENDI KAHJUTUSTAMINE

Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks, koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

TOIMEMECHANISM

Linati® 800 EC on tiokarbamaatgrupi herbitsiid, mis sisaldab toimeainet prosulfokarb. Toimeaine absorbeerub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Prosulfokarb pidurdab lipiidide sünteesi, mille tulemusel rakkude elutegevus katkeb ja umbrohi hävineb.

TOIMESPEKTER JA KULUNORMID

1. **Kasutamine sügisel talinisul, taliodral, tritikalel, rukkil:**

Kasutamine <u>enne</u> teraviljade tärkamist, kulunorm 3,0 L/ha	Kasutamine tärkamise <u>järgselt</u> , kuni teravilja 3 lehe staadiumini, kulunorm 3,0 L/ha
Tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85) Rukki-kastehein* (<i>Apera spica-venti</i>) Murunurmikas (<i>Poa annua</i>) Vesihein (<i>Stellaria media</i>) Roomav madar ehk virn (<i>Galium aparine</i>) Mailased (<i>Veronika spp.</i>) Iminõges (<i>Lamium spp</i>) Raiheinad (<i>Lolium sp.</i>) Aas-rebasesaba (<i>Alopecurus pratensis</i>) * efektiivsus > 90%	Tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85) Rukki-kastehein* (<i>Apera spica-venti</i>) Murunurmikas (<i>Poa annua</i>) Harilik hiirekõrv (<i>Capsella bursa pastoris</i>) Põld-litterhein (<i>Thlaspi arvense</i>)
Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60 - 85 %) Kesalill (<i>Matricaria spp.</i>) Põldkannike (<i>Viola arvensis</i>)	Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60 - 85 %) Roomav madar ehk virn (<i>Galium aparine</i>) Mailased (<i>Veronika spp.</i>) Vesihein (<i>Stellaria media</i>) Raps võõrkultuurina (<i>Brassica napus</i>)

2. Kasutamine kevadel enne tärkamist kartulil, köömnel, põldoal, hernel (täisküpsusfaasis koristatav) kulunormiga 4,0 L/ha:

Väga tundlikud umbrohud (efektiivsus > 90%)

Tähk-rebashein (*Amaranthus retroflexus*)
Harilik malts (*Atriplex patula*)
Harilik piimalill (*Euphorbia spp.*)
Harilik punand (*Fumaria officinalis*)
Paljas võõrkakar (*Galinsoga parviflora*)
Roomav madar ehk virn (*Galium aparine*)
Põldsinep (*Sinapis arvensis*)
Must maavits (*Solanum nigrum*)
Vesihein (*Stellaria media*)
Mailased (*Veronica spp.*)
Verev iminõges (*Lamium purpureum*)
Harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*)
Harilik linnukapsas (*Lapsana communis*)
Harilik kurekael (*Erodium cicutarium*)

Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 70 - 90 %)

Tähk-kukehriss (*Echinochloa crus galli*)
Valge hanemalts (*Chenopodium album*)
Kesalill, kummelid (*Matricaria spp.*)
Harilik ristirohi (*Senecio vulgaris*)
Konnatatar (*Fallopia convolvulus*)

Vähem tundlikud umbrohud (< 70 %)

Kirburohi (*Polygonum spp.*)

Põldkannike (*Viola arvensis*)
Kukemagun (*Papaver rhoeas*)
Põld-piimohakas (*Sonchus arvensis*)
Valge karikakar (*Anthemis arvensis*)

KASUTAMINE

Kultuur	Kulunorm L/ha	Kasutamise aeg	Pritsimiskordade arv
Taliniisu, -rukis, -tritikale, -oder	3,0	Peale külvi, enne tärkamist kuni esimene kõrvalvõrse on nähtav (BBCH 00-21).	1
Hernes, põlduba	4,0	Peale külvi, enne tärkamist (BBCH 00-10)	1
Köömen	4,0	Peale külvi, enne tärkamist (BBCH 00-10)	1
Kartul	4,0	Peale külvi, enne tärkamist (BBCH 00-11)	1

Tärkamiseelne pritsimine võib aeglustada kultuuri tärkamist. See mõju on ajutine ning ei mõjuta ebasoodsalt kultuuri saaki. Kasutada kuni umbrohtude 2. pärislehe faasini.

TÄHELEPANU KASUTAMISEL

Mitte pritsida teravilju, mis kannatavad stressi all või mida on kahjustanud rasked ilmastikutingimused, külmumine või ööpäevaste temperatuuride järsud kõikumised, üleujutus, haigused, kahjurid. Võib esineda ajutist kolletumist.

Linati® 800 EC-ga pritsimise järel võib ikalduse korral uuesti külvata taliteravilju.

Järgmisel kevadel võib külvata: kündmata põllule – maisi, lina, hernest, kaera, suviotra, suvinisu, suvirapsi; küntud põllule – porgandit, salatit, sibulat, suhkrupeeti, kartulit.

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist

PAAGISEGUD

Linati® 800 EC kasutamise võimaluste kohta paagisegus teiste toodetega küsige infot loa valdaja esindajalt või edasimüüjalt.

RESISTENTSUS

Sisaldab toimeainet prosulfokarb, mis kuulub tiokarbamaatide klassi, HRAC gruppi 15. Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete umbrohtude kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitusete saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Pritsipaak täita 1/3 veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

PRITSIMISTEHNOLGOOGIA

Vee kulunorm 200-400 L/ha.

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

PRITSI PUHASTAMINE

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

JURIIDILISED ASPEKTID JA KASUTAJA RISK

Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.

Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.

Olemasolevate või tekkivate resistentsete umbrohtude vastu võivad herbitsiidid osutada väheefektiivseteks. Kuna kõnealuste umbrohtude esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega toote edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud herbitsiidide ebatõhusus resistentsete umbrohtude korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle mõju võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit: hoiustamistingimused, äärmuslikud kliimaatilised tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentset umbrohud), ei vastuta tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.

® Registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company