

# LEOPARD®



## LV - HERBICĪDS

Darbiņā vielā:  
etil-kvialofops-P 50 g/L (5.4 % w/w)  
**Preparatīvā forma:**  
emulsijas koncentrāts  
Reģistrācijas Nr.: 0424  
Reģistrācijas klase: 2.  
**Partijas Nr. un izgatavošanas datums:**  
skatit uz iepakojuma  
Derīguma terminš:  
2 gadi no izgatavošanas datuma  
oriģinālā, glabājot neatvērtā iepakojumā.

## LT - HERBICIDAS

Veiklojoji medžiaga:  
kvialofop-P-etilas 50 g/L (5.4 % w/w)  
**Produktu forma:**  
koncentruota emulsija  
Registracijos numeris:  
0450H/13  
**Partijos Nr. ir pagaminimo data:**  
žiūrēti ant iepakavimo  
Galojimo laikas: 2 metai

## EE - HERBITSIID

Toimeaine:  
kvialofop-P-etyl 50 g/L (5.4 % w/w)  
**Preparatiivne vorm:**  
emulsiōonikontsentrāt (e.k.)  
Eesti reg. nr.:#  
0460/09.05.12  
**Partii nr. ja valmistamise kuupäev:**  
vaata pakendil  
Aegumistähtaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /  
Registracijos savininkas/Registreerimise  
haldaja:

ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden,  
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad  
Tālr./Tel.: +31 33 44 53 160  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

Pārstāvniecība Latvijā:  
Tālr.: +371 2944 62 85

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/  
Tootja/pakkija:  
ADAMA Agan Ltd.  
P. O. Box 262, Ashdod,  
77102 Izraēla/Izraelis/Israel

Skanēt informāciju  
Nuskaiti QR kodu  
QR-kodi lugemine



BRIESMAS  
PAVOJINGA  
ETTEVAATUST

UN 3082



© ADAMA Agan Ltd.

5 L e

T4588A\_07

ANELEOBAL5IT/04/A

**LEOPARD®**

Latvija

**Leopard®** - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūžā un daudzgadīgo viendīglapju nezāļu un labību sārnuaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rāpšā, cukurbiešu un lopbarības biešu, burķānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeli stādījumos.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norai vai iekļūst elpelos. • H319 Izraisīt noņemtu acu kairinājumu. • H336 Var izraisīt mīgaīnīvai reibonus. • H411 Tokisks ūdens orgāniem ar iļgošām sekām. • EUH065 Atkārto īedarbību var radīt sausū ūdā vai izraisīt tās spriegšanu. EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietosānas pamācību. • P261 Izvarīties ielpot smidzinājumu. • P280 Izmantot aizsargcimdus aizsargādreibes/ aicu aizsargus/ sejas aizsargus. • P301+P310 NORISĀS GADĪJUMĀ: kavējoties sazināties ar SAINEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu. • P304 +P340 IELĒPOSĀNAS GADĪJUMĀ: izvest cietošu svārgā gaisa turētām stāvoklī, būtē ārtu ielpot. • P305 + P351 + P353 AICU UN ACUL: Izņemt iekšķķelus ar ūdeni vairākās minūtēs. Izņemt kopējķķelus.

Ja tas ir lievotāks ja to ir veļi līdzīgi. Turpināt skolot • **P331 NEIZRAISĪT vēršanu • P501 Atbrivotību no satura/tvertnes, ievarējot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SPI Niespērāt ūdeni a ugnī aizsardzības līdzekļu tā iepakojumū. Netrīt smidzināšanas tehnisko īstendilpiju un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu ne pagalmiņiem un ceļiem • **S3e1 Lai izsargātu ūdens organismus, ievarēt 10 m aizsargojus līdz ūdenstelpiņam un ūdenstecēm • S3e2 Lai izsargātu jau izdīgusī kultūraugušus un cītus ar lietumju nesaistītos augus, ievarēt 10 m aizsargjoslu līdz blakus leukam un/vai lauksaimniecība neizmantomajai zemei. Šīs nosacījumus nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam leukam ir plātības ar vēl neizdārušiem augiem.****

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības urglābšanas dienestam, tālrunis 112.

**UZGLABĀŠANA** - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā, bēriņiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsleždamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.



Lietuva

**Leopard** – selektuysis, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukrininkų ir pašarinų rankelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, želininių kopūstų, brokolikių, svogūnių, česnakų, žirnių, pupų, lubinų linų pasėliuose, obelyų ir kriausiai pomedžiuose, dekoratyviniuose augalose bei miško medelynuose ir miško želiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienometės ir daugiametės vienaskiltės piktžolės, javų papirbas.

Pakartotinius poveikieles gali sukelti odos džiūvimų arba sklinimėjimų **PRAIRIUS** ir patekusių į kvėpavimo takus, gal sukelti mirštį. **Gali sukelti** miegustumą arba galvos svajingumą. **Sukelma** skurmiai okių dirginimą. **Toksiškas** vandens organizmams, sukilia galiausiai pakitusimus. **Siekiant išvengti** žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naujodaudingo instrukciją nuorodymis. **Stengtis** neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. **Mūvėti** apsauginius pirstines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti okių (veido) apsauginius priemones. **PRARIJUS:** nedelsiant skambinti į **APSINUODIJIMU** KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURA/**kreipktis į gydytoją** ar **NESKATINTI** vermo. **Jei** okių dirginimais nrepišeina: **kreipktis į gydytoją**. Laikyti gerai vedinimo vietoje. Taip lygiakalbi laikytis sandoriai dirbtuvių. **Sunkintekesių** reaguoti į jų išsivystančius ligos rodymus. **Naudojant linulinis teisės**, atsi reikiavimus. **Neiginti** vandenims augalų apsaugos produktui ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šešia paviršinio vandens telkiniu). **Vengti** taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių. **Siekiant** apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių. **Siekiant** apsaugoti netiksliniams augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

PRIEŠ NAUDODAMĮ AUGALŲ APSAUGOS  
PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

**SANDÉLIAVIMAS** - Saugoti nuo tiesioginių saulės spinduliu. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro, trąšų ir seklių. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai védinamoje patalpoje. Laikyti ne žemėsnėje kaip  $0^{\circ}\text{C}$  ir ne aukštesnėje kaip  $+35^{\circ}\text{C}$  temperatūroje.

Fest

**Leopard®** - selektiivne süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeastaste kõrreliste umbrohtude ning isekülvanud teravilja törjeks rapsil, söögi- ja suhkrupeedil, porgandil, kartulil, peakapsal, lillkapsal, brokolili, sibulal, küüslaugul, värskel hernel ja ool, öunapuuadeedades, linal, uitajamedel ja metsanduses.

Toodet võib ostaa ja kasutada ainult taime kaitsetunnistust omav isik.

**H304** Ilaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav **H319** Põhjustab tugevast silmade äriirust **H336** Vöö põhjustada unlust või peapõörutust **H411** Müringe veerorganismidele, pikajaline toime **P102** Hoida lästele kättesaamatus kohas **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/vahetust, kui see ei ole vaja, ja vältida ümberkäigu.

udu/duru/viitustatud ilme sisenemisamist • P<sub>20</sub> Kanda kaitsekindlaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemisi • P<sub>301+P310</sub>

**ALLAELAMISE KORRAL:** votta viivitamatud ühendust MÜRGISTUSEBAEKESKUSE/arsstiga • P<sub>305+P511+P338</sub> SILMA SATTUMISE KORRAL:

loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlätsed, kui neid kasutatakse ja kui need ei kerge eemaldada. Loputada veel kord • P<sub>337+P313</sub> Kuli silmade õrritus ei mõudu; pöördu arsti poolle • P<sub>331</sub> MITTE kutsuda esile oksendamist • P<sub>391</sub> Mahavoolund toode kokku koguda • P<sub>501</sub> Sisu/mahut kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH06 Corduv kokkupuude või põhjustada noha kuivust või lähenemist • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutusemaks välitiimiseks järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida vähendi või selle pakendi vette sattumisi (Seadmied pinnaväle lühadel mitte puhiastada/Vältida saastamist läbi laudu ja teede drenaažide).

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST  
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.**

**SÄILITAMINE** - Hoida otseste päikesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, veest, lõomasöödast, väetistest ja seemnetest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuril all 0°C ja üle +35°C.



# LEOPARD®



## Latvija

**Leopard®** - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglappju neuzlūk un lobjibū sārņapūj ierobežošanai ziemas un vasaras rapsā, cukurbiešu un lopbarības biešu, burķānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

**H304** Var izraisīt nāvi, ja nori vai iekļūst elpojelos • **H319** Izraisīs nopielnotu acu kairinājumu • **H336** Var izraisīt mīeganību vai reibonus • **H411** Tokisks ūdens organismim ar ilgstošām sekām • **EUH066** Atkārtoja iedarbību var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprāgtīšanu • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties jeelept smidzinājumā • **P280** Izmantonot izsargācimdos/ aizsargācimdos/ aicis aizsarsgs/ sejas aizsarsgs • **P301+P310 NORĀDĀSANA GADĪJUMĀ:**

nekaķējoties sozinātās ar SAINDĒSANĀS CENTRU vai ārstu • **P304 + P340** IELPOŠANĀS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svārīgu gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot • **P305 + P351 + P338 SASKĀRĒ AR ACIM:** uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • **P331 NEIZRAĪTSENĀS VĒRŠANĀ** • **P501** Atbrīvoties no saturā/tvertības, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības • **SP1** Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstētu tuvumā. Izsgarīties no plesñošanās caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargā ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstētēm • **SPe3** Lai aizsargātu jau iedzīgusus kultūraugus un cits ar ietlojumu nesaitītīs augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai laukumiemīceibā neizmantojamā zemei. Šīs nosacījumus nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platiņas ar vēl iedzīgusiem augiem.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefona numurs 112.

**UZGLĀBĀŠĀNA** - Uzglābot preparātu oriģinālā iepakojumā, bēriņiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsleždamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglābāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## Lietuva

**Leopard®** - selektīvus, sistēminis herbicidas naudojamas ziemīnu ir vasarinī rapsy, cukrinīų ir pašarinī runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstu, žiedinių kopūstu, brokolių, svogūnų, česenakų, zīriņu, pupu, lubinu, linu pailinošose, obely ir kriaušių pomēdiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametės ir daugiametės vienaskaitas pirkstoļos, javu pabiraos.

Skriftas profesionaliajam naudojimui.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvirīm arba skilinību. **Prasijis ierastas īrāpīvamojai rauki**, galbūt sulekti arī **Gelbėkāpīvamojai rauki**. Mieguistumguma arba galvos svajaismis • **Sukeliai smarku akūi dirginimą** • **Tokiskais vandens organizams, iekšķiela ilgalikais pakitimis** • Siekiant išvengti Žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikas, būtina vykdyst naudojimo instrukciju nurodymus. • **Stengtai nejķepēti rūko/ aerozolio** • **Mūvēta apsaugines pīrstines, devēti apsauginius drabuzus ir naudoti akūi (veido)** apsaugios priemones • **PRARIJUS:** nedeliskint skambinti ar **APINSUDOLIJUMI KONTROLIES IR INFORMACIJOS BIURA** / kreiptis ī gydytojā • **NESIKATINTI vērimo** • **Jei akūi dirginimais nepraeinās:** kreiptis ī gydytojā • Laikytīgi redinātīgumā vjetotie. Ielikylā kārtīgi sandarīt uzdrytīgā • **Surinkti īsteķejusiu mārkājā** • **Taipēdīgi salīnī palai nacionāliniūs seīsējumi** • **Neizmantojiet ūdeni** augulai apsaugos produktu ar jo pokutei (neplauti puršķīmē ierīgintu žāla povīšinio vandens telkinīju /vengti tarts par drenažu īš sodybu ar nuo keliu) • Siekiant apsaugoti vandens organizums, būtina išlaikyti 1 metro augulai apsaugs zonā iki povīšināto vandens telkinījūmās grīvojību • Siekiant apsaugoti netiksniņus augulai, būtina išlaikyti 10 metru apsaugs zonā iki ne zēmēs paskirties žemēs.

Apsinuodijimo atveju kreiptis ī **Apsinuodijumu kontroles ir informacijos biurā** telefona: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALU APSAUGOS PRODUKTA ATDZĪJĀI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!**

**SANDĒLIAVIMAS** - Saugoti nuo tiesīsgoinių Saulēs spindulīj. Saugoti nuo vāku. Laikytīgi atskrisnu maisto, vandens ir givulīšu pārāšu, trašķi ir sēklā. Laikytīgi uždaroto gāmyklas toraje gērai vēdināmo patalojoje. Laikytīgi ne zemesnejē kaip 0°C ir ne aukštesnejē kaip +35°C temperatūroje.

## Eesti

**Leopard®** - selektiivne süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste körreliste umbrughtude ning isekülvanud teravilja törjeks rapsil, söögi- ja suhkrupeedil, porgandil, kartulli, peakapsal, lillikapsal, brokoli, sibulil, küüslaugul, värskel hernal ja odil, õunapuuadeedas, linal, ilutaimede ja metsanduses.

Toode võib osta ja kasutada ainult taime kaitsetunnustust omav isik.

**H304** Ilaneelomisel või hingamisteedesse sattumisel või olla surmav • **H319** Põhjustab tugevat silmade ärkitust • **H336** Võib põhjustada unisust või peapõritust • **H411** Mürgine veorganismidele, pikajäiline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolmu/suutsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ains seisishegamist • **P280** Kanda kaitsekindi/kaitservastust/ kaitseprille/kaitsemaski • **P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL:** votta viitamata ühendust **MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/Artsgita • P305+P351+P338 SILMA SATTUMIUS KORRAL:** loputada mitme minutti jooksul ettevallikult veega. Eemaldada kontaktlätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid ei korda eemaldada. Loputada veega kor • **P337+P331** Kui silmade ärritus ei mõdu: pöörda arsti poolle • **P331** MITTE kutsuda esile oksendamist, • **P391** Mahavoolundil toode kokku koguda • **P50** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH066** Korduv kõrvalpuude võib põhjustada nahu kuivust voi lõhenemist • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendei või selle pakendi vette sattumist (Seadmied pinnaave läheval mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazi).

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.**

**SÄILITAMINE** - Hoida otse pääkesvalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, veest, loomasöödast, väetistest ja seemestest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C.



## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkura nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLĀ DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzērt, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cīmuds un slēgtus apavus. Novērt tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkta darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notirīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Leopard® ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežšanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burkānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

Herbicīds strauji absorbējas viendīglapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnies virsmas, apturot nezāļu augu augšanu. Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamās pazīmes – lapu krāsas maiņa – novērojamas pēc 3-4 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāļu jaunākajām lapām. Nezāles iet bojā pilnībā pēc 3-4 nedēļām. Ātri augošas nezāles tiek iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīglapju nezāles visjutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpata visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā.

Leopard® iedarbojas caur lapām un zaļajām auga daļām, tāpēc augsnes tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai.

Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Leopard® nesamazina tā efektivitāti.

## LIETOŠANA

Platību apstrādi ar Leopard® veic, kad nezāles ir aktīvi augošas. Augstākās herbicīda devas lieto, ja nezāles ir spēcīgi attīstītas, lielas un apstākli nav labvēlīgi nezāļu augšanai. Ziemāju labību sārņaugu iznīcināšanai ieteicams lietot augstāko Leopard® devu. Ložņu vārpata visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot, kad tai ir attīstītas 4-6 lapas (10-15 cm gara). Ja vārpata ir lielāka, lietot augstāko Leopard® devu.

Apstrādājamas kultūraugs	Nezāles	Nezāļu attīstības stadija	Deva, L/ha
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes, burkāni, kartupeļi, zirņi, pupas	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labību sārņaugi	2-5 lapas (AS 12-15)	1.0-1.5
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	4-6 lapas (AS 14-16)	2.0-2.5

Ūdens patēriņš:

200-300 L/ha

Apstrāžu skaits sezonā:

1 reize

Nogaidīšanas laiks: ziemas un vasaras rapsim, cukurbietēm un lopbarības bietēm - 100 dienas; kartupeļiem un burkāniem - 30 dienas; zirņiem un pupām - 40 dienas.

**Piezīme:** Iai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šīs nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.

#### Ierobejojumi

Mazāku darba šķidruma apjomu lietot, kad nezāles ir mazākas. Biezos sējumos un stādījumos un kad nezāles ir lielas, specīgi attīstītas, lietot lielāku darba šķidruma apjomu. Nezāles, kas dīgs pēc platību apstrādes ar Leopard®, netiks kontrolētas. Neveikt platību apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi un nezāles ir stresē situācijā, ka radījuši tādi faktori kā sals, sausums, pārieku liels mitrums, barības vielu deficitis, slimību un kaitēkļu bojājumi. Nezāles tiks efektīvāk iznīcinātas, ja apstrādi veiks, kad tās ir aktīvi augošas, ir silts un augsts un pietiekami mitrs. Ja augšanas apstākļi ir nepiemēroti augu augšanai (sausi, vēsi laika apstākļi, sāblīvēta augsne), Leopard® efektivitāte var būt zemāka, tāpēc šādos gadījumos ieteicams lietot augstākās Leopard® devas. Neveikt apstrādi, ja vēja ātrums > 4 m/s.

Starp apstrādi ar Leopard® un citiem herbicīdiem ievērot 7 dienu intervālu.

#### REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Leopard® satur darbīgo vietu etil-kvizalofops-P, kura saskaņā ar HRAC klasifikāciju pieder A grupas herbicīdiem un ir acetilkarboksilāzes inhibitoris (ACCCase). Rezistences veidošanās risku palielina cita ACCCase inhibitoru saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošana to pašu nezāļu ierobežošanai kultūrauga veģetācijas periodā. Ir pieļaujams lietot citu ACCCase inhibitoru saturošu herbicīdu, ja tas tiek lietots citā laikā un citu nezāļu ierobežošanai. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, nelietot Leopard® vai citu preparātu, kurš satur ACCCase inhibitoru, kā vienīgo ķīmisko metodi viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai augsekā.

#### SAVIETOJAMĪBA

Informāciju par Leopard® jaukšanas iespējām ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem meklēt ražotāja mājas lapā vai jautāt firmas pārstāvjiem.

#### DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Smidzinātājā ieļeji 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Leopard® daudzumu, tad ieļeji pārējo ūdeni. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzinot, lai tas visu laiku

būtu viendabīgas emulsijas veidā. Sagatavoto darba šķidrumu izlietot tūlīt pēc sagatavošanas.

Lietojet tikai tīru ūdeni.

Pēc lietošanas smidzinātājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

## PĀRSĒŠANA

Ja pēc apstrādes ar Leopard® pavasarī rodas nepieciešamība pārsēt, tad drīkst sēt un stādīt divdīglapju kultūraugus bez ierobežojumiem.

## IEPAKOJUMA UN PREPARĀTA ATLIEKU LIKVIDĒŠANA

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

Pēc preparāta izmantošanas tukšā tara 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru pēc tam var izmantot darba šķidruma gatavošanai ar Leopard®. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBA

Tokisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojet augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas ļauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā.

Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

## BENDRA INFORMACIJA

Leopard® – selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolių, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinų, linų pasėliuose, obelų ir kriausiu pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametės ir daugiametės vienaskiltės piktžoles, javų pabiras.

## VEIKIMO BŪDAS

Herbicidas greitai absorbuojamas per lapus ir pernešamas į vienaskiltės piktžolių antžeminius ir požeminius augimo taškus, kur sustabdė jų augimą. Matomi požymiai – lapų galuukų spalvos pasikeitimai – pastebimi po 7 dienų. Herbicio poveikis pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Piktžolės pilnai sunyksta po 3–4 savaičių. Sparčiai augančios piktžolės sunaikinamos greičiau ir geriau. Vienametės piktžolės jautriusios yra 2–4 lapelių, o varputis 4–6 lapų. Leopard® veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi. Lietus praėjus 2 valandoms po purškimo neturi įtakos produkto efektyvumui.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Zieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai:

Piktžolės	Piktžolių išsivystymo tarpsniai	Norma, L/ha
Vienametės vienaskiltės, javų pabiros	kai piktžolės turi 2-4 lapeliai	1,0–1,5
Daugiametės vienaskiltės	kai piktžolės turi 4-6 lapeliai	2,0–2,5

Obelų, kriausiu pomedžiai, dekoratyviniai augalai, miško želdiniai, miško medelynai:

Piktžolės	Piktžolių išsivystymo tarpsniai	Norma, L/ha
Vienametės ir daugiametės vienaskiltės	kai piktžolės turi 4-6 lapeliai	2,0–2,5

Leopard® purškiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Didesnes normas rekomenduojama naudoti, jei piktžolės yra didelės bei tuo atveju, kai sėlygos augalams augti yra nepalankios. Vienaskiltės piktžolės ir javų pabiro vieninių rapsų pasėliuose naikinamos rudeni. Naikinant žieminių javų pabiras naudokite didesnę Leopard® normą. Varpučiai geriausiai sunaikinami, kai jie turi 4–6 lapeliai (10–15 cm aukščio). Jeigu varpučiai yra didesni – naudokite didesnę produkto normą.

**Didžiausias purškimų skaičius: 1**

**Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 200–300 L/ha.**

## Pastabos

Mažesnis tirpalo kiekis naudojamas tuomet, kai piktžolės yra mažos. Jei pasėlis tankus, piktžolės didelės naudokite didesnį vandens kiekį.

Po purškimo sudygusios piktžolės nebus sunaikinamos. Nepurkškite, kai augalai ir piktžolės

Yra streso būsenoje. Stresą gali sukelti daugelis faktorių tokius kaip šalnos, sausra, užmirkimas, mikroelementų trūkumas, ligos ir kenkėjai. Piktžolės bus sunaikinamos geriau, jei jos aktyviai auga, šilta, kai pakankama dirvos drėgmė. Nepalankiomis augtų sąlygomis (sausra, vėsus oras, užmirkusios dirvos) Leopard® veikimas bus lėtesnis, todėl tokiomis sąlygomis naudokite didesnę produkto normą.

Augalų apsaugos produkto nenaudokite, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

## Kiti purškimai

Išlaikykite 7 dienų intervalą tarp purškimų Leopard® ir kitais herbicidais.

## TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

Tirpalo ruošimui naudokite švarų vandenį. Pusę purkštuvu talpos supilkite vandens ir įjunkite maišykļę. Į purkštuvu talpą supilkite reikalingą Leopard® kiekį. Supilkite likusį vandens kiekį ir maišykite tirpalą kol baigsite purkštį.

## SÉJOMAINA

Jei Leopard® nupurkštį paséliai dėl kokių nors priežasčių žūna, jidibus dirvą tą patį sezoną dviskilčiai augalai gali būti sodinami/séjami be aprūpoinymo.

## MAIŠYMAS

Informacijos apie Leopard® maišymą su kitaais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMAS

Jei pastebėjote, kad piktžolės tapo atsparios šiam herbicidui, tai jos gali būti atsparios ir kitaems herbicidams, kuriu sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos: kvizalofop-P-tefurilas, propakvizafopas, diklofop-metilas, fenoksaprop-P-etylitas, fluazifop-P-butilas, haloksifop-R-metilas, propakvizafopas, aloksidimas, kletodimas, setoksidimas, tralkoksidimas. Produktai, kuriu sudėtyje yra nors viena iš aukšciau išvardintų veikliųjų medžiagų, tame pačiame lauke gali būti naudojami ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

## SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriais lauko purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias

pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. **Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet koks sąlyčio su produkту. Štengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbtis prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei nejmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančią teisės aktų reikalavimų.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruootojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurkiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantais teisės aktais.

## PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (azoto oksidai, anglies oksidai, sieros oksidai). Gesinimo priemonės – vandens srovė, vandens dulksna, putos. Dėvėti kvépavimo takų apsaugą. Gesinimo vandenį sugerti smėliu ar žemėmis.

## PIRMOJI PAGALBA

**Ikvėpus:** išvesti asmenį į grynų orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išsimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Praribus:** Jei nukentėjusysis sajmoningas; skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandenį. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytoju:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymąq

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

## SANDĖLIAVIMAS

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro, trašų ir sėklų. Laikyti uždarose gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne žemesneje kaip 0°C ir ne aukštesneje kaip +35°C temperatūroje.

## PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytom aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

SPECIMEN

## TOIMEMEHHANISM

Herbitsiid imendub kiiresti üheiduleheliste umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse seal nii maapealsetesse kui maa-alustesse kasvukuhikutesse, peatades nende kasvu. Nähtavad sümpтомid - lehtede värvuse muutus - on jälgitavad 7 päeva pärast. Herbitsiidi efekt on märgatav esmajoones noortel lehtedel. Umbrohud surevad lõplikult 3-4 nädalaga. Intensiivselt kasvavad umbrohud hävitavad kiiremini ja paremini. Üheidulehelised umbrohud on köige tundlikumad 2-4 pärislehe staadiumis, orashein on köige paremini törjutav 4-6 pärislehe staadiumis. Kontaktse toime töttu mullatüüp toote efektiivsust ei mõjuta.

2 tundi pärast pritsimist vihm enam toote efektiivsust ei mõjuta.

## KASUTUSJUHEND

Raps, söogi- ja suhkrupeet, porgand, kartul, peakapsas, lillkapsas, brokoli, sibul, küüslauk, värsked hernes ja uba, linea

Umbrohud	Umbrohtude kasvufaas	Kulunorm, L/ha
Üheaastased üheidulehelised, isekülanud teravili	2-4 lehte (BBCH 12-14)	1.0 – 1.5
Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud	4-6 lehte (BBCH 14-16)	2.0 – 2.5

Viljapuuaiad, ilutaimed, metsandus:

Umbrohud	Umbrohtude kasvufaas	Kulunorm, L/ha
Üheaastased üheidulehelised, isekülanud teravili	2-4 lehte (BBCH 12-14)	1.0 – 1.5
Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud	4-6 lehte (BBCH 14-16)	2.0 – 2.5

Leopard™ pritsitakse umbrohtude aktiivse kasvu perioodil. Juhul kui umbrohud on suured ning tingimused taimede kasvuks ebasoodsad, soovitatatakse kasutada kõrgemaid kulunorme. Isekülanud taliterviljade tõrjeks soovitatatakse kasutada Leopard™ i kõrgemat kulunormi. Orashein on köige paremini törjutav 4-6 lehe (10-15 cm) faasis. Juhul kui orashein on suurem, kasutage toote kõrgemat kulunormi.

**Maksimaalne kasutuskordade arv: 1.**

Viimane pritsimine enne peedi koristamist: 100 päeva

Veekogus: 200-300 L/ha

## PIIRANGUD

Kui umbrohud on väikesed, tuleb kasutada väiksemat lahuse kogust. Tiheda taimiku ja suurte umbrohtude korral kasutage suuremat lahuse kogust. Umbrohud, mis idanevad pärast pritsimist, ei hävi. Ärge pritsige juhul, kui kultuur ja umbrohud on stressis. Stressi võivad põhjustada mitmed faktorid nagu öökülm, pöud, leostumine, mikroelementide puudus, haigused ning kahjurputukate

suur arvukus. Umbrohud alluvad paremini törjele oma aktiivse kasvu perioodil ja juhul, kui ilm on soe ning pinnas piisavalt niiske. Kui kasvutingimused on ebasoodsad (pöud, külm ilm, leostunud pinnas), on Leopard™'i efektiivsus madalam, mistõttu soovitatakse kasutada kõrgemat kulunormi. Mitte pritsida tuulise ilmaga (üle 4 m/s).

## TEISED TAIMEKAITSEPRITSIMISED

Leopard™'i ja teiste herbitsiididega pritsimise vahel tuleb hoida vähemalt 7-päevane ooteaeg.

## PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke pritsipaaik pooleldi veega, lisage vajalik kogus preparaati, käivitage segisti ning lisage ülejää nud vesi, samal ajal kogu aeg segades. Pritsimise ja selle vahega aeg peab segisti olema siisse lülitatud. Kogu pritsimislahus tuleb korraga ära kasutada. Lahuse valmistamiseks kasutage puhast vett.

## TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühjaks saanud pakendit 3 korda puhta veega, valage loputusvesi pritsi paaki pritsimislahusesse. Sulgege tühi pakend ning viige ohtlike jäätmete kogumiskoha.

Toote jäagid andke üle ohtlike jäätmete käitlejale.

## VILJAVAHELDUS

Ikalduse korral võib pärast Leopard™'i kasutamist samal pöllul ja samal kasvuperioodil ilma piiranguteta külvata või istutada kaheidulehelisi kultuure.

## SEGAMINE

Informatsiooni saamiseks Leopard™'i segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega vaadake tootja teabematerjale tema kodulehel või võtke ühendust tootja esindajaga.

## RESISTENTSUSE VÄLKAKUJUNEMINE

Kui märkate, et umbrohud on muutunud antud herbitsiidi suhtes resistentseks, võivad nad olla resistentsed ka teiste sama keemilise rühma herbitsiidide suhtes, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid: kvisolofop-P-tefurüül, metüldiklofop, fenoksaproop-P-etüül, fluasifop-P-butüül, haloksüfop-R-metüül, propakisafop, aloksidiim, kletodiim, setoksiidiim, tralkoxsiidiim. Tooteid, mis sisaldavad ülalpool märgitud toimeainet, ei tohi samal pöllul kasutada sagedamini kui üks kord kasvuperioodi kohta.

## TÖÖOHUTUS

Kanda spetsiaalset kemikaalikindlat kaitseriietust, nitriilkummist kindaid (mitte kasutada puuvilla või nahka), kaitseprill ja filtriga FF2/FF3 (EN 149) kaitsemaski. Vältida toote sattumist hingamisteedesse, silmadesse ja seedekulglasses. Vältida kokkupuudet nahaga. Töö ajal söömine, joomine ning suitsetamine on keelatud. Pärast töö lõpetamist pesta kaitserietus ja puhastada isikukaitsevahendid.

## TULEOHUTUS

Tuli võib tekitada kahjulikku suitsu (süsinioksiid, lämmastikoksiid, vesinikkloriid, vesinikfluoriid). Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veepritse. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid. Kustutusvesi absorbeerida liiva või mullaga.

## ESMAABI

**Sisseehingamisel:** viia kannatanu värske õhu kätte. Halva enesetunde tekkimisel pöörduda arsti poole.

**Kokkupuutel nahaga:** võtta seljast saastunud riuetus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka pehme seebi ja veega, misjärel loputada soojas veega.

Halva enesetunde või ärritusnähtude tekkimisel pöörduda arsti poole.

**Silma sattumisel:** hoida silmalaud lahti ja loputada silma puhta veega 20-30 minuti jooksul.

Pöörduda arsti poole.

**Allaneelamisel:** MITTE ESILE KUTSUDA OKSENDAMIST. Loputada suud veega.

Pöörduda arsti poole.

**Informatsioon arstile:** spetsiifilist vastumürki ei ole. Anda toetavat ravi. Ravida sümpomaatiliselt.

## SÄILITAMINE

Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele kättesaadatus kohas. Hoida eimal toiduainest, veest, loomasöödast, väetistest ja seemnetest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuril alla 0°C ja üle +35°C.

## MÄRKUS

Enne taimekaitsevahendi kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Tootja ei võta endale vastutust väljaspool tema kontrolli olevate faktorite poolt tekitatud kahjude eest. Köik soovitused preparaadi kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid kogemusi. Kuna preparaadi säilitamine ja kasutamine ei toimu tootja kontrolli all, vastutab kõigi võimalike kahjude eest kasutaja.

# LEOPARD®



LV - HERBICĪDS



LT - HERBICIDAS



EE - HERBITSIID

Darīgā viela:  
etil-kvizalofops-P 50 g/L (5.4 % w/w)

Preparatīvā forma:  
emulsijas koncentrāts  
Reģistrācijas Nr.: 0424

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš:

2 gadi no izgatavošanas datuma

oriģinālā, glabājot neatvērtā

iepakojumā.

Veikloji medžiaga:  
kvizalofop-P-etilas 50 g/L (5.4 % w/w)

Produktu forma:  
koncentruota emulsija  
Registracijos numeris:

0450H/13

Partijas Nr. ir pagaminimo data:

žiūréti ant iepakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Toimeaine:  
kvizalofop-P-etüül 50 g/L (5.4 % w/w)

Preparatiivne vorm:  
emulsjoonikontsentrāt (e.k.)  
Eesti reg. nr.:

0460/09.05.12

Partii nr. ja valmistamise kuupäev:

vaata pakendil

Aegumistähtaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /  
Registracijos savininkas/Registreerimise

haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,  
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad

Tālr.:/Tel.:/Tel.: +31 33 44 53 160

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Pārstāvniecība Latvijā:  
Tālr.: +371 2944 62 85

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/  
Tootja/pakkija:  
ADAMA Agan Ltd.  
P. O. Box 262, Ashdod,  
77102 Izraēla/Izraelis/israel

UN 3082

© ADAMA Agan Ltd.

4 x 5 L



ANELEOPARDLT/04/C1

T4588C\_07

LEOPARD®

# LEOPARD®



LV - HERBICĪDS  
LT - HERBICIDAS  
EE - HERBITSIID

Skanēt informāciju  
Nuskaity QR kodq  
QR-koodi lugemine



## Latvija

**Leopard®** - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendigļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burķanu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

**H304** Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpcelos •

**H319** Izraisa nopietnu acu kārīnājumu • **H336**

Var izraisīt miegainību vai reiboņus • **H411** Tokisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH066**

Atkārtotā iedarbība var radīt sausū ūdu vai izraisīt tās sprēgāšanu • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties ieelpot smidzinājumu • **P280** Izmantot aizsargcīmuds/aizsargdrēbes/ acu aizsargs/sejas aizsargs • **P301+P310**

**NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties sazināties ar SAINDEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu • **P304 +P340**


**IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:** izvest cietušo svāigā gaisā un turēt miera stāvkli, lai būtu ērti elpot

• **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas uz ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • **P331 NEIZRAISĪT** vemšanu • **P501** Atbrivoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības • **SP1**

Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsāgties no piesārñošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm • **SPe3** Lai aizsargātu jau izdigušus kultūraugus un cirtus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimesniecībā neizmantojamajai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir plātības ar vēl neizdigušiem augiem.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūnis 112.

**UZGLABĀŠANA** - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā, bēriem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.



## Lietuva

**Leopard®** - selektivus, sisteminius herbicidas naudojamas zieminių ir vasariniai rapsų, cukriniai ir pašarinių runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolii, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinių, linų pasėliuose, obelyų ir kriausiu pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško zeldiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametės ir daugiametės vienaskiltės piktžoles, jāvų papirbus.

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą • Prarisijs ir patekus į kvēpavimo takus, gali sukelti miržį • Galis sukelti mieguistumą arba galvos svaidimą • Sukeliai smarkų akijų dirginimą • Toksiškas vandens organizmams, sukeliai ilgaalkius pakitimius

- Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdysti naudojimo instrukcijos nurodymus • Stengtis neijkvēpti rāko/garų/aerozolio
- Mūvēti apsaugines pirtynes, dévēti apsauginius drabužius ir naudoti akijų (veido) apsaugos priemones
- PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURA/ kreiptis į gydytoją • NESKATINTI vėmimo • Jei akijų dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją • Laikytis gerai védinamojo vietoje. Talpyklą laikyti sandoriai uždarytą • Surinkti ištiekėjusią medžiągą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teises akty reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metryų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAIKYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!**

**SANDŽELIAVIMAS** - Saugoti nuo tiesioginių Saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų. Laikytis atskirai nuo maisto, vandens ir gyvuliu pašaro, trąšų ir sėklų. Laikytis uždaroje gamyklos taroje gerai védinamojo patalpoje. Laikytis ne žemesneje kaip 0°C ir ne aukštesneje kaip +35°C temperatūroje.

## Eesti

**Leopard®** - selektiivne süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude ning isekülvانud teravilja tõrjeks rapsil, söögi- ja suhkrupeel, porgandil, kartulil, peakapsal, lillkapsal, brokolil, sibulal, küüslaugul, värskel hernal ja oal, öunapuuaedades, linal, ilutaimedel ja metsanduses.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taime kaitsetunnistust omav isik.

**H304** Ilaneelamisel võib hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav • **H319** Pöhjustab tugevat silmade ärritust • **H336** Võib pöhjustada unisust või peapõöritudust • **H411** Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaadamus kohas • **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitsepille/kaitsemaski • **P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL:** võtta viivitamatava ühendust


MÜRGISTUSTEABEKUSE/arstiga • **P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL:**

Ilopudata mitme minutti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Lopudata veel kord • **P337+P313** Kui silmade õrriks ei mõudu: pöörduda arsti poolt • **P331 MITTE** kutsuda esile oksendamist • **P391** Mahavooolanud toode kokku koguda • **P501** Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH066** Korduv kokkupuude võib pöhjustada näha kuivust või lõhenemist • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmied pinnavee lächedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**ENNE TAIIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.**

**SÄILITAMINE** - Hoida otseste päikesevalguse eest. Hoida lastele kättesaadamus kohas. Hoida eemal toiduainest, veest, loomasöödast, väetistest ja seemnestest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C.

# LEOPARD®



LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA



BRIESMAS / PAVOJINGA / ETTEVAATUST

30 x 20 L



UN 3082

ANELEOBAL5LT/04/X

T4588P\_07



UAB  
"ADAMA Northern Europe"