



TIMELINE® FX



©ADAMA Agro Ltd.



HERBICĪDS/HERBICIDAS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagos

- florasulams/florasulamas 1,75 g/L
- fluoksipirs/fluoksipiras* 52,5 g/L
- pinoksalēns/pinoksaladens 30 g/L

Satur aizsargvielu/apsauginē medžiaga: meksil-klokvintocets / klokvintocet-meksilas 7,5 g/L (0,73%)

*produkte kaip fluoksipir-meptilas (fluoksipiro metilheptilo esteris) 75 g/L



Informācija / Informacija

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0767

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums: skaitīt uz iepakojuma
Derīgumo terminš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, globājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30

Platītojas:

UAB Adama Northern Europe

Vīršulišķi skg. 34

LT-05132, Vilnius

Lietuva

Tālr.: +370 52 108622



Skanet informāciju /
Nuskaitys QR kodu



SKALAKU TEISINGA



LIETUVA

Reģistracijos numeris: AS2-83H (2020)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiņrēti ant pakuočēs

Galojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvje:

Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,
tā adrese/Reģistracijos savininkas:

Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Polska/Polska

Tālr./Tel.: +370 52420017

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas:

Syngenta Crop Protection AG

Bāzele/Bazelis/Šveice/

Šveicarija/

UN3082

UZMANĪBU
ATSARGAI



L40485IPFR_02

**NO VARNISH
AREA**

5 L e



TIMELINE® FX

LATVIJA

Timeline® FX – Selekktīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīglapju un īsmūžu divdīglapju neuzņā ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikales un rudu sējumos.

• H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
• H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

• H361 Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzīmīsām bērnam. • H410 Loti toksisks ūdens organizismiem ar ilgtosām sekām. • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. • P261 Izvairīties ieelpot izgara/jomus/ smidzinājumus. • P280 Izmantot aizsardzīgumus/ aizsardzībēs/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsītumi: lūdziet mediku palīdzību. • P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.

• P362+P364 Novilk priesārno apģērbu un pirms atkārtotai lietošanas izmazgāt. • P391 Savākt izslēkstošā kšķidrumu. • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. • SP1 Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēcu tuvumā/ izsargāties no priesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. • SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. • SPE3 Lai aizsargātu neizdīgušus un izdīgušus kultūraugus un ar lejotojumu nesaistītu neizdīgušus un izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja smidzināt lieto 50% smidzinājuma nonēsi mazinošas sprauslas.

Avārijas gadījumā zinot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Timeline® FX – selektyvus sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienam-etes ir daugiametes vienskilties (dirvinę smilgoļu, svīdras, tuščiņu avīzā, peljnī pašaņēsēli) bei divskilties piktžoles žieminiuose ir vasarinuose kviečiuose, žieminiuose ir vasarinuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose pavasarij.

Skirtas profesionālijam naudojimui.

Sukelia smarku akīj dirginim • Gali suketi alergīnē odos reakciju • Iztariama, kad gali pakenksti negrimusiam kūdikiui. • Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgaiklius pakitimus • Siekiant išvengti žmonijai sveikatai ir aplinkai keliašos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Pries naudojimą gauti specifalias instrukcijas • Stengtis neķeikpti ruko, garu, aerozolio • Mūvēti apsaugines pīrstines, devēti apsauginius drabužus, naudoti akīj (veldo) apsaugos priemones • Jeigu sudringināma oda arba jā išberia: kreiptis j gydytojā • Jei akīj dirginimas nepraeina, kreiptis j gydytojā • Esant poveikui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis j gydytojā • Nusivilkti užterštušus drabužus ir išskalbti prieš vēl juos apsivelkant • Surinkti išteklējusī medīzīgi • Talpklā šķalīti pagal nacionālinis teisēs aktu reikalavimus • Neuzterši vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplati purškimo ierengini ūsalia paviršinā vandens telkinījū / vengti taršos per drenažā iš sodybā ar nuo keliu) • Siekiant apsaugoti vandens organizmamus, būtina išlaikyti 1 metru apsaugos zonā iki paviršinā vandens telkinījū ir melioracijas griovi • Siekiant apsaugoti netikslineus augalus būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zonā iki ne zemēs ūko paskirties zemēs arba 1 metro apsaugos zonā iki ne zemēs ūko paskirties zemēs sā 50 % dulksnq mažināmās purķstukais.

Apsnuodījimo atveju kreiptis j Apsnuodījim kontrolei ir informacijos biurā telefona:
8 52362052 arba 8 687 533 78.



Sandēliavimas – Laikyt gerai vēdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesīgojiņu, saulēs spīnduli pātalpoze, vaikams nepriekšinamose vietose, atskirai nuo maisto produkta ir pašārē bei lengvai uzsīdeganči medīzīgi ne aukštesnējē negu + 35°C ir ne zemesnējē negu 0°C temperatūroje.

Латвийский
ГОСТ Р ВВ
Безопасность

GRUPA 4 | 2 | 1 HERBICĪDS
GRUPĒ HERBICIDAS

UFI: 1GHM-ND8G-8V04-47WM



8 718077 008905



TIMELINE® FX



LATVIA

Timeline® FX – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles un rуду сејумос.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju • **H319** Izraisa nopielnu acu kairinājumu • **H361d** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedziņumās bērnam • **H410** Loti toksisks ūdens organismam ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību • **P261** Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumus • **P280** Izmantot aizsargācīmudus/ aizsargārēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus • **P333+P313** Ja rodas ādas iekaisums vai izīstumi: lūdziet mediku palīdzību • **P337+P313** Ja acu iekaisums nepārieta: lūdziet mediku palīdzību • **P362** +**P364** Novilkta piesārņotu apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt • **P391** Savākt izslākstošu šķidrumu • **P501** Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Niespērāt ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēcu tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalminiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslo līdz ūdenstilpēm un ūdenstēcem • **SPe3** Lai aizsargātu neizdīgušus un izdīgušus kultūraugus un ar ietōjumu nesaistītus neizdīgušus un izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslo līdz blakus laukam un/vai lauksaīniecība neizmantojamai zemei. Aizsargjoslo līdz blakus laukus vai lauksaīniecība neizmantojamai zemei nav jāievē, ja smidzinot lieto 50% smidzinājuma nonesi maizinošas sprauslas.

Avārijas gadījumā zinot Ugunsdzēšbas un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Timeline® FX – selektīvus sisteminio veikimo herbicīdos, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienskiltes (dirvine smilguole, svīdres, tuščiāgi avīž, pelnīj pasiūšēji) bei divskiltes piktolzes ziemīnuose ir vasarinuose kveicīsuose, ziemīnuose ir vasarinuose miežiūose, ziemīnuose kvietrujiuso ir rugiuose pavasari. Skirtas profesionalajam naudojimui.

Sukelia smarku akiu dirginīmug. • Gali sukelīt alergīnu odos reakciju. • Iたriama, kad gali pakenkti negrimusam kudikui. • Labai toksiska vandens organiznams, sukelia ilgaikniākās patolozijas. • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. • Stengtis nekvēpti rūko, garu, aerozolio. • Mūvēti apsaugines pīrstines, dévēti apsauginius drabužius, naudoti akiu (veido) apsaugos priemones. • Jeigu sudirgināmās arba išberia: kreiptis į gydytojā. • Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytojā. • Esant poveikii arba jeigu manūnomas poveikis: kreiptis į gydytojā. • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbtu pries vēl jūs apsivelkant. • Surinkti ištekejusią medžiagą. • Tālpulkļā šalinti pagal nacionālinės teisės aktu reikalavimus. • Neužtersti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo īrenginiu šalia paviršinio vandens telkiniu) / vengti taršos per drenažu iš sodybū ar nuo kelij. • Siekiant apsaugoti vandens organiznus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniu ir melioracijos griovi. • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zoną iki ne žemēs ūkio paskirties žemēs arba 1 metro apsaugos zoną iki ne žemēs ūkio paskirties žemēs su 50 % dulksnā mažinācias purštukais.

Apsinuodījimo atveju kreiptis į Apsinuodījumų kontrolēs ir informācijos biurā telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavīnas – Laikyt gerai vēdināmose, raknamose, apsaugotose nuo tiesīgojumiņu saulēs spindulīju patalpose, vaikams nepriēinamose vietose, atskirai nu no maisto produkta un pašarī bei lengvai uzsīdegančiā medžiagā ne aukstesnei negu + 35°C ir ne zemesnei negu 0°C temperatūroje.

UFI: 1GHM-ND8G-8V04-47WM

GRUPA
GRUPĒ 4 | 2 | 1 **HERBICĪDS**
HERBICIDAS

8 718077 008905



LATVIA

LIETUVA

atidaryti cia
atveriet šeit



PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniski aktivētā ogle. Neizraisīt vēsmānu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparātu nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanās, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīrām ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērs, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķimiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS

Timeline® FX ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, tas satur trīs darbīgās vielas no atšķirīgām ķimiskām klasēm, lai nodrošinātu plaša spektra viendīglapju un divdīglapju nezāļu kontroli.

Pinoksaņdēns pieder ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksaņdēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ieteikmē šūnu dalīšanos. Šīs pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāl mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā.

Otra darbīgā viela – florasulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām. Tas kavē aminoskābju biosintēzi un līdz ar to šūnu dalīšanos un nezāles iet bojā.

Fluroksipirs augā galvenokārt tiek uzņemts caur lapām, un nedaudz – caur saknēm. Tas izraisa auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, lapu čukurošanos. Fluroksipirs darbojas kā augu augšanas regulators, tas uzkrājas augu augšanas punktos un izraisa paātrinātu augšanu, nezāles iet bojā pāris nedēļu laikā.

IEDARBĪBAS SPEKTRS

Timeline® FX efektivitātē nezāļu ierobežošanā:

	Deva 1.5 L/ha	Deva 2.0 L/ha
Loti laba efektivitāte > 95%	Peļastīšu lapsaste (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Dārza vējgrīķis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Peļastīšu lapsaste (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Vējauza (<i>Avena fatua</i>) Parastā ruzdzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>) Kerainu madara (<i>Galium aparine</i>) Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria recutita</i>) Parastā virza (<i>Stellaria media</i>) Dārza vējgrīķis (<i>Fallopia convolvulus</i>)
Laba efektivitāte 85-94.9%	Vējauza (<i>Avena fatua</i>) Daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>) Parastā ruzdzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>) Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Parastā ruzdupuke (<i>Cyanus segetum</i>) Kerainu madara (<i>Galium aparine</i>) Tiruma kumelīte (<i>Tripleurospermum inodorum</i>) Ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria recutita</i>) Tiruma neaizmirstulīte (<i>Myosotis arvensis</i>) Zida magone (<i>Papaver rhoeas</i>) Lauka ilzīte (<i>Anthemis arvensis</i>) Daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>) Parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	Daudzziedu airene (<i>Lolium multiflorum</i>) Daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>) Lauka ilzīte (<i>Anthemis arvensis</i>) Parastā ruzdupuke (<i>Cyanus segetum</i>) Tiruma kumelīte (<i>Tripleurospermum inodorum</i>) Tiruma neaizmirstulīte (<i>Myosotis arvensis</i>) Zida magone (<i>Papaver rhoeas</i>)

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organismi	Preparāta deva L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, ruzi	Īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāles	1.5-2.0	Apsmidzināt sējumus pāvasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz karoglapas parādišanās stadijai (AS 20-37)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāles	1.5-2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz karoglapas parādišanās stadijai (AS 20-37)	-	1

PIEŽĪME

Lai aizsargātu neizdīgušus un izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus un izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja smidzinot lieto 50% smidzinājuma nenesi mazinošas sprauslas.

Vislabākā Timeline® FX iedarbība tiek nodrošināta, apsmidzinot jaunas, ātri augošas nezāles. Augšanai nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, sausums, auksts laiks vai biezas vaskveida lapas, pasliktina produkta iedarbības efektivitāti.

Ūdens patēriņš: 200-400 L/ha.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Smidzinātāja tvertnē ieļeji 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Timeline® FX daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens.

SAVIETOJAMĪBA

Par Timeline® FX savietojamību ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un par savietojamības lietderību interesēties firmas pārstāvniecībā.

KULTŪRAUGU IZTURĪBA

Lietojot Timeline® FX saskaņā ar instrukciju, to labi panes visas kviešu, tritikāles un rudzu šķirnes. Lietojot preparātu, ir iespējama vizuāla augu reakcija, kas ir īslaicīga un ražu nelabvēlīgi neietekmē.

PĒCKULTŪRAS

Platībām, kurās lietots Timeline® FX, nākošā gadā nav ierobežojumi kultūrauga izvēlē. Ja apstrādātā platība jāpārsēj pavasarī, tad, veicot seklu augsnēs apstrādi, pēc 14 dienām var sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, kukurūzu, vasaras rapsi, zirņus, soju, cukurbietes un saulespuķes.

Timeline® FX nedrīkst lietot auzās un labībā ar zālāju pasēju. Jāizvairās no smidzinājuma nokļūšanas uz blakus laukos esošajām kultūrām, īpaši uz auzām, daudzgadīgajām airenēm un kukurūzu.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Timeline® FX satur pinoksdēnu, kurš ir ACC inhibitoris (aizkavē enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi) un pēc HRAC klasifikācijas pieder A grupai. Florasulams ir ALS inhibitoris (kavē enzīma acetolaktāta sintēzi) un pēc HRAC klasificējās B grupā. Trešā darbīgā viela fluorokspirs ir izgatavots no piridinoksi skābes un izsauc augos aukšinā tipa reakcijas (auksīns ir viens no augu augšanas hormoniem), tas ir klasificēts HRAC O grupā.

Rezistences izveidošanās risks Timeline® FX gadījumā ir līdzīgs kā citiem HRAC A, B un O grupas herbicīdiem – tas ir vidējs. Rezistences veidošanās risks pastāv tādām nezālēm kā peļastīšu lapsaste, parastā rudzusmiļga, vējauza, airenēs, keraipu madara, kumelītes, zīda magone, tiruma zvēre un parastā virza.

Rezistences vadības stratēģijas pamatprincipi nezāļu ierobežošanai ar Timeline® FX ir:

- praksē piemērojet integrēto nezāļu vadības sistēmu;
- lai samazinātu rezistences izveidošanās risku, apstrādājiet jaunas, aktīvi augošas nezāles;
- veidojot bākas/produkta maišījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas periodā vai

- pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem;
- lietojiet pilnu ieteikto herbicīda devu un piemērotu apstrādes laiku;
- pēc apstrādes sekojiet līdz nezāju ierobežošanas efektivitātei un izpētiet katru nepilnīgi ierobežoto nezāļu, un nepieļaujiet, lai tā ražotu sēklas vai vairotas veģetativi.
- Timeline® FX lietojiet tikai vienu reizi sezonā.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

1. Pēc darba šķidruma izsmidzināšanas, uz lauka nekavējoties izskalot smidzinātāju no iekšpuses un noskalot no ārpuses ar tīru ūdeni.
2. Smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalot ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti smidzinātāju tīrīšanai, piemēram, *All Clear Extra*.
3. Smidzināšanas aparātu tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem līdzekļiem. Caurules, uzgali, ventili un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, mairot ūdeni, vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi – ūdenī, kam pievienots līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

IEPAKOJUMA UN PREPARĀTA ATLIEKU LIKVIDĒŠANA

Pēc iztukšošanas kannas vismaz 3 reizes izskalo ar tīru ūdeni un to izlieto darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot.

ŠĶIDRUMA IZŠĻAKSTIŠANĀS VAI NOPLŪDE

Izlījušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāgu skaidām vai augsnī, tad ar kimikāliju piesūkušos materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

UZGLABĀŠANAS ILGUMS

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

© Reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme.

SPECIMEN

LIETUVA

PRIEŠ PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėi.

VEIKIMO BŪDAS

TIMELINE® FX sudėtyje yra trys skirtingos veikimo būdų turinčios veiklosios medžiagos. Pinoksadenas yra selektyvi vienskitės piktžoles po sudygimo naikinanti veikloji medžiaga. Ji priklauso acetil-kofermento A karboksilazės (ACC) inhibitorių grupei, kurie stabdo ląstelių dauginimąsi. Pinoksadenas pasisavinamas per augalo lapus ir greitai išnešiojamas po meristeminius audinius. Piktžolės iš karto po purškimo nustoja augusios. Po kurio laiko lapai įgauna rausvą atspalvį, augalas pradeda ikti, lapai lengvai išsitraukia iš lapamakščių, o stiebas lengvai trūksta ties bambliais.

Florasulamas naikina dviskilties piktžoles. Ši veikloji medžiaga yra acetolaktato sintazės (ALS) inhibitorius, daugiausiai pasisavinamas per lapus.

Fluroksipiras taip pat naikina dviskilties piktžoles. Jis priklauso sintetinių auksinų grupei. Patekęs į augalą per lapus, fluroksipiras kaupiasi augimo kūgeliuose, sukelia neribotą augalo augimą ir žūtį.

Panaudojus TIMELINE® FX, esant palankioms augimo sąlygoms, jautrios piktžolės žūsta per 2-3 savaites.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

TIMELINE® FX naudojamas sudygusioms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių kvietrugų, žieminių rugių pasėliuose pavasarį.

Mažesnė norma (1,5 L/ha) naikina dirvines smilguoles (*Apera spica-venti*), tuščiąsias avižas (*Avena fatua*) ir dviskilties piktžoles. Didesnė norma (2,0 L/ha) naudojama, jei pasėlyje yra pelinių pašiaušelių (*Alopecurus myosuroides*) ir svidrių (*Lolium spp.*).

Augalai	Norma, L/ha	Naudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius per sezoną
Žieminiai kviečiai	1,5-2,0	Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37)	1
Žieminiai kvietrugiai, rugiai	1,5-2,0	Nuo trijų šoninių ūglių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 23-37)	1
Vasariniai kviečiai	1,5-2,0	Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37)	1
Žieminiai ir vasariniai miežiai	1,5-2,0	Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37)	1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 L/ha

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

Piktžolės	Piktžolių jautrumas*	
	Norma, 1,5 L/ha	Norma, 2,0 L/ha
Vienskiltės piktžolės:		
Tuščioji avīža (<i>Avena fatua</i>)	Jautri	Labai jautri
Pelinis pašiaušėlis (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	Jautri	Jautri
Gausiažidė svidrė (<i>Lolium multiflorum</i>)	Jautri	Jautri
Daugiametė svidrė (<i>Lolium perenne</i>)	Jautri	Jautri
Dirvinė smilguolė (<i>Apera spica-venti</i>)	Jautri	Labai jautri
Dviskiltės piktžolės:		
Rugiaigėlė (<i>Cyanus segetum</i>)	Jautri	Jautri
Kibasis lipikas (<i>Galium aparine</i>)	Jautri	Labai jautri
Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)	Jautri	Jautri
Vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Jautri	Labai jautri
Dirvinė neužmirtuolė (<i>Myosotis arvensis</i>)	Jautri	Jautri
Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>)	Jautri	Jautri
Vijoklinis pelėvirktis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Labai jautri	Labai jautri
Darzinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>)	Jautri	Labai jautri

*Labai jautri - veiksmingumas 95-100%, jautri - veiksmingumas 85-94,9%, vidutiniškai jautri - veiksmingumas 70-84,9%, vidutiniškai atspari - veiksmingumas 50-69,9%.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

TIMELINE® FX geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis silpnina produkto veiksmingumą.

Lietus 1 val. po purškimo **TIMELINE® FX** veiksmingumui įtakos neturi.

FITOTOKSIŠKUMAS

Panaudojus herbicidą **TIMELINE® FX**, javams gali pasireikšti lapų pabalimas, augimo sulėtėjimas ir deformacijos, tačiau šie simptomai yra laikini, greitai išnyksta ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.

SÉJOMAINA

Įprastai nuėmus derlių, apribojimų vėliau séjamiems augalamams néra.

Jei dėl kokių nors priežasčių pavasarį purkštį paselėja sunyko, nedelsiant galima atséti javais ir kukurūzais. Praėjus 14 dienų po purškimo, galima sėti rapsus, žirnius, pupas, soją, cukrinius runkelius ir saulėgržas.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. TIMELINE® FX mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

TIMELINE® FX sudėtyje yra 3 veiklosios medžiagos. Pagal veikimo būdą HRAC* pinoksadeną priskiria acetil-kofermento A karboksilazės (ACC) inhibitorių grupę (HRAC grupė 1), florasulamas yra acetolakato sintazės (ALS) inhibitorius (HRAC grupė 2), o fluorošpiras priklauso sintetinių auksinų grupė (HRAC grupė 4). Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo būdą turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku, rekomenduojama norma ir laboratorinės tyrimas patvirtina sumažėjusi jautrumą.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo naudojant TIMELINE® FX, būtina laikytis šių HRAC rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilius dirvos dirbimas);
- naudokite rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku; piktžolės yra jautriusios, kai aktyviai auga, yra jaunos;
- kadangi kryžminis atsparumas yra labai tikėtinai tiek tarp visų HRAC 2 grupės, tiek tarp visų HRAC 1 grupės veikliųjų medžiagų, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo būdo herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles; tai ypač aktualu laukuose, kur paplitusios didelę atsparumo išsivystymo riziką turinčios piktžolės tokios, kaip dirvinė smilguolė, pelinis pašiaušelis, aguona birulė, darzinė žiliūgė ir bekvapis šunramunis;
- panaudoje herbicidą, patirkinkite lauką, ar piktžolės buvo sunaikintos, neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sekliomis;
- išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis; jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

*HRAC – veiklos su atsparumu herbicidams komitetas (www.hracglobal.com).

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu!

Dirbant su neskietu produkту ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliestero audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Purškiant traktoriais lauko purkštuvaus būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti

iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę ir mūvėti pirštines. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškiniai ilgomis rankovėmis arba kombinezoną, avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinų žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metru apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamujų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių slyčio su produkту. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytojį ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymąq. Neskatinti vėmimo, sudėtyje yra naftos distiliatu ir/ar aromatiniių tirpikliai.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitinkinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiemis augalamams purkštį. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalą tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvu gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvu talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį TIMELINE® FX ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukelių metu maišytuvas turi būti įjungtas.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus iš purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvą talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenių išleiskite pro varzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdytį jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti gerai védinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių pataipose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktu pakuočės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujančio suspausto vandens srove) ar trigoubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuočei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuočės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantais teisės aktais. Nenaudoti tuščiosios pakuočės kitiems tikslams.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gali išsiivystyti ar egzistuoti atsparių piktočių, kurio ms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktočių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.



TIMELINE® FX



HERBICĪDS/HERBICIDAS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagos

● florasulams/florasulamas	1,75 g/L
● fluroksipirs/fluroksipiras*.	52,5 g/L
● pinoksdāns/pinoksdadenas	30 g/L

Satur aizsargvielu/apsauginē medžiaga: meksil-klokvintocets / klokvintocet-meksilas 7,5 g/L (0,73%)

*produkte kaip fluroksipir-meptilas (fluroksipiro metilheptilo esteris) 75 g/L

Informācija / Informacija

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0767

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums: skatit uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30

Platītojas:

UAB Adama Northern Europe

Viršulišķi skg. 34

LT-05132, Vilnius

Lietuva

Tālr.: +370 52 108622

**Skanet informacijai /
Nuskaitysi QR kodā**

1404850CFR_02



SKALAUK TEISINGAI

UN3082

8 718077 009834

GRUPA
GRUPĒ

4 | 2 | 1 HERBICĪDS
HERBICIDAS

LATVIJA

Timeline® FX – Selekktīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendigļlapju un īsmūža divdigļlapju nezāju ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miezu, vasaras miežu, ziemas tritikales un ruzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisko ādas reakciju • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu • H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzīvumam bērnam • H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu • P280 Izmantot aizsargācīdus/aizsargādibes/acu aizsargus/sejas aizsargs • P333+P313 Ja rodas ādas iekāsums vai izsitumi: lūdziet mediku palīdzību • P337+P313 Ja acu iekāsums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību • P362+P364 Novilkst piesārnoto apgrēbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt • P391 Savākt izslēgtāto šķidrumu • P501 Atbriyoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecu tuvumā/izsārtāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm • SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus un izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus un izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja smidziniet lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Timeline® FX – selektivus sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametės vienskielės (dirvine smilguolę, svīdres, tuščiąjų avižų, pelinį pašiaušelį) bei dviskilės plikžolių zieminiuose ir vasarinuose kveičiuose, zieminiuose ir vasarinuose miežiuose, zieminiuose kvetrugiuose ir rugiuose pavasarį.

Skirtas profesionālijam naudojimui.

Sukelia smarķu akių dirginību. • Gali sukelti alergiņu odos reakciją • Itariama, kad gali pakenkti negūstamus kūdikiui • Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaišķiši pakitimis • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliatos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas • Stengtis nejķepēti rūko, garu, aerozolio • Māvēti apsaugines pīrstines, dēvēti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Jeigu sudirginame oda arba ją išberia: kreiptis į gydytojā • Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytojā • Esant poveikui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytojā • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbtī pries vēl juos apsilankant • Surinkti išteklējusią medžiagą • Talpyklą salinti pagal nacionālinės teisės aktų reikalavimus • Neužterštī vandens augaly apsaugos produktu ar jāpakuoti (neplauti purškimo īrenginių šalia paviršinio vandens telkinii / vengti tarsiņos pēdām) • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne zemes ūkio paskirties zemes su 50 % dulksnų mažinācias purkštukais. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolēs ir informacijos biuru telefona: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavimas – Laikyt gerai vēdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulēs spindulīju patopale, vaikus neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktu ir pašarū bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnē negu +35°C ir ne zemesnē negu 0°C temperatūroje.



4 x 5 L



TIMELINE® FX



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



! UZMANĪBU/ATSARGIAI



UN3082

L40485PAAR_02

30 x 20 L