



TAIFUN® B



ADAMA

©ADAMA Deutschland GmbH



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

**šķīstošs koncentrāts/ vandens
tīrpalas/ vesilahus (SL)**



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga/Toimeaine

● glifosāts/glifosatas/glūfosaat 360 g/L (30.7 % w/w)



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0027
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2944 62 85



EESTI

Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06
Partiit nr. ja valmīstamīse kuupāev: vaata pakendilt
Sāilivusaeg: 2 aastat



LIETUVA

Registrācijas numeris: AS2-55H(2018)
Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +8 5 210 86 22

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese./Registrācijas savininkas/Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nīderlande/Nyderlandai/
Madalmaad
Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/lisrael

HOIATUS



Skānet informācijai /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine



SKALAIK TEISINGAI

UN3082

**NO VARNISH
AREA**


L73IPFR_07

20 L e



JN 3082

**ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (GLYPHOSATE
ISOPROPYLAMINE)**





TAIFUN® B



L73EIPBB_07

LATVIJA

TAIFUN® B – Vispārējs sistēmas iedrabības herbicīds īsmaiņu un daudzgadīgo vieniģlappaju un divģlappaju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai kultūrāugu sējamos rugināie pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un kukurbiēs, sīpolu un burkānu sējamos pirms kultūrāugu sadīgšanas, zirņu un lauka pupu sējamos pirms ražas novākšanas, tīrumos pirms kultūrāugu sējas vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, smiltsērķku, jānogu, upenu, ērkšķoņu un krūmmeļu stādījumos, zālajos, skujņu koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebēs. ● **P501** Atbrīvoties no saturā/vvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesāņrot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SP3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. ● **SP3** Lai aizsargātu izdigušus kultūrāugus un ar lietojumu neasistētus izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla nav jāievēro, ja preparāta devai 1,5-2,0 L/ha lieta 50% smidzinājuma nenessi mazinošas sprauslas, preparāta devai 2,0-5,0 L/ha lieta 75% smidzinājuma nenessi mazinošas sprauslas, preparāta devai 5,0 L/ha lieta 90% smidzinājuma nenessi mazinošas sprauslas. ● **SP4** Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu neasistētus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plītnēm, brūģu un citās vietās ar augstu noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

TAIFUN® B – sistēmiskais herbicīds, ko izmanto vispārējās sistēmas iedrabības herbicīds īsmaiņu un daudzgadīgo vieniģlappaju un divģlappaju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai kultūrāugu sējamos rugināie pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un kukurbiēs, sīpolu un burkānu sējamos pirms kultūrāugu sadīgšanas, zirņu un lauka pupu sējamos pirms ražas novākšanas, tīrumos pirms kultūrāugu sējas vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, smiltsērķku, jānogu, upenu, ērkšķoņu un krūmmeļu stādījumos, zālajos, skujņu koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

Sīkrtas profesionalijam naudojimai.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus. ● 2,4 procento mišinio sudaro nežinoma toksikuma įkvėpus sudedamosios dalys. ● Mūvėti apsaugines pirštines. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinį, vengti taršos per drenąž iš sodybu ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinį ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netiklinius augus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites draudžiamą purškinti pasėliu ir kitus plotus, kuriuose yra žydinčių piktžolių nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 537 78.

Sandėliavimas – Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje.

EESTI

TAIFUN® B – ūldhāvitava toimega herbitsiid orashēna ja teiste lūhi- ja pikalēste, un m- rohtude tārks rohuladul, kesadel, tera- vilja kōrrepāduldel, seeme- ja luuviljalēste viljapuude ning marijapōsoste reavahede, mitepāllumjanduslikel adadel, metsataim- lates, puukoolides, pōllukultuuridel ning vōrmi kollete hāvtamises ristikus ja lutsernis, tārka- meelseelst kartulil ning suhkrupeedil, koristu- seelseelst hernel ja pōldoal.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguvājakutel ja teravishoiasutuste vahetus lāheduses.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks nārvutamiseks vōi kuivatamiseks.

Vahendiga tōedeldud adadel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada looma- sōadaks.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada pōllumajanduskultuuride gitsēmise ajal ja ka siis, kui tōedeldaval lalal esineb õitsvat umbruhtu.

Ilma taimekaitsetunnistuse ta kasutaja on lubatud pritsida kuni 100 m² vōi 0,5h pāevas.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohu- tamise vāitamiseks jārgida kasutusjuhendit. ● **H411** Mūrgine veogeograimidele, pikaajaline toime. ● **P102** Hoida lāste katesaamatus kohas. ● **P591** Mahavoolanud toode kokku koguda. ● **SP1** Vāitida vahendi vōi selle pakendi vette seaturist (See dremid pinnovee lāhedal mitte puhastada/Vāitida seadustamist lābe- lauda ja teede drenaažide). ● **SP3** Mitte- sihtmārktaimede kaitsmiseks pida kinni kulunormile vastavast puhvervōndite ja triivi vāhendavate otsikute kombinatsioonist, mille leib infolehel vastavast tabelist.

Hādaabi telefon 112. Mūrgistusteabekeskuse lūhinumber 16662. Pinna- ja pōhjavee kaitse eesmārgil toote kasutamisel jārgida Pōllumajandusministri 29.11.2011 mārrest nr 90 „Taimekaitse- vahendi kasutamise ja hoiukoha tāpsemad nōuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasu- tuspriiranguid.

Hoiustamine – Hoida ainult originaalpakendi, jahedas, hāsti ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida kulumise eest.

UFI: TDTH-4177-900X-3E17





LATVIJA

TAIFUN® B – Vispārējās sistēmas iedarbības herbicīds smūka un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai kultūraugā sējumas rugainē pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un cukurbietēs, stipulu un burkānu sējumas pirms kultūrauga sadīgšanas, zirņu un lauka pupu sējumas pirms ražas novākšanas, tīrumos pirms kultūraug sējuma vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, smiltsērķuku, jāņogu, zelēņu, ērkšķogu un krūmleņņu stādījumos, zālājos, skujju koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platības/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādē.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes. ● **P501** Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu un pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu izdigušus kultūraugus un ar lietotāju nesaistītus izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamiem zemei. Aizsargāšana nav jāievēro, ja preparāta devai 1,5–2,0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nesei maznozāšes sprauslas, preparāta devai 2,0–5,0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nesei maznozāšes sprauslas, preparāta devai 5,0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nesei maznozāšes sprauslas. ● **SPe4** Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietotāju nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz neausrullādīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas ledzīvotāju grupas. Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

TAIFUN® B – sistēmiskais herbicīds naudojamas vienmērums ir daugiamašems piktzālems naikinti žirniuose ir pašarīšes pupose prieš derliaus nuėmimą, pudynuose, laukuose po derliaus nuėmimą, ražienose, bulvėse iki sudymojo, cukriniuose runkeluose iki sudymojo, vaismėdių (obelių ir kriaušių) pomeđiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, kultūrinėse ir kitose pievose nupjovus paskutinę žolę. Taip tap naudojamas medelynam purškiant pomeđiuos, ne žemės ūkio paskirties plotams, miškininkystėje ir miško medelynuose (energetinis miškas, spygliuoliai ir lapuočiai medžiai) nepageidaujama žolėne ir sumedėjusiai augmenijai naikinti. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● 2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. ● Mūvėti apsaugines pirštines. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio, vengti taršos per drenąž iš sodybrų ar nuo kelio). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Dėmesio! Siekiant apsaugoti būna draudžiama purkšti pašėliu ir kitus plotus, kuriuose yra žydinčių piktžolių nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Apsinuojdijimo atveju kreiptis į Apsinuojdijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje.

EESTI

TAIFUN® B – ūldhāvitava toimega herbitsiid orashina ja teiste lāhi- ja pikaaaliste umbrohtude tōrjeks rohumaael, kesadel, teravija kōrrepõladel, seemne- ja luuviljaliste viljapudve ning marjapõõsaste eevahedes, mittepõlluajadussidudel aladel, metsataimlates, puukoolides, pānduktuuridel ning vōrmi kollete hāvitamiseks ristiskus ja lūternis, tārkmiseelset kartulil ning suhkrupeeldil, koristuseelset hernel ja pōldool.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks nürvatamiseks või kuivatamiseks. Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasõdaks. Taimkaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. Ilma taimkaitsetunnistusega kasvatajal on lubatud pritsida kuni 100 m² või 0,5h päevas.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **H411** Müragne veegorganismidele, pikaajaline toime. ● **P102** Hoida lastele kättesaamata kohas. ● **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. ● **SP1** Vältida vihande või selle pakendi vette sattumist (See/dmeid pinnevee lähedal mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Mittesihtimärkaimede kaitseks pidade kinni kulnurmole vastavast puhvervōndite ja triivi vāhendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteeabekeskuse lühinumber 16622. Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministeri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendite kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeasutusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest. **UFI: TDTH-417T-900X-3E1T**

GRUPA	HERBICIDS
GRUPÉ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID

8 718077 000527

L731PBB_07



PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs **67042473**

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darboties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Taifun® B ir sistēmas iedarbības herbicīds. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām - pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās. Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifun® B izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un tās ir sasniegušas 10-15 cm un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam. Minimālā gaisa temperatūra +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc smidzināšanas var samazināt efektivitāti. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām.

Mazāku platību apstrādei, piemēram, lauku māju apkārtnē, ceļmalas un žogmales, platības zem elektriskajām līnijām, ieteicams lietot muguras smidzinātāju ar darba spiedienu 1.5-3 atmosfēras. Patēriņa norma: 0.2 L Taifun® B uz 10 L ūdens. Dotais darba šķidrums daudzums ir pietiekams 500 m² apsmidzināšanai.

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kultūraugu sējumi rugainē pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	2.0-3.5	Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	-	1
Kartupeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5	Apsmidzināt stādījumus pēc stādīšanas pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Nelietot stādījumos sēklas materiāla ieguvei un stādījumos, kur izmantots diedzēts stādāmais materiāls.	-	1
Cukurbietes, sīpoli, burkāni	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5	Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	-	1
Zirņi, lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklīs ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklas paredzētos sējumus.	10	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-6.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-6.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-5.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumu pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties auglaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus.	-	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumu pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties auglaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus.	-	2
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1 daļa preparāta 2 daļās ūdens jeb 33%	Apstrādāt stādījumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties auglaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas.	-	1
Smiltisērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	1

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Smiltsērķšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	2
Jāņogas*, upenes*, ērķšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	1
Jāņogas*, upenes*, ērķšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	2
Jāņogas*, upenes*, ērķšķogas*, krūmmellenes* (neražojoši stādījumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	1
Jāņogas*, upenes*, ērķšķogas*, krūmmellenes* (neražojoši stādījumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	2
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas. Nepieļaut ganīšanu uz apstrādātās platības	-	1

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0- 3.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ļabi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas un nezāles ir 10-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.	-	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1 daļa preparāta 2 daļās ūdens jeb 33%	Apstrādāt stādījumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru.	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas caurulvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas	-	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis - atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Neveikt apstrādi pavasarī aktīvas sulu cirkulācijas laikā. Darba šķidruma koncentrācija 20%	-	1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla nav jāievēro, ja preparāta devai 1.5-2.0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devai 2.0-5.0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devai 5.0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2.88 kg/ha sezonā vienā laukā, lietojot šo vai citu glifosātu saturošu līdzekli”.

Augsnes tips: Taifun® B tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var lietot visu tipu augsnēs.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

SAKRATĪTĪ IEPAKOJUMU PIRMS LIETOŠANAS. Piepildīt ½ smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Pievienot nepieciešamo daudzumu TAIFUN® B smidzinātāja tvertnē un piepildīt atlikušo ūdens daudzumu. Turpināt darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Viss darba šķidrums jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas. Ieteicams izmantot 2-3 bar spiedienu smidzināšanas laikā. Pirms un pēc TAIFUN® B lietošanas viss smidzinātājs ir rūpīgi jāiztīra, lietojot tīru ūdeni un ievērojot tehnikas ražotāja rekomendācijas.

SMIDZINĀTĀJA MAZGĀŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Jebkura nezāļu populācija var saturēt augus, kas ir dabiski vairāk tolerantā vai izturīgi pret noteiktiem herbicīdiem, kas var novest pie zemas kontroles efektivitātes, izmantojot šos produktus. Gligfosāts ir G grupas herbicīds, pamatojoties uz Herbicīdu rezistences rīcības komitejas (HRAC) darbības veidu klasifikāciju.

Stratēģija, lai aizkavētu herbicīdu rezistences attīstību un to pārvaldītu, ir jāpieņem, pamatojoties uz vietējām vajadzībām un integrētu diversificētu nezāļu pārvaldību. Tas ietver pareizu herbicīdu lietošanu, integrējot dažādus darbības mehānismus, un/vai izmantojot citas kultūras vai mehāniskās prakses:

- sekojiet etiķetes ieteikumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka pielietojums tiek veikts pareizā nezāļu attīstības stadijā, piemērotos klimatiskos apstākļos un lietojot pareizo devu;
- optimizējiet instrumentu klāsta izmantošanu, kas ir daļa no normālas ražas vai zemes virsmas pārvaldības programmas, lai pārvaldītu nezāļu augšanu;
- samaziniet nezāļu invāzijas izplatīšanās risku; nodrošiniet, lai saimniecības aprikojums būtu tīrs no augsnes un veģetācijas, pārviototies starp laukiem;
- vienmēr ievērojiet labu izsmidzināšanu praksi, lai sasniegtu efektīvu nezāļu kontroli:

izsmidzināšanas iekārta ir periodiski jāpārbauda (piemēram, pilnvarotām personām); dozējiet un smidziniet precīzi - kalibrējiet smidzinātāju un izveidojiet pareiza daudzuma smidzināšanas

maisījumu platībai, kas jāapstrādā:

izmantojiet pareizas sprauslas, lai maksimāli pārklātu nezāles ar minimālo izsmidzināšanas plūsmu; pielietojiet tikai piemērotos laika apstākļos; uzraugiet nezāles pēc pielietojuma, pievēršot uzmanību iespējamām kontroles problēmām; kontrolējiet citas, platībās palikušās mērķa nezāles mehāniski vai ar reģistrētiem efektīviem herbicīdiem, kas atšķiras no glifosāta, pirms tās ražo sēklas.

Papildu informāciju varat saņemt no HRAC (<http://www.hracglobal.com/>), jūsu izplatītāja, oficiāla paplašinātā pakalpojumu dienesta vai vietējā kompānijas pārstāvja.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM

Taifun® B efektivitātes palielināšanai to var jaukt ar 2.4-D grupas preparātiem, bet ne sāļus saturošiem. Herbicīdus, kuri satur darbīgās vielas 2,4-D vai MCPA, var izsmidzināt 2-7 dienas pēc apstrādes ar Taifun® B.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņojiet ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

DĒRĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® Reģistrēta ADAMA Group tirdzniecības zīme.

LITUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Taifun® B yra sisteminis herbicidas. Taifun® B veiklioji medžiaga – glifosatas, absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis vegetacijos metu. Taifun® B poveikis augalams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Taifun® B prieš varputį efektyviausias, kai varputis turi 3 -6 lapelius ir yra 15 cm aukščiau.

Taifun® B efektyviausiai veikia, kai temperatūra aukštesnė kaip +14 °C, pakankamai drėgmės ir augalams sukauptus vešlią lapiją. Nerekomenduojama purkšti lyjant, taip pat jei per artimiausias 4 valandas numatomas lietus.

PURŠKIMO TECHNIKA

Taifun® B galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti rankinius, nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam hektarui išpurkšti 200-300 litrų tirpalo, purškimo slėgiui esant 2-3 barams, o važiavimo greičiui ne didesniai kaip 7-8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patikrinkite purkštuvo siurbį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudokite tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuoatą dieną.

TIRPALO PARUOŠIMO TVARKA

Į purkštuvą talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun® B kiekis. Įjungiamas purkštuvo maišytuvai. Supilamas trūkstantas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Išjungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti išjungtą.

NAUDOJIMAS

Žirniams ir pašarinėms pupoms prieš derliaus nuėmimą

Norma: 3,0–4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėliai purškiami, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 10 dienų.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 L/ha.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose.

Pūdyams

Norma: 2,0–6,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiamesės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-300 L/ha.

Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo

Norma: 3,0–6,0 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiamesės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Po derliaus nuėmimo surinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms suželti. Purškšti, kai varputis turi 3-6 lapelius.

Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 50-300 L/ha.

Ražienoms

Norma: 2,0 - 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškšti, kai varputis turi 3 – 6 lapelius ir yra 15-20 cm aukščio.

Siekiant efektyvaus rezultato, šiaudai iš lauko turi būti išvežti. Purškiant po sėjos, sėklos turi būti giliai dirvoje.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50 -200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

Sudygusių piktžolių tarp kultūrinių augalų naikinimui aplikacijos (tepimo) būdu

Norma: 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens.

Naikina vienmetes ir daugiameses piktžoles.

Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo kultūrinių augalų viršūnių. Vengti skiedinio nutekėjimo ant kultūrinių augalų

Didžiausias naudojimų skaičius – 1.

Bulvėms iki sudygimo

Norma: 2,0 - 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

Cukriniams runkeliams prieš sudygimą

Norma: 2,0 - 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50 -200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

Vaismedžių (obelių ir kriaušių) pomedžiams

Norma: 1,5 – 4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.

Naudokite po derliaus nuėmimo iki pavasario, prieš vaisių pasirodymą.

Didžiausias purškimų skaičius – 2.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-750 L/ha.

Naudojant 1,5 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Vaismedžių (obelių ir kriaušių) pomedžiams - aplikacija (tepimas)

Norma: 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens.

Naikina vienmetes ir daugiameses piktžoles.

Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Venkite tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Nelieskite medžių šakų ar lapų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Uogakrūmių pokrūmiams

Norma: 2,0 – 4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaiskrūmių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse

Norma: 3,0–4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei

krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio – rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

Kultūrinėms ir kitoms pievoms nupjovus paskutinę žolę

Norma: 3,0 – 6,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Po purškimo 10 dienų ne pradėti žemės darbai.

Nenaudojama pievose, skirtose pašarų gamybai.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-300 L/ha.

Medelynams

Norma: 200 mL Taifun® B ir 10 L vandens

Naikina vienmetes ir daugiameses piktžoles.

Naudojamas nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais.

Pavienius kelmus/augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurie turi išlikti. Maksimali leidžiama produkto naudojimo norma yra 0,4 dL/100 m² su 2 % praskiedimu.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams)

Norma: 3,0 – 6,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes.

Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

Miškas: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose

Norma: 3,0 – 6,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Geriausias laikas purkšti, siekiant apsaugoti jaunų medelių kamienus, yra rugpjūtis, kai medžių augimas sustoja.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-750 L/ha.

Miškas: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose, kai medžiai yra 1 ir daugiau metų

Norma: 2,0 – 6,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 L/ha.

Miškas energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose - aplikacija (tepimas).

Norma: 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens

Naikina vienmetes ir daugiametes piktžoles.

Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinį augalų. Saugokite, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir/ar lapų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Miškas: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose (kelmų naikinimui)

Norma: 200 mL „Taifun® B“ ir 10 L vandens

Purškiamas nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais.

Naikina medžių ir krūmų kelmus.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Taifun® B mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintasi.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Nenaudoti Taifun® B atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Taifun® B mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

PIKTŽOLIŲ ATSPARUMO KONTROLĖ

Veiklioji medžiaga glifosatas priklauso enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės inhibitoriams (EPSP), HRAC grupė G. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

- Laikykitės etiketėje pateikiamų rekomendacijų. Ypač svarbu, kad piktžolės būtų apdorotos tinkamoje augimo stadijoje, tinkamomis oro sąlygomis ir reikiamu produkto kiekiu.
- Svarbi piktžolių kontrolės sąlyga (žemės ūkio ir kitos paskirties plotuose) yra tinkamai parinkta purškimo įranga. Siekiant sumažinti piktžolių išplitimo pavojų, iš vieno lauko į kitą perkeliama ūkio įranga turi būti

švari, ant jos negali būti dirvos arba augalų likučiai.

- Kad būtų galima efektyviai kontroliuoti piktžolių augimą, būtina laikytis geros purškimo praktikos taisyklių.
- Naudokite reikiamą produkto kiekį ir tiksliai purškite. Naudokite tinkamus purškštukus, kuriais būtų padengiami kuo didesni piktžolių plotai naudojant kuo mažiau tirpalo.
- Purškite tik tinkamomis oro sąlygomis, kai piktžolės nėra paveiktos aukštos temperatūros, šalčio, sausros, nėra pernelyg drėgna. Purškiant neturi būti jokių kritulių. Purškite esant tinkamam vėjo greičiui.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).

Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko ar rankiniais, nugariniais purškštuvais, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²). Dirbant purškštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Tapant kelmus, piktžoles rankiniu būdu, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus prieduodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje, taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Minimalus herbicido galiojimo laikas: 2 metai (5 - 35°C temperatūroje).

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už herbicido kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei herbicidas netinkamai saugomas ir naudojamas.

EESTI

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödadest.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena kõrvaldada ohutult.

KESKKONNAOHTLIKUS

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

ETTEVAATUSABINÕUD

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

HOIUSTAMINE

Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbinud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TAARA KAHJUTUSTAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

ESMAABI

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Silmalaud peavad olema avatud. Võtta välja kontaktläätsed.

Pöörduda arsti poole

Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

TOIME ISELOOMUSTUS

Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt

3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning loputa jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hooldu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

KASUTAMINE

Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihhtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

Mittepritsitav puhervöönd meetrites				
Kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
2 L/ha	5	0	0	0
3 L/ha		5		
3,5 L/ha			5	
4 L/ha				
6 L/ha		5		

Koristuseelne umbrohtõrje hernel ja põldoal

Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30%. Ooteaeg 10 kuni 14 päeva enne koristust.

Mitte kasutada seemnekasvatuses.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Kõrrepõllud

Teravilja ja põllukultuuride koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-5 pärisleheni. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Tõrjub roomjuurelised pikaealised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaealised umbrohud.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

Rohumaad

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjearg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Kesad

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Ristik, lutsern

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Kulunorm 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Marjapõõsaste reavahed

JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Kändude töötlemine

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaati känduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Kulunorm 2-4 L/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 50-200 L/ha

Puukoolid

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Kulunorm 2-4 L/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 200-300 L/ha

Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Kulunorm: 2L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 100 ml Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Põllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)

Isekülvanud põllukultuurid ning lühi- ja pikaealised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on

vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGI HOOLEGA, et põllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.

Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

Tärgamiseelne umbrohutõrje kartulil

Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 L/ha

Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 L/ha

Vee kulu 50-200 L/ha.

Tärgamiseelne umbrohutõrje suhkruppeedil

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 L/ha

Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 L/ha

Vee kulu 50-200 L/ha.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.



TAIFUN[®] B



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



//HOIATUS



UN3082

SPECIMEN

L73PAAR_07

32 x 20 L