



TRIMMER® 500 WG

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

dispergējamošas granulas /
vandenīje dispersiokas granulas/
vees dispergeeruvad graanulid



Darbīgā viela/Veiklīji medžiaga/Toimeaine

- Metil-tribenurons/tribenuronmetils/
metüültribenuron 500 g/kg (50 %)



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0469
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot neatvērtā oriģinālā
iepakojumā

Pārstāvnīcība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/Gam-
intoja/Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.,
P.O. Box 60, Ind. Zone,
84110 Beer Sheva

Izraēla/Izraelis/Iisrael
Skanet informācijai /
Nuskaityti QR kodā /
QR-koodi lugemine



LIETUVA

Registrācijas numeris:
AS2-20H(2022)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovs Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

Registrācijas apliecības
īpašnieks, tā adrese/
Registrācijas saviniekas/
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355, NL-3830 AK
Leusden, Nederlande/
Nyderlandai/
Madalmaad
Tālr./Tel.:
+31 33 205 68 00
www.adama.com



EESTI

Eesti reg. nr.:
0533/30.10.14
Partii nr. ja valmistamise
kuupaev: vaata pakendilt
Sõilivusaeg: 2 aastat

UN3077

UZMANĪBU
ATSARGĪAI
HOIATUS



8 718077 013275 >

LATVIJA

Trimmer® 500 WG - Plaša spektra sistēmas
iedarbības herbicīds īsmuža divdīgļlapju
nežāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras
kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas
tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu un auzu
sējumos.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas
vai atkārtotas iedarbības rezultātā. **H410**
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām
sekām. **EUH208** Satur metil-tribenuronu.
Var izraisīt alerģisku reakciju. **EUH401** Lai
izvairītos no riska cilvēkiem veselībai un videi,
ievērojiet lietošanas pamācību. **P260**
Neieelpot putekļus/smidzinājumu. **P280**
Izmantojot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/
acu aizsargus/sejas aizsargus. **P314** Lūdziet
mediku palīdzību, ja jums ir slikta pašsajūta.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. **P501**
Atbrīvojies no satūra/tvertnes, ievērojot spēkā
esošo normatīvo aktu prasības. **SP1** Ne-
piesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli
un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas
tehniku ūdenstīlpiņu un ūdenstecē tuvu.
Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no
pagalmiem un ceļiem. **SPe3** Lai aizsargātu
ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz ūdenstīlpiņiem un ūdenstecēm. **SPe3** Lai
aizsargātu izdigušus kultūraugus un citus
ar lietojumu nesaistītos izdigušus augus,
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam
un/vai lauksaimniecībā neizmantojami
zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojami zemei nav
jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nesei
mazīnošas sprauslas. **Avārijas gadījumā zīņot**
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam –
telefons 112

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt oriģinālā
iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un
labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un
māzajiem nepieejamā vietā, atsevišķi no
pārtikas produktiem un lopbarības.
Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Trimmer® 500 WG yra sisteminis
sulfonilurijos grupės herbicidas, skirtas
dviskiliųjų piktžolių naikinimui pavasarį
žiemiųjų kvietinių ir vasariųjų kviečių, žieminių
ir vasariųjų kvietrugių, žieminių ir vasariųjų
miežių, taip pat žieminių rugių ir aviųž
pasėliuose.
Produkta skirtas profesionaliam
naudojimui.

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali
sukelti alerginę reakciją. Gali pakenkti
organams, jeigu medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai. Labai toksiška vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius pakiti-
mus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai
ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti
ištekėjusį medžiagą. Neįkvėpti
dulkių / rūko / aerosolio. Pasijutus
blogai, kreiptis į gydytoją. Jeigu
sudirginama oda arba ji išberia: kreiptis į
gydytoją. Nedelsiant nusivilkti užterštus
drabužius ir išskalbti prieš vėl apsiliekant.
Talpyklą šalinti pagal nacionalines
teisės aktų reikalavimus. Neužteršti
vandens augalų apsaugos produktų ar
jo pakuotę (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti
taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus,
būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną
iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba
naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius
purškikus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą telefonu:
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS - Produktą laikykite
sandariai uždarytoje gamyklos
pakuotėje, sausioje, vėsioje, gerai vėdi-
namoje patalpoje, atskirai nuo maisto
produktų, vandens ir pašarų.

EESTI

Trimmer® 500 WG on süsteemne herbiti-
sid, mis on mõeldud kaheiduleliste
umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suvinisus,
tali- ja suvitritikales, tali- ja suviudras,
samuti rukkis ja kaeras.
Preparaat on mõeldud professionaalseks
kasutamiseks.

H410 Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime. **EUH208** Sisaldab
metüültribenuron. Väib esile kutsuda
allergilise reaktsiooni. **P102**
Hoida lastele kättesaamatus
kohas. **P391** Mahavoolanud
aine kokku koguda. **P501** Sisu/
mahuti kõrvaldada vastavalt
kohalikele eeskirjadele. **SP1**
Vältida vahendi või selle pakendi
vette sattumist (Seadmeid pin-
navee lähedal mitte puhastada/
Vältida saastamist läbi lauda
ja teede drenaažide). **EUH401**
Inimeste tervise ja keskkonna
ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.

HOIUSTAMINE - Säilitada
tihedalt suletud tootja-
pakendis kuivas, jahedas,
hästi ventileeritud kohas, mis
on ligipääsetav üksnes vastava
koolituse läbinud personalile.
Hoida eraldi toiduainest, joogist
ja loomasöödadest. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Avatud
pakend kasutada ära ühe aasta
jooksul. Trimmer 500 WG ei ole iseseisv
ei põhjusta korrosiooni.

GRUPA	HERBICĪDS
GRUPĖ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID



250 g e



LATVIJA

LIETUVA

EESTI

UFI: FJHH-V371-K00W-PPGW

L40707IPWB_01

TRIMMER® 500 WG

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

dispēģējošas granulas /
vandenī dispersijas granulas/
vees dispergeeruvad graanulid

Darbīgā viela/Veiklīoji medžiaga/Toimeaine

- Metil-tribenurons/tribenuronmetilas/
metūltribenuron 500 g/kg (50 %)

Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0469
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot neatvērtā oriģinālā
iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/Gam-
intoja/Tootja/pakendāja:
ADAMA Makhteshim Ltd.,
P.O. Box 60, Ind. Zone,
84110 Beer Sheva
Izraēla/Izraelis/Iisrael

Skatiet informācijai /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine



LIETUVA

Registracijos numeris:
AS2-20H(2022)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovs Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecības
ipānieks, tā adrese/
Registrācijas savininkas/
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355, NL-3830 AK
Leusden, Nederlande/
Nyderlandai/
Madalamad
Tālr./Tel./Tel.:
+31 33 205 68 00
www.adama.com



EESTI

Eesti reg. nr.:
0533/30.10.14
Partii nr. ja valmistamise
kuupaev: vaata pakendit
Säilivusaeg: 2 aastat

UN3077

UZMANĪBU
ATSARGĪAI
HŌIATUS



8 178070 132559

UFI: FJHH-V371-K00W-PPGW

250 g e

LATVIJA

Trimmer® 500 WG - Plaša spektra sistēmas
iedarbības herbicīds izsmūža divdīgļlapju
nežāju ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras
kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu,
ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu un
auzu sējumos.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus
ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
● H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar
ilgstošām sekām ● EUH208 Satur metil-tribe-
nuronu. Var izraisīt alerģisku reakciju
● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas
pamācību ● P260 Neieelpot putekļus/smīd-
zinājumus ● P280 Izmantot aizsargcimdus/
aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
● P314 Lūdziet medicīniskā palīdzību, ja jums ir
slikta pašsajūta ● P391 Savākt izsīkstīto
šķidrums ● P501 Atbrīvoties no satura/
tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo
aktu prasības ● SP1 Nepiesāņot ūdeni ar
augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju
un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem
un ceļiem ● SPe3 Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz
ūdenstilpēm un ūdenstecēm ● SPe3 Lai
aizsargātu izdīgšus kultūraugus un citus
ar lietojumu nesaistītos izdīgšus augus,
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam
un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav
jāievēro, ja lieta 75% smidzinājuma nones
māzinošas sprauslas. Avārijas gadījumā
ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt oriģinālā
iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā
un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt
bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā
vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no
0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Trimmer® 500 WG yra sisteminis
silfonilureos grupės herbicidas, skirtas
dviskelių piktžolių naikinimui pavasarį
Žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir
vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių
miežių, taip pat žieminių rugių ir avižių
pasėliuose.
Produkto skirtas profesionaliam
naudojimui.

Sudėtyje yra tribenuronmetilo.
Gali sukelti alerginę reakciją ● Gali
pakenkti organizmams, jeigu medžiaga
veikia ilgai arba kartotai. ● Labai
toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaičius pakitimus ● Siekiant išvengti
žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus ● Surinkti
ištekėjusią medžiagą ● Neįkvėpti dulkių
/ rūko / aerozolio ● Pasijutus blogai,
kreiptis į gydytoją ● Jeigu sudirginama
oda arba ja išsiberia: kreiptis į gydytoją ●
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius
ir išskalbti prieš vėl apsivelkant ●
Talpkykl šalinti pagal nacionalinės teisės
aktų reikalavimus ● Neuzterinti vandens
augalų apsaugos produktų ar jo pakute
(neplauti purškimo įrenginių šalia pa-
viršinio vandens telkinių / vengti taršos
per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) ●
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus,
būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną
iki ne žemės ūkio įrenginių žemės arba
naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius
purškikus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biuro telefoną: +370 5 2362052 arba
+370 687 533 78.

SANDĒLIIVIMAS - Produktą
laikykite sandariai uždarytoje
gamyklos pakuotėje, sausoje, vē-
sioje, gerai vēdināmā patalpoje,
atšķirai nuo maisto produktu,
vandens ir pašarų.

EESTI
Trimmer®
500 WG on
süsteemne
herbitsiid, mis on mõeldud kaheidule-
heliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja
suvinisus, tali- ja suvitritikales, tali- ja
suviarids, samuti rukkis ja kaeras.
Preparaat on mõeldud professio-
nalsiks kasutamiseks.

H410 Vāga mūrgine veeorganismidele,
pikaajaline toime ● EUH208 Sisaldab
metūltribenuronu. Vāib esile kutsuda
allergilise reaktsiooni ● P102 Hoida
lastele kättesaamatus kohas ● P391
Mahavoolanud aine kokku koguda ●
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt
kohalikele eeskirjadele ●
SP1 Vältida vahendi või selle
pakendi vette sattumist (Sead-
meid pinnavee lähedal mist
puhastada/Vältida saastamist
lābi lauda ja teede drenaažide)
● EUH401 Inimeste tervise ja
keskkonna ohustamise vālti-
miseks jārgida kasutusjuhendit.

HŌIATUSTEIN - Sāilitada
toiduistale suletud tōiapakendis
kuivas, jahedas, hāsti
ventileeritud kohas, mis on
ligipādēstāv ūksnes vastava
koollituse lābīnud personālie.
Hoida eraldi tōiduainest, joogist
ja loomasāādast. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Avatud
pakend kasutada āra ūhe aasta
jooksul. Trimmer 500 WG eie isesitvū
ja eie pāhjusta korrosiooni.

atidaryti čia
atveriet šeit
avada siit

GRUPA

GRUPĖ

GRUPP

2

HERBICĪDS

HERBICIDAS

HERBITSIID

L40707IPWB_01



LATVIJA

PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, aizsargbrilles, sejas aizsargu, gumijas (nitrila) cimdus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Vispārēja informācija

Trimmer® 500 WG ir plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

Trimmer® 500 WG ir disperģējošo granulu formā, satur darbīgo vielu metil-tribenuronu 500 g/kg.

Iedarbības veids

satur darbīgo vielu metil-tribenuronu, kas pieder sulfonil-urīnvielas ķīmisko savienojumu klasei. Metil-tribenurons inhibē acetolaktāta-sitetāzes enzīma darbību nezāļu augos (ALS-inhibitors). Bez šī enzīma nezāles nespēj sintezēt aminoskābes, kas veido proteīnu blokus. Nezāles, kas nespēj veidot proteīnus, pārstāj augt un drīz atmirst.

Trimmer® 500 WG ir ļoti selektīvs graudaugu sējumos un tam nav negatīvas iedarbības uz kultūraugiem.

Iedarbība uz nezālēm

Trimmer® 500 WG iekļūst nezāļu augos galvenokārt caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība. Trimmer® 500 WG sistēmiski pārvietojas pa nezāļu augiem. Jau dažas stundas pēc apstrādes apstājas nezāļu augšana. Pirmās vizuāli novērojamās herbicīda iedarbības pazīmes ir nezāļu augu krāsas maiņa, pārsvarā ap augšanas punktu novēro gaišāku vai rozīgu krāsojumu, arī hlorotiskus plankumus. Vislabāko nezāļu kontroles efektivitāti iespējams sasniegt siltos un mitros laika apstākļos. Mazāk jutīgas nezāles var nebūt pilnībā kontrolētas, taču to augšana un attīstība tiks būtiski aizkavēta.

Vislabāko efektivitāti iespējams sasniegt, ja sējumu apstrādi veic nezāļu 2-4 īsto lapu stadijā.

Lai efektīvi kontrolētu nezāles, kas ir lielākā attīstības stadijā, nepieciešams lietot augstāko Trimmer® 500 WG devu. Tikai ļoti jutīgas nezāles tiks efektīvi ierobežotas vēlākās attīstības stadijās.

Trimmer® 500 WG efektivitāte

Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos (AS 21-29):

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV
Ļoti laba efektivitāte (>95%)	Rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>)
Laba efektivitāte (85-94.9%)	Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>)
Vidēja efektivitāte (70-84.9%)	Sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)
Zema efektivitāte (50-69.9%)	Tīruma vijolīte (<i>Viola arvensis</i>)

Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos (AS 30-39):

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV	Deva, 0.0225 kg/ha + VAV
Laba efektivitāte (85-94.9%)	Rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>)	Rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>)

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV	Deva, 0.0225 kg/ha + VAV
Vidēja efektivitāte (70-84.9%)	Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>)	Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)
Zema efektivitāte (50-69.9%)	Tīruma vijolīte (<i>Viola arvensis</i>)	Tīruma vijolīte (<i>Viola arvensis</i>)

Vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos (AS 21-29):

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV
Ļoti laba efektivitāte (>95%)	Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), parastā virza (<i>Stelaria media</i>), tīruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>)
Laba efektivitāte (85-94.9%)	Akļi (<i>Galeopsis spp.</i>)
Vidēja efektivitāte (70-84.9%)	Ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), tīruma vijolīte (<i>Viola arvensis</i>)
Zema efektivitāte (50-69.9%)	Dārza vējgriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>)

Vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos (AS 30-39):

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV	Deva, 0.0225 kg/ha + VAV
Ļoti laba efektivitāte (>95%)	Parastā virza (<i>Stelaria media</i>)	Parastā virza (<i>Stelaria media</i>)
Laba efektivitāte (85-94.9%)	Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)

Efektivitāte	Deva, 0.015 kg/ha + VAV	Deva, 0.0225 kg/ha + VAV
Vidēja efektivitāte (70-84.9%)	<i>Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ķeraīņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), tīruma naudulis (Thlaspi arvense)</i>	<i>Tīruma kumelīte (Matricaria inodora), sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma naudulis (Thlaspi arvense)</i>
Zema efektivitāte (50-69.9%)	<i>Tīruma vijolīte (Viola arvensis)</i>	<i>Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ķeraīņu madara (Galium aparine), akļi (Galeopsis spp.)</i>

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015	Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.015-0.0225	Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.015-0.0225	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

Augstāko devu lietot ziemāju sējumos un kad nezālēm apstrādes brīdī ir vairāk, kā 4 īstās lapas. Trimmer® 500 WG ļoti efektīvi ierobežo lielāko daļu divdīgļlapju nezāļu, izņemot ķeraiņu madaru *Galium aparine*. Lai uzlabotu ķeraiņu madaras ierobežošanas efektivitāti, ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar citiem herbicīdiem, kas ir efektīvi pret ķeraiņu madaru.

Trimmer® 500 WG vienmēr jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu, lai paātrinātu herbicīda iekļūšanu nezāļu augos, kā arī nodrošinātu augstāku efektivitāti un labāku lietus noturību.

Nakts salnas neietekmē Trimmer 500® WG efektivitāti, tomēr tā iedarbība uz nezālēm var būt palēnināta.

Ļoti sausos laika apstākļos var būt pazemināta efektivitāte atsevišķu nezāļu, piemēram, baltās balandas (*Chenopodium album*) ierobežošanai.

Nav ieteicams lietot Trimmer® 500 WG stresa novārdzinātiem augiem, kas radies nepiemērotu laika apstākļu dēļ.

Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem ārpus apstrādājamās platības

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Darba šķidruma patēriņš: 200 - 400 L/ha

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Trimmer® 500 WG var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos lietojamo preparātu. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā. Vienmēr lietot virsmas aktīvo vielu, lai nodrošinātu maksimālo herbicīda efektivitāti.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Smidzināšanai vienmēr izmantot tikai iepriekš iztīrītu smidzinātāju. Pārlicinieties, ka smidzinātāja tvertnē nav izveidojušies nosēdumi vai citu augu aizsardzības līdzekļu atliekas, īpaši, ja iepriekš strādāts ar tvertnes maisījumiem. Izlasiet iepriekš izmantotā preparāta norādījumus par smidzinātāja tīrīšanu.

Lielāko daļu nosēdumu var izšķīdināt, smidzinātāja tīrīšanai izmantojot amonjaka šķīdumu (1 litru 3% amonjaka uz 100 litriem ūdens) vai izmantojot speciālo smidzinātāju tīrīšanas līdzekli.

Smidzinātājam jābūt precīzi noregulētam un pārbaudītam darbībā. To pienācīgi pievieno traktoram un pārlicinās, ka transportēšanas, smidzināšanas vai sajaukšanas laikā nevar rasties noplūde.

Trimmer® 500 WG viegli sajaucas ar ūdeni, tomēr vajadzētu ievērot sekojošu sajaukšanas procedūru:

- piepildiet tvertni līdz pusei ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un pievienojiet nepieciešamo Trimmer® 500 WG daudzumu;
- pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu un beigās virsmas aktīvo vielu, visu laiku maisot. Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisā transportēšanas un izmantošanas laikā.

Sagatavotais izsmidzināšanas šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no ietekmes uz citiem kultūraugiem, tūlīt pēc Trimmer® 500 WG lietošanas kārtīgi iztīrīt smidzināšanas iekārtu no iekšpuses un ārpusē sekojoši:

- 1) pēc smidzināšanas pabeigšanas rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni (skalošanai izmantojiet vismaz 10% no smidzinātāja tilpuma), vienlaicīgi izsmidzinot skalošanas ūdeni caur stieni un sprauslām. Sprauslas, ekrāni un filtri jānoņem un jāizmazgā atsevišķi. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātiem kultūraugiem. Neaizmirstiet notīrīt smidzinātāju no ārpusē;
- 2) piepildiet smidzinātāju ar ūdeni un pievienojiet 500 mL smidzinātāju tīrīšanas līdzekli All Clear™ Extra uz 100 L ūdens vai 1 L 3% amonjaka uz 100 L ūdens. Izskalojiet to caur šļūtenēm un smidzināšanas stieni. Uzpildiet smidzinātāju ar ūdeni un, nepārtraukti maisot, ļaujiet tam cirkulēt 15 minūtes. Iztukšojiet tvertni caur stieni/sprauslām;
- 3) atkārtojiet 1. soli.

Izlasiet visu tvertnes maisījumā esošo komponentu smidzināšanas iekārtas tīrīšanas instrukcijas un pārlicinieties, ka lietojiet visatbilstošāko. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz platībām, kur nevar radīt kaitējumu kokiem vai citiem jutīgiem augiem, kā arī nepiesārņojot ūdenstilpes.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Metil-tribenurons saskaņā ar HRAC klasifikāciju pieder B grupai.

Jebkurā nezāļu augu populācijā ir sastopamas mazāk jutīgas vai izturīgas nezāles. Ja vairākus gadus vienā laukā atkārtoti lieto viena iedarbības veida herbicīdu, var izveidoties izturīgas nezāļu sugu populācijas, kurām pavairojoties, tās var kļūt par dominējošām. Izturīgas nezāļu populācijas var izveidoties, īpaši ja tiek lietotas samazinātas herbicīdu devas.

Rezistentu nezāļu sugu populāciju izveidošanos var novērst, izvēloties alternatīvus produktus ar citādu iedarbības mehānismu, vai veidojot tvertnes maisījumus.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Pēc ražas novākšanas laukā, kur lietots Trimmer® 500 WG, tajā pašā gadā var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi. Nākamā gada pavasarī var sēt visus kultūraugus. Ja ar Trimmer® 500 WG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar tīru ūdeni, vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķīduma pagatavošanai. Tukšo taru aizliegts izmantot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Rekomendācijas preparāta izmantošanai pamatotas uz izmēģinājumiem laukā, variējot ārējos apstākļus. Izgatavotājs nav atbildīgs par neparedzētiem apstākļiem, kā klimatiskie apstākļi, augsnes tips, rezistence, nepareizi izvēlēta pielietojuma metode un citi faktori, kas varētu ietekmēt preparāta iedarbību. Šādi faktori var radīt nevēlamus simptomus attiecībā uz apstrādājamo kultūru un pasliktināt nezāļu iznīcināšanu. Izgatavotājs arī neatbild par bojājumiem, kuri radušies paviršības vai preparāta nepareizas lietošanas dēļ. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Šī materiāla iegāde nepiešķir nekādas patentu tiesības ārpus Latvijas.

Reģistrētās tirdzniecības zīmes:

Trimmer® 500 WG - ADAMA Agricultural Solutions Ltd reģistrēta tirdzniecības zīme

All Clear™ Extra - E.I. du Pont de Nemours and Company reģistrēta tirdzniecības zīme

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Trimmer® 500 WG veikioji medžiaga tribenuronmetilas priklauso sulfonilurėjos cheminei klasei. Tribenuronmetilas pagal veikimo pobūdį yra ALS-inhibitorius. Be šio fermento piktžolės negali sintetinti aminorūgščių, kurios yra baltymų sudedamoji dalis. Negalėdamos gaminti baltymų, piktžolės nustoja augti ir po kurio laiko sunyksta. Trimmer® 500 WG yra selektyvus javuose, todėl neturi jokio neigiamo poveikio auginamiems augalams.

POVEIKIS PIKTŽOLĖMS

Trimmer® 500 WG į piktžolės patenka per lapus, stiebus ir šiek tiek per šaknis, bei sistemiškai išnešiojamas audiniuose. Panaudojus Trimmer® 500 WG piktžolės nustoja augti jau po keleto valandų. Pirmi herbicido veikimo požymiai – pakitusi spalva (dažniausiai pašviesėjusi arba rausva, purpurinė) augimo vietose, chlorotinės dėmės. Šiltu ir drėgnu oru efektyvumas yra geriausias. Priklausomai nuo augimo sąlygų po 2-4 savaičių paveiktos piktžolės sunyksta. Mažiau jautrios piktžolės nesunaikinamos, tačiau jų augimas sustabdomas.

Geriausiai sunaikinamos aktyviai augančios 2-4 lapelių dydžio piktžolės. Didesnėms piktžolėms sunaikinti reikia didesnės herbicido normos. Tokiu atveju gerai sunaikinamos tik jautrios Trimmer® 500 WG piktžolės.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių ir žieminių rugių pasėliuose.

Norma: 15-22,5 g/ha Trimmer® 500 WG + paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM).

Naudojimo laikas: pavasarį, nuo bambliųjimo pradžios iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 30-39).

Vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių, vasarinių miežių, vasarinių avižų pasėliuose.

Norma: 15-22,5 g/ha Trimmer® 500 WG + paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM).

Naudojimo laikas: pavasarį, nuo matomo pirmojo šoninio ūglio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 21-39).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 400 L/ha.

TRIMMER® VEIKSMINGUMAS

Trimmer® 500 WG veiksmingumas panaudojus 15 g/ha ir 22,5 g/ha normas su paviršiaus aktyviąja medžiaga:

Žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių ir žieminių rugių pasėliuose:

Purškimo laikas: nuo matomo pirmojo šoninio ūglio iki pirmojo bamblio tarpsnio BBCH 21-31		
Piktžolių jautrumas	Purškimo norma 15 g/ha	Purškimo norma 22,5 g/ha
Labai jautrios piktžolės (95-100 %)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
Jautrios piktžolės (85-94,9%)	Rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>)	rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%)	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	Rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9%)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)
Purškimo laikas: nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tapsnio BBCH 31-39		
Piktžolių jautrumas	Purškimo norma 15 g/ha	Purškimo norma 22,5 g/ha
Jautrios piktžolės (85-94,9%)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>),), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%)	Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>)	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9%)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

Vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių, vasarinių miežių, vasarinių avižų pasėliuose:

Purškimo laikas: nuo matomo pirmojo šoninio ūglio iki pirmojo bamblio tarpsnio BBCH 21-31		
Piktžolių jautrumas	Purškimo norma 15 g/ha	Purškimo norma 22,5 g/ha
Labai jautrios piktžolės (95-100 %)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), aklė (<i>Galeopsis sp.</i>), dėmėtasis rūgtis (<i>Polygonum persicaria</i>), dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)
Jautrios piktžolės (85-94,9%)	Dirvinė krapažolė (<i>Euphorbia helioscopia</i>), dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>)	Kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>), vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9%)	Nelygialapis rūgtis (<i>Polygonum aviculare</i>), vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	-

Purškimo laikas: nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tapsnio BBCH 31-39		
Piktžolių jautrumas	Purškimo norma 15 g/ha	Purškimo norma 22,5 g/ha
Labai jautrios piktžolės (95-100 %)	Daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)	Daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)
Jautrios piktžolės (85-94,9%)	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>), dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)	Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%)	Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>), dirvinė krapažolė (<i>Euphorbia helioscopia</i>)	Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9%)	Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)	Aklė (<i>Galeopsis sp.</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>)
Atsparios piktžolės (0-49,9 %)	Aklė (<i>Galeopsis sp.</i>), nelygialapis rūgtis (<i>Polygonum aviculare</i>), vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Nelygialapis rūgtis (<i>Polygonum aviculare</i>), vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Herbicido prasiskverbimui į piktžolės pagerinti ir pagreitinti, Trimmer® 500 WG rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM). Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir didesnis atsparumas lietai.

Nedidelės šalnos neturi įtakos Trimmer® 500 WG efektyvumui, bet jo poveikis gali būti letėsnis. Labai sausu oru produkto efektyvumas prieš kai kurias piktžolės (pvz., balandas) gali sumažėti.

Trimmer® 500 WG nerekomenduojama naudoti pasėliuose, kuriuose augalai paveikti streso dėl nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., ilgalaikių šalų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA

Trimmer® 500 WG rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM). Dėmesio! Trimmer® 500 WG mišinių su PAM poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas. Perskaitykite PAM etiketę prieš naudojimą. Naudojant produktą kartu su PAM, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas naudojamo PAM etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtina pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

SĖJOMAINA

Laukuose, apdorotuose Trimmer® 500 WG nuėmus derlių tais pačiais metais galima sėti žieminius javus ir žieminius rapsus. Kitais metais galima auginti visus kultūrinius augalus. Jeigu dėl kokių nors aplinkybių Trimmer® 500 WG apdorotas pasėlis žuvo, galima atsėti tik varpinius javus.

MAIŠYMAS

Norint pagerinti veikimą prieš kibiuosius lipikus, rekomenduojama Trimmer® 500 WG naudoti kartu su Tomahawk 200 EC ir Cleave. Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Trimmer® 500 WG mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Trimmer® 500 WG sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga. Pagal HRAC klasifikaciją tribenuronmetilas yra ALS inhibitorius HRAC kodas – 2 (anksčiau naudotas kodas – B). Atsparumo išsivystymo rizika tribenuronmetilui vertinama kaip didelė.

Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas. Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC 2 grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilus dirvos dirbimas);
- mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
- naudokite rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra aktyviai augančios 2 – 4 tikruosius lapelius turinčios piktžolės;
- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

PURŠKIAMO TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalų tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pusę purkštuvą talpos pripildykite vandeniu ir įjungus maišyklę supilkite reikiamą produkto kiekį. Pripildžius purkštuvą vandeniu supilkite paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat turi būti išpurškiamas.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvą talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kruopščiai išplaukite purkštuvą talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvą talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandens išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

Ypač svarbu kruopščiai išplauti purkštuvą, jei tas pats purkštuvą bus naudojamas kitų augalų purškimui, nes kai kurie (cukriniai runkeliai, rapsai) yra labai jautrūs šios grupės herbicidams.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PAGRINDINĖ PRODUKTO SAUGOS INFORMACIJA

Produktą laikykite sandariai uždarytoje gamyklos pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Naudojant negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Baigus darbą ar pertraukų metu nusiprauskite vandeniu ir muilu, persirenkite.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius

– kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $>200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko, aerozolio.

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $>200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos. **Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI MEDICININĖ PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytose gamyklinėse pakuotėse, vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, tik apmokytam personalui prieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro. Atidarytą pakuotę sunaudoti per metus. Trimmerà 500 WG savaime neužsidega ir nesukelia korozijos. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Išsipylus produktui:

Susemkite semtuvu arba siurbliu, neskalaukite vandeniu. Susemtą produktą patalpinkite į uždaromą konteinerį ir sunaikinti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Jei išpilta ant dirvos netoli augalų, medžių – surenkant nuimkite ir 5 cm dirvos paviršiaus. Nepilkite atliekų į nuotekas, gruntinius vandenis. Jei taip atsitiktų – nedelsiant informuokite Aplinkosaugos tarnybas.

Kilus gaisrui:

Kvieskite ugniagesius, informuokite, kad gaisro židinyje yra pesticidų, taip pat, jei gali būti kitų pavojingų chemikalų, pvz. trąšų. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės – CO₂, smėlis, putos ir vandens srovė. Ugniagesiams reikia dėvėti kvėpavimo aparatus, apsauginius kostiumus. Jei pavojus nedidelis, leisti ugniai išblėsti savaime, nes vanduo gali užteršti paviršių. Atvirus konteinerius vėsinti vandeniu iš išorės.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

EESTI

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KASUTUSJUHEND.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.**

ÜLDINFORMATSIOON

Trimmer® 500 WG on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid, mis on mõeldud kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suvinisus, tali- ja suvitritikales, tali- ja suviodras, samuti rukkis ja kaeras.

Trimmer® 500 WG on vees disperseeruvad graanulid, mille koostises on 500 g/L metüültribenurooni.

TOIMEMECHANISM

Trimmer® 500 WG toimeaine metüültribenuroon kuulub sulfonüüluurea keemilisse klassi. Metüültribenuroon blokeerib ensüümi atsetolaktaat-süntetaasi sünteesi (ALS-inhibiitor). Ilma selle ensüümita ei saa umbrohi sünteesida aminohappeid, mis on valkude koostisosa. Suutmata sünteesida valke, peatub umbrohu kasv ja mõne aja pärast see hävib. Trimmer® 500 WG on väga selektiivne teravilja suhtes ja tal ei ole kahjulikku mõju kasvatavale kultuurile.

MÕJU UMBROHULE

Trimmer® 500 WG satub umbrohtudesse läbi lehtede, varte ja mingil määral juurte kaudu ning süsteemselt kantakse kudedesse. Peale Trimmer® 500 WG -ga pritsimist seiskub umbrohtude kasv juba mõne tunni möödudes. Herbitsiidi esimesteks toimetähtsuseks on umbrohtude muutunud värv (sagedamini värv muutub heledamaks või roosakaks, lillakaks), klorootilised laigud. Soojades ja niisketes ilmingimustes on mõju parim. Umbrohi hävib sõltuvalt kasvutingimustest 2-4 nädala jooksul peale pritsimist. Vähem tundlikud umbrohud otseselt ei hävi, kuid nende kasv aeglustub tunduvalt.

Kõige kergemini on umbrohud tõrjutavad siis, kui nad on aktiivselt kasvavad ning 2-4 lehe faasis. Suuremate umbrohtude hävitamiseks on vaja suuremaid herbitsiidi koguseid ning sel juhul hävivad ainult Trimmer® 500 WG -le tundlikud umbrohud.

TRIMMER® 500 WG-I EFEKTIIVSUS

Väga tundlikud/ tundlikud umbrohud:

Põldsinep (*Sinapsis arvensis*)
Raps (*Brassica napus*)
Harilik kesalill (*Tripleurospermum perforatum*)
Rukkilill (*Centaurea cyanus*)
Kõrvikud (*Galeopsis tetrahit*)
Põld-löösilm (*Myosotis arvensis*)
Teekummel (*Matricaria recutita*)
Harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*)
Põldlitterhein (*Thlaspi arvense*)
Iminõges (*Lamium*)
Valge hanemalts (*Chenopodium album*)
Harilik malts (*Atriplex patula*)
Kahar kirburohi (*Polygonum lapathifolium*)

Vähe tundlikud umbrohud:

Roomav madar (*Galium aparine*)
Põldmailane (*Veronica arvensis*)

Põldmagun (*Papaver dubium*)
Harilik nälghein (*Spergula arvensis*)
Vesihein (*Stellaria media*)
Harilik puju (*Artemisia vulgaris*)
Harilik punand (*Fumaria officinalis*)
Harilik linnukapsas (*Lapsana communis*)
Põldkannike (*Viola arvensis*)
Konnatatar (*Polygonum aviculare*)
Põld-konnatatar (*Fallopia convulvulus*)
Põldohakas (*Cirsium arvense*)
Nõges (*Urtica*)

KASUTUSOOVITUS

Tali- ja suviteravili

Kasutusnorm: 15-22,5 g/ha Trimmer® 500 WG + pindaktiivne aine (PAA)

Kasutusaeg: alates 2 lehest kuni viimase lehe faasini (lipulehe keelekesse ilmuniseni) (BBCH 12-39).

Suurim pritsimiste arv – 1

Soovitatav vee hulk: 100-400 L/ha.

Kasutades Trimmer® 500 WG-d on soovitatav lisada pindaktiivset ainet (PAA) selleks, et tõhustada ja kiirendada herbitsiidi läbitungimist umbrohu sisse. See tagab parema efektiivsuse ja suurema vihmakindluse.

Toime parendamiseks põldohaka vastu on soovitatav kasutada Trimmer® 500 WG-d koos TOMIGAN® 180EC-ga. Koirohu ja ohaka hävitamiseks on parim aeg siis, kui nad on idanenud, kuid kasvanud mitte üle 10-15 cm. Juhul, kui need umbrohud on suuremad, on soovitatav pritsida Trimmer® 500 WG-d segatuna fenoksü-rühma herbitsiididega.

Vähene külm ei mõjuta Trimmer® 500 WG efektiivsust, kuid selle mõju võib olla aeglasem. Väga kuiva ilmaga võib toote efektiivsus mõnede umbrohtude (nt hanemalts) suhtes väheneda.

Trimmer® 500 WG-d ei soovitata kasutada põllukultuuridel siis, kui kultuurid on stressis ebasoodsate keskkonnatingimuste, näiteks pikaajalise külma või põua, liigniiskuse, toitainete puudulikkuse jms tõttu.

Vältida pritsimislahuse sattumist pritsitava ala kõrval kasvavatele taimedele.

VILJAVAHELDUS

Põldudel, kus on kasutatud Trimmer® 500 WG-d, võib pärast saagikoristust samal aastal külvata taliteravilja ja -rapsi. Järgmisel aastal võib kasvatada kõiki kultuure. Kui põllukultuur on ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu hävinud, võib pärast pritsimist külvata kevadel või varasuvel ainult teravilja.

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Täita pool pritsipaaki veega ja pärast segisti sisselülitamist lisada vajalik kogus toodet. Lisada ülejäänud vesi ning pindaktiivne aine. Pritsimise vaheaegadel peab segisti olema sisse lülitatud. Kogu lahus tuleb ära kasutada korraga. Preparaadi normi kindlaksmääramisel kasutada gradeeritud pakendi korki.

SEGAMINE

Trimmer® 500 WG-d võib segada paljude registreeritud pestitsiididega. Informatsiooni saamiseks Trimmer® 500 WG segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega vaadake tootja teabematerjale tema kodulehel või võtke ühendust tootja esindajaga.

RESISTENTSUSE VÄLJAKUJUNEMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD

Metüültribenuroon on vastavalt HRAC-süsteemile klassifitseeritud B-rühma herbitsiidiks. Mistahes umbrohu populatsioonis võib leida vähem tundlikke või looduslikult vastupidavaid üksiktaimi. Kui samal põllul kasutatakse sama toimega herbitsiidide mitu aastat järjest, siis

loodusliku valiku mõjul vastupidavamad umbrohu taimed paljunevad ja muutuvad domineerivaks. Sama toimemehhanismiga herbitsiidide pikaajalisel, eriti väikeste normide kasutamisel võib välja kujuneda ka umbrohtude resistentsus. Selleks, et vähendada resistentsuse tekkimise ohtu, tuleb kinni pidada etiketil toodud kasutusnõuetest. Samuti on soovitatav erinevatel aastatel kasutada erineva toimemehhanismiga herbitsiide.

PRITSI PESEMIN

Töö lõpetamisel tuleb pritsipaaki, torustikku ja pihusteid pesta puhta veega ning selleks ette nähtud pesuvahendiga All Clear Extra (1L/200 L vee kohta) või 1 liiter 3%-list ammoniaaki. Eriti oluline on see siis, kui sama pritsimiseadet kasutatakse teiste põllukultuuride pritsimiseks, sest mõned kultuurid (nt. suhkrupeet, raps) on väga tundlikud selle grupi herbitsiidide suhtes.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsimiseseadmesse oodata umbes 30 sekundit, kuni valguvad välja viimased tilgad. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Seejärel tuleb tühjakssaanud pakend loputada. Selleks kohaldatakse integreeritud loputuseeadet või kolmekordset loputuse meetodit. Taimekaitsepritsi loputamisseadme olemasolu korral loputada pakendeid 3-5 baarise survevee joaga. Loputusvesi valada pritsipaaki.

Juhul, kui taimekaitsepritsil puudub spetsiaalne loputusmehhanism, täita 25-30% pakendist puhta veega, keerata kork tihedalt kinni ning lokutada pakendit umbes 30 sekundit, et vesi satuks pakendi kõikidesse nurkadesse. Loputusvesi valada pritsipaaki töölahuse hulka. Protseduuri korratakse vähemalt kolm korda.

Taimekaitsepritsi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud põllule.

Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputatud pakendid on ohtlikud jäätmed, mida tuleb hoida eraldi muudest jäätmetest. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

TOOTE OHUTUSINFO

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, toiduainest, joogist ja söödast eraldi. Pärast tööd või vaheaegadel pesta ennast vee ja seebiga, vahetada riided. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

ISIKUKAITSEVAHENDID

Pritsimise ajal kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid: kaitseriietust, kemikaalikindlaid kummisaapaid, -kindaid ja vastavat näokatet. Vältida toote sissehingamist, sattumist silma, allaneelamist. Väljas töötamisel pöörata tähelepanu tuule suunale ja vältida pritsimisudu sissehingamist.

ESMAABI

Halva enesetunde tekkimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või selle etiketti.

Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka pehme seebi ja veega. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada silma puhta veega vähemalt 15 minuti jooksul ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Allaneelamisel: arsti loata mitte esile kutsuda oksendamist. Tagada kannatanule rahu. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Ärge püüdke teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.

SÄILITAMINE

Säilitada tihedalt suletud tootjapakendis kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, mis on ligipääsetav üksnes vastava koolituse läbinud personalile. Hoida eraldi toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Avatud pakend kasutada ära ühe aasta jooksul. Trimmer® 500 WG ei ole isesüttiv ja ei põhjusta korrosiooni.

Toote mahavalgumisel:

Pühkida harjaga kühlvile või imeda kokku pumbaga, mitte loputada veega. Kokkukorjatud toode panna suletavasse konteinerisse ja viia ohtlikesse jäätmetesse. Toote mahavalgumisel taimede ja puude läheduses olevale pinnasele eemaldada kokkukorjamisel pealt ka 5 cm pinnast. Mitte valada jäätmeid kanalisatsiooni, põhjavette. Kui see juhtub, teatada viivitamatult keskkonnaametile.

Tulekahju korral:

Kutsuda välja tuletõrjujad, teavitada, et tulekoldes on pestitsiide või ka teisi ohtlikke kemikaale, näiteks väetist. Sobivad kustutusvahendid on CO₂, liiv, vaht ja veejuga. Tuletõrjujad peavad kandma hingamisaparaati, kaitseülikonda. Kui oht on väike, lasta tulel vaibuda iseeneslikult, sest vesi võib saastada pinnast. Lahtised mahutid jahutada veega väljastpoolt.

MÄRKUS

Tootja ei võta endale vastutust toote efektiivsuse vähenemise eest tingimuste muutumisel, mida ei olnud võimalik ette näha registreerimise ja toote müügi ajal. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud tootjapakendis, kuid ei vastuta tagajärgede eest, kui on rikutud toote hoiustamis- ja kasutustingimusi.



TRIMMER® 500 WG



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



**HERBICĪDS / HERBICIDAS /
HERBITSIID**

**disperģējošas granulas / vandenījē dispersiškos
granulēs / vee dispergeeruvad granulid**

Darbīgā viela/Veiklioji medžiaga/Toimeaine

● metil-tribenurons/tribenuronmetilas/

metūltribenuron 500 g/kg (50 %)

Informācija / Informacija / Informatie



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0469
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tāl.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/Gaminto-
jas/Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.,
P.O. Box 60, Ind. Zone,
84110 Beer Sheva
Izraēla/Izraelis/Israēl



LIETUVA

Registracijos numeris:
AS2-20H(2022)
Partijos numeris ir
pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

Registrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese/
Registrācijas savininkas/ Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355,
NL-3830 AK Leusden,
Niederlande/Nyderlandai/Madalmaad
Tāl./Tel./Tel.:
+31 33 205 68 00
www.adama.com



EESTI

Eesti reg. nr.:
0533/30.10.14
Partii nr. ja valmistamise
kuupaev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

UZMANIBU
ATSARGIAI
HOIATUS



LATVIJA

Trimmer® 500 WG - Plaša spektra sistēmas
iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ie-
robežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas
miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras
tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai
atkārtotas iedarbības rezultātā ● **H410** Ļoti toksisks
ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH208**
Satur metil-tribenuronu. Var izraisīt alerģisku reak-
ciju ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai
un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P260**
Neieelpot putekļus/smīdinājumu ● **P280** Izmantot
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/
sejas aizsargus ● **P314** Lūdziet medicīn palīdzību,
ja jums ir slikta pašsajūta ● **P391** Savākt izšķēstīto
šķidrums ● **P501** Atbrīvojies no satura/tvertnes,
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ●
SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli
un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku
ūdenstīrīju un ūdenstīrīju tuvumā. Izsargāties no
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un
ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus,
ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīrīpēm un ūdens-
tecēm ● **SPe3** Lai aizsargātu izdigušus kultūraugus
un citus ar lietojumu nesaistītos izdigušus augus,
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmatojamai zemei. Aizsar-
gosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmatojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75%
smidzinājuma nonesī mazīnošas sprauslas. **Avārijas
gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam – telefons 112**

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt oriģinālā
iekāpījumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un
labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un
mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pār-
tikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas
temperatūra no 0°C līdz +35°C.



8 718077 013282

LIETUVA

Trimmer® 500 WG yra sisteminis
sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas
dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį
žieminį ir vasarinį kviečių, žieminį ir
vasarinį kvietriugų, žieminį ir vasarinį
miežių, taip pat žieminį rugių ir avių
pasėliuose.
**Produktas skirtas profesionaliam naudo-
jimui.**

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti
alerginę reakciją ● Gali pakenkti organams, jeigu
medžiaga veikia ilgai arba kartotina ● Labai tok-
siška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudoji-
mo instrukcijos nurodymus ● Surinkti ištekęsį
medžiagą ● Neįkvėpti dulkių / rūko / aerosolio
● Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją ● Jeigu su-
dirginama oda arba ja išberia: kreiptis į gydytoją
● Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl apsivelkant ● Talpyklą šalinti
pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ●
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar
jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per
dreną iš sodų ir nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti
netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės
arba naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius
purškikus.
**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodi-
jimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

SANDĖLIAVIMAS - Produktą laikykite sanda-
riai uždarytoje gamyklos
pakuotėje, sausoje,
vėsioje, gerai vėdinamoje
patalpoje, atskirai nuo
maisto produktų, vandens
ir pašarų.

EESTI

Trimmer® 500 WG
on süsteemne her-
bitsiid, mis on mõeldud
kaheiduleheliste umbroh-
tude tõrjumiseks tali- ja suvi-
nise, tali- ja suvitritikale, tali- ja
suviõdras, samuti rukkis ja kaeras.
**Preparaat on mõeldud professio-
naalseks kasutamiseks.**

H410 Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime ● **EUH208** Sisaldab
metüültribenuron. Võib esile kutsuda
allergilise reaktsiooni ● **P102** Hoida lastele
kättesaamatus kohas ● **P391** Mahavoola-
nud aine kokku koguda ● **P501** Sisu/mahuti
korraldada vastavalt kohalikele
eeskirjadele ● **SP1** Vältida vahendi või
selle pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinna veel lähedal mitte puhastada/
Vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide) ● **EUH401** Inimeste tervise
ja keskkonna ohustamiseks vältimiseks
järgida kasutusjuhendit.

HOIUSTAMINE - Säilitada tihedalt
suletud tootjapakendis kuivas, jahedas,
hästi ventileeritud kohas, mis on
ligipääsetav üksnes vastava kooli-
tuse läbinud personalile. Hoida eraldi
toiduainest, joogist ja loomasaadast.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Avatud pakend kasutada ära ühe aasta
jooksul. Trimmer 500 WG ei ole isesüttiv
ja ei põhjusta korrosiooni.

GRUPA	HERBICĪDS
GRUPĖ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID

10 x 250 g

L407070CFR_01

UN3077

**Skatet informacijai /
Nuskaityti QR kodą /
QR-koodi lugemine**

