

KALIF® 360 CS



LV - HERBICĪDS

LT - HERBICIDAS

EE - HERBITSIID

Darbīgā vielā:
klomazonas 360 g/L (30.3 % w/w)

Preparatīvā forma:

kapsuli suspensija

Reģistrācijas Nr.: 0409

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi

Saugojimo temperatūra:

0°C - + 35°C

Veikloji medžiaga:
klomazonas 360 g/L (30.3 % w/w)

Produkto forma:

kapsuli suspensija

Reģistrācijas numeris:

0421H/12

Partijas numeris ir pagaminimo

data:

žiūrēti ant pakuotēs

Galiojimo laikas: 2 metai

Uzglabāšanas temperatūra:

0°C - + 35°C

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese/
Reģistrācijas savininkas/Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Niederlande/Nederlandai/Madalmaad

Tālr./Tel: +31 33 44 53 160

www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:

Tālr.: +371 2666 70 52 8 5 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakkija:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262, Ashdod

77102 Izraēla/Izraelis/Israel

Skanēt informāciju
Nuskaitīt QR kodu
QR-kodi lugemine



KALIF® 360 CS



Latvija

Kalif® 360 CS - augsnēs herbicīds dažu īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rāpšā sējumos un kartupeļu stādījumos.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām EUH401

Lai izvairītos no riska cīlveku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • P501 Atbrīvojties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēcētu tuvumā.

Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm vai ūdenstēcēm • SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaīmniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrinus - 112.

Lietuva

Kalif® 360 CS - dirvinis herbicidas, skirtas naikinti kai kurioms dviskiltēms ir vienaskiltēms piktžolēms bulvės, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki sudygimo. Skirtas profesionalajam naudojimui!

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaiķiūs pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliajamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpykļu šalinti pagal nacionalinius teisēs aktu kalavimimus.

Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti puršķimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinii/vengti taršos per drenāžu iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netiksliniju augalus, būtina išlaikyti 5 metrus apsaugos zoną iki ne žemės ūko poskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinii ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazonas dažniu kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijimo atveju kreiptis ļApsinuodijimų kontrolēs ir informacijos biurā telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALU APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Eesti

Kalif® 360 CS - on tärmikseelne mulla herbitsiid mitmete koheiduleheliste umbohitud törjeks talirapsil, suvirapsil ja kartulil.

Kalif® 360 CS võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikajaline toime • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas •

P501 Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimeks järgida kasutusjuhendit • SP1

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmied piinna vee läheosal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

VÄLTIAMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖUDEID.

atdaryti čia
atveriet šeit
avada siit



KALIF® 360 CS



Latvija

Kalif® 360 CS - augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rāpš sējumos un kartupeļu stādījumos.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401**

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P501**
Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepsārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Netīri smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecētu tuvumā. Izsargāties no priesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm vai ūdenstecēm • **SPe3** Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukum un/vai laukaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis - 112.

Lietuva

Kalif® 360 CS - dirvinis herbicidas, skirtas naikinti kai kurioms dviskiltēms ir vienaskiltēms piktžolēms bulvėse, žieminių ir vasariniai rapsų pasėliuose iki sudygimo.
Skirtas profesionalajam naudojimui!

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaiķus pakaitīmus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuorodymus.

Talpyklę šalinti pagal nacionalinius teisės aktu reikalavimus.

Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazonas dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimu kontrolės ir informacijos biuru telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



LATVIA

LITUANIA

Eesti

Kalif® 360 CS - on tärkamiseeline multiherbitsid mitmete kaheiduleheliste umbohtude törjeks talirapsil, suvirapsil ja kartulil.

Kalif® 360 CS võib osta ja kasutada ainult taimekatsetunnistust omav isik.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P501** Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH401**

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimeiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette satumist (Seadmeid pinnavee läheval mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

VÄLTIKAS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖUDEID.

ANEKALBALILT/02/A

EESTI

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Norādījumi ārstam: simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis **67042473**

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģēru, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģēru un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

PREPARĀTA APRAKSTS

Kalif® 360 CS ir augsnes herbicīds kapsulu suspensijas formā, kas satur aktīvo vielu klomazonu un ir paredzēts dažu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša, vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos.

Klomazons pieder izoksazolidinona herbicīdu grupai, kas iedarbojas, kavējot karotinoīdu biosintēzi nezināmā iedarbības veidā. Dzeltenie karotinoīdu pigmenti augos veic vairākas funkcijas, t.sk., uztver gaismas enerģiju fotosintēzei un aizsargā augu no kaitīgajiem radikāliem. Kalif® 360 CS aizkavē šo aizsargājošo pigmentu biosintēzi, kā rezultātā rodas augu bojājumi. Jutīgās nezāles uzīgst, bet, tā kā karotinoīdu biosintēze tiek bloķēta, augsnes virspusē nezāles kļūst baltas, un drīz pēc tam sekto bojāeja. Dažkārt jutīgās nezāles spēj attīstīt normālus dīgstus, taču īstajām lapām uzreiz parādās hloroze.

Kalif® 360 CS vienmēr lieto pirms nezāļu un kultūrauga dīgšanas. Pēc izsmidzināšanas klomazons uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnēs daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnei kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgstiem. Nezāles, kas dīgst no dzīlākiem augsnes slāniem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu.

Kalif® 360 CS ir augsnes herbicīds, ko var izmantot visu šķirņu ziemas un vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos. Kad tiek veikta apstrāde ar Kalif® 360 CS, jāuzmanās, lai smidzināšanas joslas nepārklātos. Nelietot Kalif® 360 CS smilts augsnēs vai joti vieglās augsnēs. Nelietot augsnēs, kuru organisko vielu satura pārsnedz 10%. Sējot rapsi, augu drošībai būtiski ir, lai sēklas segtu vismaz 20 mm biezus augsnes slānis. Lai iegūtu optimālu rezultātu - efektīvu nezāļu kontroli, augsnes virskārtai jābūt līdzēnai, bez cilām, augu atliekām jābūt iestrādātam; pārāk irdenu augsnī pirms smidzināšanas ieteicams pievelt. Dīgstošie kultūraugi apstrādes laikā var tikt nopietni bojāti.

Kalif® 360 CS efektivitāte ar devu 0.25 L/ha:

jutīgas: (efektivitāte >90%) – ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*), ķeraiņu madara (*Galium aparine*), sārtā panātre (*Lamium purpureum*), parastā virza (*Stellaria media*);

vidēji jutīgas: (efektivitāte 90-70%) – daudzsēku balanda (*Chenopodium polyspermum*), parastā gaijsāre (*Echinochloa crus-galli*), dārza vējagriķis (*Fallopia convolvulus*), Persijas veronika (*Veronica persica*), saules dievkrēslīņš (*Euphorbia helioscopia*);

vidēji izturīgas: (efektivitāte 70-40%) – ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*), parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*), tīruma kumelīte (*Tripleurospermum inodorum*), tīruma neaizmirstule (*Myosotis arvensis*), maura skarene (*Poa annua*), tīruma vijolīte (*Viola arvensis*), baltā balanda (*Chenopodium album*).

LIETOŠANA

Ziemas rapsis un vasaras rapsis

Apsmidzināt augsnī pirms nezāļu sadīgšanas, ne vēlāk kā trīs dienas pēc rapša sējas.

Deva:

- ziemas rapsis 0.25 – 0.33 L/ha;
- vasaras rapsis 0.25 L/ha.

Ziemas un vasaras rapša sējumos apstrādes ar Kalif® 360 CS jāveic pēc iespējas ātrāk pēc sējas, pirms kultūrauga uzdīgšanas.

Neizmantot Kalif® 360 CS ziemas rapsim, kas iesēts vēlāk par 20. augustu.

Neizmantot Kalif® 360 CS vai samazināt devu, ja pēc apstrādes sagaidāms spēcīgs lietus.

Ziemas un vasaras rapša sējumos Kalif® 360 CS var lietot tvertnes maisījumā ar Sultan® 500 SC. Kalif® 360 CS deva 0.20 L/ha maisījumā ar Sultan® 500 SC.

Kartupeļi

Apsmidzināt augsnī pirms nezāļu sadīgšanas, periodā no stādišanas līdz piecām dienām pirms kartupeļu sadīgšanas.

Deva: 0.25 L/ha.

Kartupeļu stādījumos apstrādes ar Kalif® 360 CS jāveic pēc pēdējās vagošanas, vēlākais – piecas dienas pirms sagaidāmās kartupeļu digšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Ūdens patēriņš: 200–400 L/ha.

Piezīme. Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

BRĪDINĀJUMI

Ja pēc apstrādes seko spēcīgs lietus, var rasties pārejoša kultūraugu lapu balēšana, un tā var būt spēcīga. Šī augu balēšana ir pārejoša, augi turpina attīstīties, un tai nav ietekmes uz ražu.

Nelietot noblīvētās augsnēs vai augsnēs ar vāju struktūru, kur vēlāk var uzkrāties ūdens.

Nezāļu kontroles līmenis var pazemināties, ja herbicīds tiek piemērots uz sausas,

nefīdenas un cilainas augsnēs virskārtas, vai, ja apstrādei seko ilgstošs sausuma periods.

Nepieļaut smidzināšanas joslu pārklāšanos.

SADERĪBA AR CİTIEM PREPARĀTIEM

Lai paplašinātu apkarojamo nezāju spektru un paaugstinātu efektivitāti, Kalif® 360 CS ziemas rapsā un vasaras rapsā sējumos var lietot tvertenes maisījumā ar herbicīdu Sultan® 500 SC. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojiet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai.

Gatavojoj tvertnes maisījumu, ktrs herbicīds ūdenim smidzināšanas tvertnē jāpievieno atsevišķi un rūpīgi jāsamaisa pirms nākamā herbicīda pievienošanas.

Tvertnes saturs jāizsmidzina nekavējoties, un tas ir nepārtraukti jāmaisa.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Kalif® 360 CS daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpaliukošo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet kontaineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.
- Piepildiet kontaineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgāšamo ūdeni cauri maisītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm pilnībā iztukšojet kontaineru.
- Nonemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

PECKULTŪRAS

Pēc kultūraugu, kas apstrādāti ar Kalif® 360 CS, ražas novākšanas var sēt graudaugus, rapsi, pupas, zirņus, kukurūzu, linus, cukurbietes, stādīt kartupeļi. Pirms pēckultūru sējas/stādišanas jāveic augsnes aršana vai diskosana/frēzēšana 15 cm dziļumā.

PĀRSĒŠANA

Ja rodas nepieciešamība pārsēt ar Kalif® 360 CS apstrādāto ziemas rapsi:

tajā pašā rudenī drīkst sēt tikai ziemas rapsi, pie tam ar nosacījumiem, ka augsne ir apstrādāta vismaz 15 cm dziļumā un ir pietiekams laiks, lai ziemas rapsā sējums normāli attīstītos pirms ziemas perioda iestāšanās;

pavasarī drīkst sēt tikai vasaras rapsi un graudaugus, vai stādīt kartupeļus, pie tam ar nosacījumu, ka augsne ir apstrādāta: vismaz 15 cm dziļumā pirms vasaras rapsā sējas

vai kartupeļu stādīšanas, vismaz 25 cm dziļumā pirms graudaugu sējas. Graudaugu sējumos iespējama neliela ietekme (lapu bālēšana), kas ir pārejoša un neatstāj ietekmi uz graudu ražu.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlit izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo taru jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm vai ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārnojuma. Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecētu tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārnoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekļi, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, izvairīties no tiešas saules gaismas. Nepieļaut sasalšanu.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnēs apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem.

Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ātpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.

Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

Sultan® 500 SC, Kalif® 360 CS - ADAMA Agricultural Solutions Ltd tirdzniecības zīme.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Bendra informacija

Kalif® 360 CS yra dirvinis herbicidas, skirtas kai kurioms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti bulvėse, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki sudygimo.

VEIKIMO BŪDAS

Klomazonas priklauso isoksazolidinonų grupės herbicidams, kurie veikia slopindami karotinoidų biosintezę, tačiau tikslus veikimo mechanizmas nežinomas. Geltoni karotinoidų pigmentai atlieka keletą funkcijų augale. Jie asimiliuoja šviesos energiją fotosintезės procese bei apsaugo augalą nuo žalingų radikalų. Kalif® 360 CS blokuoja šių apsauginių pigmentų biosintezę ir tai sukelia žalingą poveikį piktžolėms. Jautrios piktžolės dygsta, bet dėl karotinoidų sintezės blokavimo piktžolės išdygsta pabalusios ir greitai žūsta. Kartais jautrios piktžolės išdygsta kaip įprasta, tačiau vėliau ant tikrujų lapelių atsiranda chlorozės démės.

NAUDOJIMAS

Kalif® 360 CS visada naudojamas prieš sudygimą. Po purškimo, klomazonas suformuoja plėvelę žemės paviršiuje stipriai sukibdamas su dirvožemio dalelėmis. Piktžolės, dygstančios iš gilesnio dirvos sluoksnio, gal būti mažiau jautrios herbicidui, nes šaknų sistema vystosi gilesniame dirvos sluoksnyme. Dygdomos piktžolės prasiskverbia per herbicidų padengtą dirvos sluoksnį, tokiu būdu absorbuodamos herbicidą per uglius ir šaknus.

Kalif® 360 CS yra dirvinis herbicidas, kuris gali būti naudojamas visose žieminių ir vasarinių rapsų bei bulvių veislėse. Ražienos, grumstuotas bei sausas dirvožemis gali sumažinti herbicido poveikį piktžolėms. **Augalai, kurie purškimo metu yra sudygę, gali būti stipriai pažeisti.**

Piktžolių jautrumas, kai naudojama 0,25 mL/ha norma:

jautrios: (efektyvumas >90%) – dirvinė čiužutė (*Thlaspi arvense*), trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*), kibasis lipikas (*Galium aparine*), baltasis šakinykas (*Silene pratensis*), juodoji kauliauogė (*Solanum nigrum*);

vidutiniškai jautrios: (efektyvumas 90-70%) – gausiaséklė balanda (*Chenopodium polyspermum*), paprastoji rietmenė (*Echinochloa crus-galli*), švelnusis snaputis (*Geranium molle*), vijoklinis pelėvirktis (*Fallopia convolvulus*), trumpamakštis rügtis (*Persicaria lapathifolia*), dėmétasis rügtis (*Persicaria maculosa*), paprastoji žilė (*Senecio vulgaris*), dirvinė pienė (*Sonchus arvensis*), persinė veronica (*Veronica persica*), daržinė žliūgė (*Stellaria media*), raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*), dirvinė karpažolė (*Euphorbia helioscopia*);

vidutiniškai atsparios: (efektyvumas 70-40%) – baltoji balanda (*Chenopodium album*), raudonžiedės progailis (*Anagallis arvensis*), plačioji balandūnė (*Atriplex patula*), vaistinė ramunė (*Matricaria recutita*), vaistinė žvirbliarūtė (*Fumaria officinalis*), dirvinė aklė (*Galeopsis tetrahit*), bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum perforatum*), dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*), aguona birulė (*Papaver rhoes*), vienmetė miglė (*Poa annua*), paprastoji takažolė (*Polygonum aviculare*), dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*), dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*), gebenalapė veronica (*Veronica hederifolia*).

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Žieminiai rapsai

Naudojimo laikas: iki sudygimo, ne vėliau nei 3 dienos po sėjos.

Norma: 0,20-0,33 L/ha

Kalif® 360 CS turi būti išpurkštas kaip galima greičiau po sėjos prieš sudygstant rapsams.
Nenaudokite Kalif® 360 CS žieminiuose rapsuose pasėtuose po rugpjūčio 20 d.

Vasariniai rapsai

Naudojimo laikas: iki sudygimo, ne vėliau nei 3 dienos po sėjos.

Norma: 0,15-0,25 L/ha

Kalif® 360 CS turi būti išpurkštas kaip galima greičiau po sėjos prieš sudygstant rapsams.

Bulvės

Naudojimo laikas: po sodinimo - likus 5 dienoms iki bulvių sudygimo.

Norma: 0,20-0,25 L/ha

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis - 200 – 400 L/ha.

DĖMESIO

- Esant tam tikroms oro sąlygoms galimas trumpalaikis pasėlių pabalimas, ypač jei nupurškusi stipriai palyja. Laikinas pabalimas augant išnyksta ir įtakos derliui neturi.
- Nepurkškite suslėgtų dirvų, kurios linkusios užmirkti.
- Nerekomenduojama naudoti Kalif® 360 CS lengvose dirvose, taip pat dirvose, kurioje yra daugiau nei 10% organinės medžiagos.
- Piktžolių jautrumas sumažėja, jei purškiama ant sausos, grumstėtos dirvos arba jei po purškimo ilgą laiką nelyja.
- Nepurkškite arba sumažinkite produkto normą, jei tikimasi stipraus lietaus po purškimo.
- Venkite perpurškimy.

Sėjos gylis

Sėklas turi būti pasėtos ne mažiau nei 20 mm gylje. Optimaliam efektyvumui pasiekti dirvos paviršius turi būti lygus, gerai paruoštas ir be grumstų. Jei dirva labai puri, jq rekomenduojama sutankinti.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamuju bei negyvenamuju pastatų teritorijas.

Maišymas

Siekiant praplėsti jautrių piktžolių spektrą ir padidinti produkto efektyvumą Kalif® 360 CS gali būti maišomas su Sultan® 500 SC (metazachlor 500 g/L) purškiant žieminius ir

vasarinius rapsus. Mišinyje Kalif® 360 CS norma turėtų būti ne didesnė nei 0,2 L/ha. Prieš naudojant mišinių, pasikonsultuokite su registracijos savininko atstovais ir atsižvelkite į rekomendacijas. Ruošiant mišinių iš pradžią turi būti supilamas vienas produktas į purkštuvą su vandeniu, gerai išmaišomas ir tuomet pilamas kitas produktas. Tirpalas turi būti suvartojamas tuo pat po jo paruošimo. Paruošus tirpalą ir purškimo metu maišyklié turi būti įjungta.

Dėl kitų mišinių naudojimo kreiptis į registracijos savininko atstovus.

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produktu likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuvė integruiotas pakuočių skalavimo įtaisais pakuočiai skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariui vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiekštų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skysti supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodyti švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštèles).

SĖJOMAINA

Nuėmus derlių, laukuose purkštuse Kalif® 360 CS gali būti auginami šie augalai: javai, rapsai, pupos, žirniai, bulvės, kukurūzai, morkos, cukriniai runkeliai, svogūnai ir linai. Prieš sėją/sodinimą dirva turi būti jdirbtai mažiausiai 15 cm gyliu.

Žuvus žieminiams rapsams, kurie buvo purkštę Kalif® 360 CS:

tą patį rudenį gali būti sėjami tik žieminių rapsai, dirva turi būti jdirbtai mažiausiai 15 cm gyliu, bei turi būti pakankamai laiko, kad rapsai užaugtų tinkamo dydžio, kad galėtų peržiemioti;

pavasarį gali būti sėjami javai, rapsai, bulvės. Dirva turi būti suarta 25 cm gyliu prieš atsėjant javais, prieš atsėjant rapsais ar bulvėmis pakanka dirvos dirbimo 15 cm gyliu.

Javams gali pasireikšti lapų spalvos pašviesėjimas, tačiau jis yra trumpalaikis ir neturi įtakos derliui.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produkту ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą aylanynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitriilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt. Būtina

dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avelynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slylio su produkto. Stengtis nejkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuoṭę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymąq.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDÉLIAVIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro.

Laikykite sausose, nuo šalčių apsaugotose, pesticidams sandéliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

PASTABA!

Idėmai perskaitykite etiketę prieš naudojimąq. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamas remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo slygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytomis aplinkybėmis (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

ÜLDANDMED

Kalif® 360 CS on tärkamiseelne järeltoimega mulla kaudu toimiv herbitsiid mitmete kaheiduleheliste umbohtude törjeks talirapsil, suvirapsil ja kartulil.
Kalif® 360 CS võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kalif® 360 CS on kapselsuspensioon, mis sisaldb 360 g klomasooni/L.

TOIMEMEHANISM

Klomasoon kuulub isokas solidinoonide keemilisse rühma. Kalif® 360 CS takistab taimi kaitsvate pigmentide karotinoidide sünteesi, põhjustades umbrohtudel kahjustusi. Vastuvõtlikud umbrohud küll idanevad, kuid karotinoidide sünteesi blokeerimise töttu tärkavad nad valgetena ning surevad kiiresti. Mõningatel juhtudel võivad vastuvõtlikud umbrohud küll anda normaalset vörseid, kuid hilisemad pärislehed on juba kloroosset.

KASUTUSJUHEND

Kalif® 360 SC kasutatakse alati tärkamiseelselt. Pärast pritsimist seotakse klomasoon mullaosakestega ja mulla pinnale moodustub kile. Kui umbrohud idanevad, läbivad nad selle pinnasekihi ning omastavad herbitsiidi nii vörsete kui juurtega. Sügavamatest mullakihtidest tärkavad umbrohud võivad vähem kahjustuda, kuna nende juureed on väljaspool herbitsiidi täodeldud kihti. Kalif® 360 CS omab järeltoimet ja teda võib kasutada köigi tali- ja suvirapsi ning kartuli sortide puhul. Taimejäänused (põhk), ebäühtlane, kämpudega külvipind ja kuiv muld võivad vähendada preparaadi toimet umbrohtudele. Pritsimise ajal juba tärganud kultuurtaimed võivad saada tugevasti kahjustada.

UMBROHUTÖRJE

Juhul kui Kalif® 360 CS kasutatakse tärkamiseelselt niiskel ning kämpudeta külvipinnal, on talle vastuvõtlikud järgmised umbrohud:

Galium aparine (roomav madar), *Capsella busa-pastoris* (harilik hiirekõrv), *Matricaria spp* (kummelid), *Stellaria media* (vesihein), *Lamium spp* (punand), *Veronica spp* (mailased), *Viola arvensis* (põldkannike), *Aethusa cynapium* (koeraputk), *Polygonum spp*. (kirburohud).

Mõödukalt vastuvõtlikud on:

Chenopodium album (valge hanemalts), *Thlaspi arvense* (põld-litterhein), *Poa annua* (murunurmikas).

KULUNORMID, PRITSIMISE AEG

Raps

Kasutada tärkamiseelselt, mitte hiljem kui 3 päeva pärast külvamist.

Kulunorm:

- talirapsil 0.10-0.33 L/ha Kalif® 360 CS
- suvirapsil 0.10-0.25 L/ha Kalif® 360 CS

Tali- ja suvirapsis tuleb Kalif® 360 CS kasutada nii kiiresti kui võimalik pärast külvamist ja enne kultuurtaimedede tärkamist. Ärge kasutage Kalif® 360 CS talirapsil, mida on külvatud

hiljem kui 20. augustil. Ärge kasutage Kalif® 360 CS juhul, kui pärast pritsimist on oodata tugevat vihma; kui pritsimine on siiski vajalik, siis vähenage preparaadi kulunormi. Kalif® 360 CS'd võib segada preparaadiga Sultan® 500 SC nii suvi- kui talirapsi puhul, kusjuures talirapsi puhul on kulunorm 0.20-0.25 L/ha ja suvirapsi puhul 0.15-0.2 L/ha Kalif® 360 SC'd.

Kartul

Kasutada tärkamiseelsest, külvamisest kuni 5 päeva enne idanemist.

Kulunorm:

- 0.10-0.25 L/ha Kalif® 360 CS

Kartulil tuleb Kalif® 360CS kasutada pärast vagude ajamist, kõige hiljem 5 päeva enne kartuli oodatavat tärkamist. Kalif® 360 CS võib kartulis kasutamise puhul segada preparaadiga Mistral® 700 WG.

PIIRANGUD

- Teatud ilmastikutingimuste korral võib aset leida möningane mööduv taimede valgenemine, eriti intensiivne võib see olla juhul, kui pritsimisele järgneb tugev vihm. See ajutine valgenemine kasvab kiiresti välja ja ei oma efekti saagile.
- Mitte kasutada tihenenedu või halva struktuuriga muldadel, kus võib olla eeldusi leostumiseks.
- Umbrohotörje võib jäädä puudulikuks, kui pritsitakse kuiva kämpunud kasvupinda või kui pritsimisele järgneb pikajaline kuiv periood.
- Vältida pritsimisalade omavahelist kattumist ja sellest tingitud kahekordset pritsimist.

VEE KOGUS JA PRITSIMISE KVALITEET

Kasutage 200-400 liitrit vett hektarile suurepiisalise pritsena. Kalif® 360 CS kasutamisel tuleb jälgida, et pritsealad omavahel ei kattuks.

MULLA TÜÜP

Mitte kasutada Kalif® 360 CS liiv- või kergetel muldadel. Mitte kasutada pinnastel, mis sisaldavad rohkem kui 10% orgaanilist ainet.

KÜLVI SÜGAVUS / KÜLVIALUS

Kultuurtaimiku ohutuseks on oluline, et seeme on kaetud vähemalt 2 cm pinnasega. Optimaalse efektiivsuse saavutamiseks peab külvipind olema püsiv, ühtlane ja ilma kämpudeta. On soovitatav, et pudedaid ja kobedaid külvipindu enne pritsimist tihendatakse.

Külvide puhul, mida töödeldi taimekaitsvahendiga Kalif® 360 CS, on enne järgmiste kultuuride külvamist tarvis kündada vähemalt 15cm sügavuselt.

SEGAMINE

Et laiendada törjutavate umbrohtude spektrit ja tõsta efektiivsust, võib Kalif® 360 CS

segada järgmiste toodetega:

- tali- ja suvirapsil - Sultan® 500 SC (metasakloor 500 g/L),
- kartulil - Mistral® 700 WG (metribusiin 700 g/kg).

Enne ükskõik millise paagisegu kasutamist tutvuge lisatava toote kasutusjuhendiga ja järgige selle juhiseid. Iga toote tuleb lisada paagis olevasse vesilahusesse eraldi ja enne järgmiste toote lisamist pöhjalikult segada. Paagisegud tuleb ära pritsida vahetult pärast valmistamist ja segisti seejuures pidevalt töös hoida.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Loputage tühi pakendit 3 korda, loputusvesi lisada pritsimislahusesse. Tühjad pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Ärge visake pakendeid kanalisatsiooni või kuivendussüsteemidesse; vältige toote pinna- ja pöhjavette sattumist.

JÄRELKULTUURID

Totega Kalif® 360CS töödeldud ja tavapäraselt koristatud suvi- või talirapsi ning kartuli järel võib samale pöllule külvata teravilja, rapsi, uba, hernest, kartulit, maisi, naerist, lina või suhkrueetti. Enne külvamist tuleb muld vähemalt 15 cm sügavuselt kündada või kultiveerida.

ASENDUSKULTUURID

Juhul kui kultuur ikaldub, võib samal hooajal uesti külvata ainult teravilja, rapsi, hernest, uba, kartulit, porgandit, naerist, suhkrueetti, sibulat ja lina. Kõigi asenduseks kasutatakavate suviviljade puhul tuleb pinnas kündada ja kultiveerida vähemalt 25 cm sügavuselt. Enne uesti herne, oa, kartuli, porgandi, naeri, suhkrueedi, sibula ja lina külvamist peab pritsimisest olema möödunud vähemalt kuus nädalat.

Totega Kalif® 360 CS töödeldud talirapsi taimiku ikaldumisel võib samal sügisel külvata ainult taliteravilju, eeldades, et pritsimisest on möödunud vähemalt kuus nädalat; pinnas tuleb kündada ja kultiveerida vähemalt 25 cm sügavuselt.

TÖÖOHUTUS

Pritsimise ajal kasutage sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid. Kandke kemikaalile vastupidavaid kindaid. Kandke sobivat kaitseriuet ja kemikaalikindlaid saapaid ning kaitseprille või spetsiaalset kemikaalide vastast näokatet.

Nõutav on töökoha hea ventilatsioon. Enne söömist, joomist või suitsetamist ja enne töö lähkumist pesta käsi ja teisi katmata kehaosi seebi ja veega. Pesta töörietus enne uesti kasutamist.

ESMAABI

Sissehingamisel: toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Kui hingamine puudub, teha kunstlikku hingamist. Konsulteerida arstiga.

Nahakontaktil: eemaldada saastunud riuetus ja pesta köik saastunud nahapinnad seebi ja veega ning loputada sooja veega. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Silma sattumisel: loputada silma puhta veega 10-15 min jooksul, seejuures silmalauge

avades. Pöörduda arsti poole.

Alalneelamisel: loputada suud veega. Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule inimesele. Konsulteerida arstiga.

Märkus arstile: spetsiifiline vastumürk teadmata. Ravida sümptomaatiliselt.

SÄILITAMINE

Hoida otsese päikesevalguse eest. Vältida külmumist. Säilitada kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas. Hoida originaalkakendis.

TOOTE GARANTII

Kõik soovitused toote kasutamiseks pöhinevad meie praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle toimet võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit hoiutingimused, äärmuslikud klimaatilised tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentsed umbrohud), ei vastuta tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.

KALIF® 360 CS



LV - HERBICĪDS



LT - HERBICIDAS



EE - HERBITSIID

Darbīgā viela:
klomazons 360 g/L (30.3 % w/w)
Preparatīvā forma:
kapsulu suspensija
Reģistrācijas Nr.: 0409
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums:
skait uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
Saugojimo temperatūra:
0°C - + 35°C

Veiklioji medžiaga:
klomazons 360 g/L (30.3 % w/w)
Produkto forma:
kapsulių suspensija
Reģistracijos numeris:
0421H/12
Partijos numeris ir pagaminimo
data:
žiūrēti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Uzglabāšanas temperatūra:
0°C - + 35°C

Toimeaine:
klomasoon 360 g/L (30.3 % w/w)
Preparatiivne vorm:
kapselsuspensioon
Registreerimise nr:
0430/10.02.12
Partii nr ja valmistamise aeg:
vaata paketilt
Säilivusaeg: 2 aastat
Säilitada:
0°C - + 35°C

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /
Registracijos savininkas/Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad
Tālr./Tel: +31 33 44 53 160
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr.: +371 2666 70 52 8 5 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakkija:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262, Ashdod
77102 Izraēla/Izraelis/israel

12 x 1 L

©ADAMA Agricultural Solutions Ltd.



ADAMA

ANEKALBALI LT/02/C1
14467C/06

KALIF® 360 CS

KALIF® 360 CS



LV - HERBICĪDS
LT - HERBICIDAS
EE - HERBITSIID

Skonēt informācijai
Nuskaitiți QR kodq
QR-koodi lugemine



Latvija

Kalif® 360 CS - augnes herbicīds dažu īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • EUH401

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību • P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošā normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm vai ūdenstecēm • SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

**Avārijas gadījumā zvanīt
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, tālrunis - 112.**

Lietuva

Kalif® 360 CS - dirvinis herbicidas, skirtas naikinti kai kurioms dviskiltēms ir vienaskiltēms piktžolēms bulvėse, žieminių ir vasarinį rapsą pasėliuose iki sudygimo. Skirtas profesionaliajam naudojimui!

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimis.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ierenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/ vengti taršas per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazonas dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą telefonom:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!**

Eesti

Kalif® 360 CS - on tärkamiseelne mulla herbitsiid mitmete kaheiduleheliste umbohtude törjeks talirapsil, suvirapsil ja kartulil. Kalif® 360 CS võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikajaline toime • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • SPe3 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid piinnavee lähedal mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide).

**VÄLTIKAS OHTU INIMESELE
JA KESKKONNALE, TULEB
JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI
NÖUDEID.**

12 x 1 L

KALIF® 360 CS



LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA



8 718077 010953 >

30 x 20 L



ANEKALBAL1LT/02/X
T4467P/06

UAB

"ADAMA Northern Europe"