



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDAS

**koncentruota
suspensija**



Veiklioji medžiaga

● Metamitronas 700 g/L (58.5 %)

Registracijos numeris: AS2-90H (2020)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai.

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +8 5 21 08 622

Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Gamintojas:

ADAMA Agan Ltd.

P.O. Box 262

77102 Ashdod

Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

**NO VARNISH
AREA**



LIETUVA

L11376IPFR_02

5 L e



GOLTIX® GOLD



ADAMA



HERBICIDAS

koncentruota suspensija



LIETUVA

GRUPĖ 5 HERBICIDAS

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametams ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose.

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją. ● 8 procentus mišinio sudaro, nežinomo ūmaus toksiškumo įkvėpus, sudedamosios dalys. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatos ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių). ● Surinkti ištekęsį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamų-

jų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mažinančią įrangą, purškiant kmynus, braškes. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mažinančią įrangą purškiant cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, sėklinių špinatų pasėlius, dekoratyvinius medžius ir krūmus, eglių sodinukus, purškiant dekoratyvinius augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis medelynuose. ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius puršktuvus. **Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ATSARGIAI

UFI: 2JHQ-9DFT-8V0K-69KJ



LIETUVA



8 718077 002590

20_88DIP9LTT7

GOLTIX® GOLD



HERBICIDAS

koncentruota suspensija



LIETUVA

GRUPĖ 5 HERBICIDAS

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienameis ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose. **Goltix® Gold** naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. **Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Kenksminga prarijus. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją. ● 8 procentus mišinio sudaro, nežinomo ūmaus toksiškumo įkvėpus, sudedamosios dalys. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Surinkti ištekęs medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudoji-

mo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą, purškiant kmynus, braškes. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą purškiant cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, sėklinių špinatų pasėlius, dekoratyvinius medžius ir krūmus, eglių sodinukus, purškiant dekoratyvinius augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis medelynuose. ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksnų mažinančių purškštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

UFI: 2JHQ-9DFT-8V0K-69KJ



LIETUVA



8 718077 002590

atveriet šeit

ATSARGIAI

L113761PBB_02



LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Goltix® Gold yra selektyvus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžolės prieš ir po jų sudygimo. Goltix® Gold sudėtyje esanti triazinonų grupės veiklioji medžiaga metامتروناس, pagal HRAC priskiriamas C1 grupei, slopina fotosintezę II fotosistemoje. Metامتروناس įsisavinamas per šaknis ir ža-liąsias augalo dalis, ir išnešiojamas po visą augalą, per kelias dienas piktžolės pabūla, atsiranda nekrotinės dėmės, piktžolės nūvysta.

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	1 – 2	7 dienos	0,5 – 2 (ne daugiau kaip 3 L/ha per sezoną)	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalies pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, antrą kartą po sudygimo Norma prieš sudygimą: 0,5-2 L/ha Norma po sudygimo: 0,5-1,0 L/ha Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	3	7 dienos	1,0	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalies pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, antrą ir trečią kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	4	7 dienos	0,75	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalies pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, kitus kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Dekoratyvinių augalų daigynai Dekoratyviniai augalai (medžiai ir krūmai) Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	1	-	1,0	200-400	Purkšti tarpueilius augalų rambės metu, birželio – rugpjūčio mėn., apsaugant augalus	
Eglučių sodinukai (<i>Picea abies</i>)	1	-	1,0	150-400	Purkšti balandžio- gegužės arba rugpjūčio- spalio mėn.	Didžiausia norma per sezoną 1 L/ha
Kmynai 1-ais sėjos metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti balandžio- rugpjūčio mėn. Po sėjos iki sudygimo BBCH 00-08 arba nuo išsiskleidusių pirmųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę 9 lapeliai BBCH 11-19	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius Didžiausia norma sezonui 1.5 L/ha
Kmynai 2-ais metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti gegužės mėn., prieš stiebo pailgėjimą, kai augalo aukštis ne dau- giau kaip 15 cm (vėliausiai BBCH 31 – stiebo ilgėjimo pradžia, matomos stiebo užuomazgos)	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius.
Naujai įveistas braškynas	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn. 14 dienų po sodinimo, prieš žydėjimą	
Derančios braškės	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn., prieš žydėjimą	
Sėkliniai špinatai	1	-	1,0	100-400	Purkšti pavasarį, prieš sudygimą, 1–2 dienos po sėjos	

Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki **kmynų** derliaus ėmimo - ne mažiau kaip 60 dienų.

Dėmesio!

Cukrinius runkelius, pašarinius runkelius valgomuosius burokėlius galima purkšti naudojant vieną iš 3-jų purškimo schemų, neviršijant didžiausios 3,0 L/ha normos per sezoną

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

Piktžolių jautrumas	Veiksmingumas	Piktžolės, purškiant prieš sudygimą	Piktžolės, purškiant po sudygimo
Labai jautrios piktžolės	95-100 %	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	Bekvapis šunramūnis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)
Jautrios piktžolės	85-94.9 %	Dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)	Rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės	70-84.9%	Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) dėmėtasis rūgtis (<i>Persicaria maculosa</i>)	Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) švelnusis snaputis (<i>Geranium molle</i>) raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės	50-69.9%	Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)	Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Goltix® Gold efektyviausias kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ

Gaminotojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

SĖJOMAINA

Panaudojus Goltix® Gold, kitą sezoną gali būti sėjami visi augalai.

Jei dėl kokių nors priežasčių Goltix® Gold apdorotas cukrinių runkelių pasėlis žūsta, tais pačiais metais galima sėti:

- be dirvos dirbimo atsėti galima tik cukrinius arba pašarinius runkelius;
- po arimo gali būti sėjami kukurūzai ir arba sodinamos bulvės;
- po arimo ir po 2 mėnesių laikotarpio galima sėti žolę sėklai.

Žemieniai javai gali būti sėjami tą patį sezoną, jeigu praėjo 16 savaičių nuo paskutinio purškimo Goltix® Gold.

MIŠINIAI

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Goltix® Gold mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veiklioji medžiaga metamitronas priklauso HRAC grupei C1 – fotosintezės inhibitoriams II fotosistemoje (cheminė grupė – triazinonai). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti piktžolių, natūraliai atsparių C1 grupės herbicidams.

Pakartotinis to paties veikimo herbicidų naudojimas gali padidinti piktžolių atsparumo išsivystymo riziką, todėl herbicido veiksmingumas gali sumažėti. Siekiant sumažinti riziką, reikėtų taikyti atsparumo prevencijos ir valdymo strategiją.

- Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
- Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
- Naudokite rekomenduojamą Goltix® Gold normą ir tinkamu laiku, ypač sunkiai kontroliuojamoms piktžolių rūšims.
- Naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones: sėjomainą, gilų dirvos dirbimą.

Daugiau rekomendacijų apie piktžolių atsparumo valdymą galima rasti Atsparumo herbicidams veiksmų grupės (HRAC) ir Piktžolių atsparumo veiksmų grupės (WRAG) informacinėse sistemose.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Naudojimui rekomenduojami traktoriniai purkštuvai.

Prieš naudojant, darbo įranga turi būti tinkamai kalibruota, nustatytas tinkamas judėjimo greitis, slėgis ir purškiamo tirpalo paskirstymo tolygumas.

PURŠKIAMO TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvus yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai apskaičiuokite reikalingą tirpalo kiekį, kad po purškimo purkštuve neliktų neišpurkšto tirpalo likučių. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite. Po to 1/4-1/2 purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite apskaičiuotą reikalingą produkto kiekį, tada supilkite į maišytuvą kitus produktus. Siekiant išlaikyti vienodą purškimo mišinio sudėtį, maišymą tęskite ir purškimo metu. Pildant purkštuvo talpą, vamzdis visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos.

PURŠKIMO ĮRANGOS PLOVIMAS

Baigus purkšti, purškimo įranga turi būti iš karto gerai išplauta.

Iš pradžių išplaukite purkštuvą talpos vidų:

1. Produkto likučius išpurškite ant Goltix® Gold nupurkštų augalų
2. Trečdalį purkštuvą užpildykite švari vandeniu ir išskalaukite.
3. Išpurškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdalį purkštuvą vėl užpildykite švari vandeniu.
5. Įpilkite plovimui skirtą priemonę, kad išskalauti antrą kartą.
6. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį ant Goltix® Gold nupurkštų augalų.
7. Užpildykite trečdalį purkštuvą vandeniu trečią kartą.
8. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį Goltix® Gold nupurkštų augalų.

Baigus plauti purkštuvą talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminės medžiagos atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminės medžiagos atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio keliaukraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsvilkant. Susitėpus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

[kvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkite suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Praktinis: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trikgubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadinamasis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA



HERBICIDAS

koncentruota
suspensija

© ADAMA Agan Ltd.



Veiklioji medžiaga

● Metamitronas 700 g/L (58.5 %)

Registracijos numeris: AS2-90H (2020)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai.

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +8 5 21 08 622

Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai

Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Gamintojas:

ADAMA Agan Ltd.

P.O. Box 262

77102 Ashdod

Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI



8 718077 002606



LIETUVA

LIETUVA

Goltix[®] Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose.

Goltix[®] Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją. ● 8 procentus mišinio sudaro, nežinomo ūmaus toksiškumo įkvėpus, sudedamosios dalys. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Surinkti ištekęsį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro

naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mažinančią įrangą, purškiant kmynus, braškes. ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mažinančią įrangą purškiant cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, sėklinių špinatų pasėlius, dekoratyvinius medžius ir krūmus, eglių sodinukus, purškiant dekoratyvinius augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis medelynuose. ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksnų mažinančius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GRUPĖ 5 HERBICIDAS



ATSARGIAI

4 x 5 L

1113760CFR_02



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA



LIETUVA



ATSARGIAI



L11376PAAR_02

30 x 20 L