



# LEGACY<sup>®</sup> PRO



ADAMA

@Adama Registrations B.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/  
koncentruota suspensija/  
suspensioonikonsentraat (SC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiagas/Toimeained

- diflufenikans/diflufenikanas/diflufenikaan ..... 40 g/L
- pendimetalīns/pendimetalīnas/pendimetalīn ..... 300 g/L
- hlortolurons/chlorotoluronas/kloortoluroon ..... 250 g/L



Informācija / Informacija / Informatie



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0415  
 Reģistrācijas klase: 2.  
 Partijas Nr. un izgatavošanas datums:  
 skatīt uz iepakojuma  
 Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas  
 datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā  
 iepakojumā  
 Pārstāvniecība Latvijā:  
 Tālr.: +371 2944 62 85



EESTI

Eesti reg. nr.: 0541/03.02.15  
 Partii nr. ja valmīstamīse kuupaev: vaata  
 pakendilt  
 Sāilivusaeg: 2 aastat



LIETUVA

Registrācijas numeris: AS2-41H (2020)  
 Partijos numeris ir pagaminimo data:  
 žiūrėti ant pakuotės  
 Galiojimo laikas: 2 metai  
 Atstovs Lietuvoje:  
 Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecināšanas Ipašnieks,  
 tā adrese/Registrācijas savininkas/  
 Registreermise haldaja:  
 ADAMA Registrations B.V.  
 P.O. Box 355  
 NL-3830 AK Leusden  
 Nīderlande/Nyderlandai/Madalmaad  
 Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00  
 www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/  
 pakendaja:  
 ADAMA Agan Ltd.  
 P. O. Box 262  
 77102 Ashdod/Ashdod/  
 Ashdod  
 Izraēla/Izraelis/Iisrael

UZMANĪBU  
ATSARGIJI  
HOIATUS



UN3082

LJ0245IPFR\_1J4

Skaneet informācijai /  
 Nuskaityti QR kodą /  
 QR-koodi lugemine



SKALKAU TEISINGAI

NO VARNISH  
AREA

5 L e



# LEGACY<sup>®</sup> PRO



LJ0245IPBB\_14



## LATVIJA

**Legacy<sup>®</sup> Pro** – Selektīvs sistēmas un augšnes iedarbības herbicīds izsmūžu vienīgiņlapju un izsmūžu divīgiņlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešos, ziemas miežos, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

**H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. ● **H361D** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. ● **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH208** Satur pēndimetālu un 1,2-benzotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P201** Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukciju. ● **P280** Izmantot aizsargācīmus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P308 + P313** Ja nokūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīniskā palīdzību. ● **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārnāt ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. Ja tiek lietotas smidzinājuma nenses mažinošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem skatīt preparāta lietošanas instrukciju. ● **SPe3** Lai aizsargātu neizdīgušu kultūraugus un ar lietojumu nesaisītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantotajai zemei. Aizsargosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantotajai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nenses mažinošas sprauslas.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112**

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērta veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasāšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

## LIETUVA

**Legacy<sup>®</sup> Pro** yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms vienasnakiems ir dviskelėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietugrių ir žieminių rugių pasėluose.

**Skirtas profesionaliam naudojimui.**

*Sudėtyje yra pēndimetalino ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.*  
● Įtariama, kad sukelia vėžį. ● Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius paūkimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus. ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ● Esant poveikiui arba jeigu numatoma poveikis: kreiptis į gydytoją. ● Surinkti ištekejusią medžiagą. ● Talpyklą šlainti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vingti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90% dulksnų mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdinti daugiametėmis augalais ir naudoti 90% dulksnų mažinančius purkštukus. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50% dulksnų mažinančius purkštukus.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**Sandėliavimas** – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35°C.

## EESTI

**Legacy<sup>®</sup> Pro** on selektiivne kontaktne ja mulja kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kahelehteliselte umbrohtude tõrjeks talnisul, -odral ja -tritikalel.

**Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Toode sisaldab ohtlikku ainet: kloortoleroon.**

**H351** Arvatavasti põhjustab vähktõbe. ● **H361D** Arvatavasti kahjustab loodet. ● **H410** Väga mürgine veeoranismidele, pikaajaline toime. ● **P102** Hoida lastele kättesaamatu kohas. ● **P201** Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. ● **P280** Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastus/kaitseprille/kaitsemaski. ● **P308+P313** Kokkupuute või kokkupuuteklahuse korral: pööruda arsti poole. ● **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. ● **P501** Sisu/mahtu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● **EUH208** Sisaldab pēndimetaliini, 1,2-bensotiazoliini-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Veeoranismide kaitsemiseks pida kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit pinnaveekogust. Mittesihtmärkeimede kaitsemiseks pida kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast.

**Mürgustev korral võtke ühendust Mürgistusabekeskusega telefonil 8 5 2362052.**

**Hoiustamine** – Hoida toodet kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaamatu kohas. Hoida otseste päikesevalguse ja külma eest. Hoida eemal toidainest ja loomasaadast. Hoida ainult tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.

UFI: MA94-D1EF-W002-5D3M

GRUPA	HERBICIDŠ
GRUPĖ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID
5   3   12	

8 718077 004938



# LEGACY<sup>®</sup> PRO



## LATVIJA

**Legacy<sup>®</sup> Pro** – Selektīvs sistēmas un augnsens iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešos, ziemas miežos, ziemas tritikālēs un rudzū sējumos.

**H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. ● **H361D** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. ● **H410** Lieli toksiskus ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH208** Saņur pēdmetālinu un 1,2-benzotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P308 + P313** Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: līdziet medicīniskajam palīdzību. ● **P501** Atbrīvoties no saturu/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesei mazināšanas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem skatīt preparāta lietošanas instrukciju. ● **SPe3** Lai aizsargātu neizdīgšņu kultūras un ar lietojumu nesaietīšus neizdīgšņus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesei mazināšanas sprauslas.

**Avārijas gadījumā zīpot Uzšūdensības un glābšanas dienestam - telefons 112**

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiem saules stariem. Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0°C un ne augstākā par +35°C.

## LIETUVA

**Legacy<sup>®</sup> Pro** yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms vienašilėms ir dvishilėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietragių ir žieminių rugių pasėliuose.

**Skirtas profesionaliam naudojimui.**

*Sudėtyje yra pėdmetalinio ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.* ● [Iariama, kad sukelia vėžį. ● [Iariama, kad kenkia negimusiam vaikui. ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. ● Mūvėti apsauginius pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ● Esant poveikiui arba įėjus numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją. ● Surinkti ištekėjusią medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. ● Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakutė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąžą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinančius purkštukus.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**Sandėliavimas** – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35°C.

## EESTI

**Legacy<sup>®</sup> Pro** on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kaheüldieheliste umbrohtude tõrjeks talinisel, -odral ja -tritikal-lal.

**Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Toode sisaldab ohtlikku ainet: kloortoluroon.**

**H351** Arvatavasti põhjustab vāhtkõde. ● **H361D** Arvatavasti kahjustab loodet. ● **H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikajaline toime. ● **P102** Hoida laste kättesaamatus kohas. ● **P201** Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. ● **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitsevõlvastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● **P308 + P313** Kokkupuute või kokkupuutekahkluse korral: pōrduda arsti poole. ● **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. ● **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● **EUH208** Sisaldab pēdmetālini, 1,2-benisotiazolin-3-ooni. Vōib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohusatame vāltimiseks jārgida kasutusjuhendit. ● **SP1** Vāldida vahendi vōi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavele lähedal mitte puhastada/Vāldida saastamist lābi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Veeorganismide kaitsemiseks pōidada kinni mittepitsitavast puhvervōondist 10 meetrit pinnaveekogust. Mitteshatmārktaimed kaitsemiseks pōidada kinni mittepitsitavast puhvervōondist 5 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast.

**Mürgistus korral võtke ühendust Mürgistus-teabekeskusega telefonil 8 5 2362052.**

**Hoiustamine** – Hoida toodet kuivas, hästi ventilatavas, jahedas, lastele kättesaamatus kohas. Hoida otsese päikesevalguse ja külma eest. Hoida eemal toiduainest ja loomasaadast. Hoida ainult tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.

UFI: MA94-D1EF-W002-5D3M

GRUPA	5   3   12	HERBICĪDS
GRUPĒ		HERBICIDAS
GRUPP		HERBITSIID



8 718077 004938

atdaryti čia  
atveriet šeit  
avada siit

LATVIJA

LIETUVA

EESTI

L102451PBB\_J4

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Norādījumi ārstam**

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs **67042473**.

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Legacy® Pro ir selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Legacy® Pro ir suspensijas koncentrāta formā; satur darbīgās vielas - diflufenikānu 40 g/L, pendimetalīnu 300 g/L, hlortoluronu 250 g/L. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija nodrošina herbicīda iedarbību uz plašu nezāļu spektru, augstu preparāta efektivitāti, kā arī samazina nezāļu rezistences veidošanās risku.

Legacy® Pro lieto tūlīt pēc graudaugu sadīgšanas līdz to trīs lapu stadijai (AS 10-13).

Darbīgā viela diflufenikāns pieder piridinkarboksamīdu klases sastāvā esošajai nikotīnanilīdu grupai, pendimetalīns pieder dinitronanilīnu grupai, hlortolurons pieder fenil-urīnvielas grupai. Visas darbīgās vielas ir sistēmas un augsnes iedarbības, ko augi absorbē caur saknēm, dīgstiem un lapām. Legacy® Pro efektīvi kontrolē nezāles pirms un īsi pēc to sadīgšanas.

Diflufenikāns darbojas kā karotenoīdu biosintēzes inhibitoris. Dzeltenie karotenoīdu pigmenti absorbē gaismu fotosintēzei. Diflufenikāns noārd šos pigmentus, tādējādi traucējot fotosintēzi. Rezultātā pret diflufenikānu jutīgās nezāles nespēj normāli funkcionēt un iet bojā.

Tā kā karotenoīdu pigmenti tiek sintezēti apikālajā meristēmā (auga augšanas punktā), tad arī uz šo nezāļu daļu primāri ir vērstā diflufenikāna iedarbība, kur parādās tipiskas herbicīda iedarbības pazīmes – audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Diflufenikāns efektīvi kontrolē viengadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles (maura skareni *Poa annua*, panātres *Lamium* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., madaras *Galium* spp. u.c.).

**Hlortolurons** iedarbojas uz nezāļu augiem, kavējot fotosintēzes procesā iesaistīto elektronu transportu augā, kam ir būtiska nozīme augu augšanā un attīstībā. Hlortolurons efektīvi kontrolē kaitīgākās ziemojošās viendīgļlapju nezāles, kā rudzusmilgu *Apera spica-venti*, pelastīšu lapsasti *Alopecurus myosuroides*, kā arī nozīmīgākās divdīgļlapju nezāles (tīruma kumelīti *Matricaria inodora*, parasto rudzupuķi *Centaurea cyanus*, parasto virzu *Stellaria media* u.c.).

**Pendimetālīns** pieder dinitroanilīnu ķīmisko savienojumu grupai, kas kavē šūnu dalīšanos. Jūtīgās nezāles iet bojā dīgšanas laikā, vai arī to augšanas un attīstība tiek apturēta, ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas. Apstrādātās nezāles iet bojā dažu nedēļu laikā. Pendimetālīns efektīvi kontrolē dažas viendīgļlapju nezāles, kā maura skareni *Poa annua*, parasto rudzusmilgu *Apera spica-venti*, un daudzas divdīgļlapju nezāles (virzas *Stellaria* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., magones *Papaver* spp. u.c.).

Vislabāko un ātrāk sasniedzamo efektu ar Legacy® Pro var iegūt, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas vai tsi pēc to sadīgšanas. Nezāles parasti iet bojā apmēram 2-4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem. Legacy® Pro nodrošina nezāļu kontroli, kas var ilgt pat līdz 8 nedēļām.

Pēc izsmidzināšanas Legacy® Pro uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izeug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgštiem. Vislabākā efektivitāte tiek sasniegta, ja apstrādes laikā augsne ir kvalitatīvi sagatavota, ar sīdruptainu struktūru, bez cilām un kunkuljiem, uz augsnes virsmas nav augu atlieku. Ja apstrādi veic pēc nezāļu sadīgšanas, tad tās herbicīdu absorbē caur lapām. Mazas, aktīvi augošas nezāles tiek iznīcinātas efektīvāk. Augsts gaisa mitrums un temperatūra sekmē herbicīda iedarbību uz nezālēm. Uz nezālēm, kas apstrādes laikā ir lielākā attīstības stadijā (vairāk kā 3-4 īstās lapas), herbicīds arī iedarbosies, bet tās netiks pilnībā iznīcinātas. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu. Nezāles kļūst mazāk jutīgas pret herbicīdu, pieaugot to vecumam.

**Legacy® Pro efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 1.8 L/ha:**

**Ļoti laba efektivitāte (95-100%):**

maura skarene (*Poa annua*), lauka ilzīte (*Anthemis arvensis*), ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), sīkā godrene (*Geranium pusillum*), sārta panātre (*Lamium purpureum*), tīruma kumelīte (*Tripleurospermum inodora*), ārstniecības kumelīte (*Chamomilla recutita*), parastā virza (*Stellaria media*), tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*), veronikas (*Veronica* spp.), tīruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*).

**Laba efektivitāte (85-94.9%):**

parastā rudzusmilga (*Apera spica-venti*), zīda magone (*Papaver rhoeas*), ķeraīņu madara (*Galium aparine*), rapsis sārņaugš (*Brassica napus*), zilā rudzupuķe (*Centaurea cyanus*), tīruma vijolīte (*Viola arvensis*).

**Vidēja efektivitāte (70-84.9%):**

dārza vējgrīķis (*Polygonum convolvulus*).

**Zema efektivitāte (50-69.9%):**

baltā balanda (*Chenopodium album*).

**LIETOŠANA**

**Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi**

Deva: 1.8 L/ha.

Apstrādes laiks: **Isī pēc graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 3 lapu stadijai (AS 10-13).**

Legacy® Pro nav ieteicams lietot sējumu apstrādei, kam bojājumus var būt radījis sals, sausums, ilgstoši pārmitrī apstākļi laukā, vai kultūraugam trūkst minerālo barības vielu.

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:** visiem kultūraugiem – viena reize.

**Ieteicamais darba šķidrums patēriņš:** 200-400 L/ha.

**Piezīme:** Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

## REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Legacy® Pro satur darbīgās vielas - diflufenikanu, pendimetalīnu un hlortoluronu, katrai no tām ir atšķirīgs iedarbības veids. Atbilstoši HRAC klasifikācijai diflufenikans pieder F1 grupai, pendimetalīns – K1 grupai, hlortolurons – C2 grupai. Trīs dažādu darbīgu vielu kombinācija samazina nezāļu rezistences veidošanās risku. Tomēr jebkurā nezāļu populācijā var būt sastopami mazāk jutīgi vai dabiski rezistenti (izturīgi) īpatņi. Ja vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus atkārtoti tiek lietoti herbicīdi ar vienu un to pašu iedarbības veidu, tiek sekmēta dabiskā izlase, kad rezistentās nezāles savairojas un kļūst dominantas. Ir pieņemts, ka nezāli uzskata par rezistentu, ja tā ir dzīva pēc apstrādes, kas veikta pareizā laikā un ar reģistrēto herbicīdu devu.

Krusteniskā rezistence ir iespējama starp pendimetalīnu un citiem K2 grupas herbicīdiem. Ir iespējama arī krusteniskā rezistence starp hlortoluronu un citiem C2 grupas herbicīdiem.

Latvijā nav pieejami dati par nezāļu rezistenci pret Legacy® Pro darbīgajām vielām. Lai novērstu rezistences veidošanos, ir stingri jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Herbicīdu lietot saskaņā ar integrētās augu aizsardzības sistēmas prasībām.
2. Vienā un tajā pašā laukā dažādos gados lietot dažāda iedarbība veida herbicīdu maisījumus, kas ierobežo vienas un tās pašas nezāles. Lietot pilnu reģistrēto herbicīdu devu un apstrādi veikt pareizā laikā.
3. Pēc apstrādes apsekot laukus, konstatēt, vai nezāles ir atmirušas. Informēt preparāta ražotāju par samazināto efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

## SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Legacy® Pro var jaukt mangāna sulfātu. Tvertnes saturs jāizmazina nekavējoties, un tas ir nepārtraukti jāmaisā. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojiet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Legacy® Pro

daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

## SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot konteineru.
- Nonemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

## PĒCKULTŪRAS UN PĀRSĒŠANA

Augmaiņā nav ierobežojumu pēckultūru sējai.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, ziemošanas laikā gājis bojā, tad pavasarī laukā var sēt jebkuru kultūraugu, augsni pirms tam uzarot. Ja lauka apstrādei izmanto minimalizēto augsnes apstrādes tehnoloģiju, tad var sēt tikai vasaras miežus, vasaras kviešus, zirņus, lauka pupas, kā arī stādīt kartupeļus.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, gājis bojā jau rudenī, tad pārsēt var tikai ar graudaugiem; vēlā rudenī ieteicams pārsēt tikai ar ziemas kviešiem.

## TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalo ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo taru jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 50%, tad jāievēro 20 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 75%, tad jāievēro 15 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 90%, tad jāievēro 10 m aizsargjosla.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.



## LIETUVA

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

## BENDRA INFORMACIJA

**Legacy® Pro** yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir vienasiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pašėluose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

**Legacy® Pro** yra koncentruota suspensija, kurios sudėtyje yra 40 g/L diflufenikano, 300 g/L pendimetalino ir 250 g/L chlorotolurono. Trijų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, aukštą efektyvumą, taip pat sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų.

## VEIKIMO BŪDAS

Diflufenikanas priklauso piridinkarboksamidų, pendimetalinas – dinitroanilinų, o chlorotoluronas – fenilkarbamidų cheminei herbicidų grupei. Visos šios veikliosios medžiagos, turinčios dirvinį ir kontaktinį veikimą, pasisavinamos per augalų šaknis ir lapus. **Legacy® Pro** efektyvus panaudojus iki piktžolių sudygimo, taip pat veikia dygstančias ir sudygusias piktžoles.

**Diflufenikanas** blokuoja karotinoidų biosintezę. Be karotinoidų herbicidui jautrios piktžolės negali funkcionuoti ir jos sunyksta. Poveikis piktžolėms pasireiškia audinių pabalimu, ypač augimo kūgelio vietoje. Diflufenikanas efektyvus prieš vienasiltes ir dviskiltes piktžoles (*Poa annua*, *Lamium sp.*, *Veronica sp.*, *Viola ap.*, *Galium sp.* ir kt.)

**Chlorotoluronas** slopina fotosintezės elektronų perdavimo procesą, kuris būtinas augalo gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Chlorotoluronas efektyvus prieš daugelį vienaskilčių piktžolių, pvz. *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides* taip pat veikia pagrindines dviskiltes piktžoles (*Tripleurospermum inodorum*, *Centaurea cyanus*, *Stellaria media* ir kt.)

**Pendimetalinas** priklauso dinitroanilinų cheminei grupei, kuri slopina ląstelių dalijimąsi. Jautrios herbicidui piktžolės žūva dygstant arba, jei nupurškiamos jau sudygusios piktžolės, jų augimas sustoja. Paveiktos piktžolės sunyksta po kelių savaičių. Pendimetalinas veikia kai kurias vienasiltes piktžoles (*Poa annua*, *Apera spica-venti*) ir daugelį dviskilčių piktžolių (*Stellaria sp.*, *Veronica sp.*, *Viola sp.*, *Papaver sp.* ir kt.).

## NAUDOJIMAS

Geriausias ir greičiausias poveikis piktžolėms pasiekiamas panaudojus **Legacy® Pro** iki sudygimo arba joms sudygus, kol jos yra mažos ir aktyviai auga. Priklausomai nuo augimo sąlygų paveiktos piktžolės sunyksta per 2–4 savaites. **Legacy® Pro** turi kontaktinį bei išliekamąjį dirvinį poveikį, kuris palankiais augimo sąlygomis išlieka iki 8 savaičių.

Po purškimo, **Legacy® Pro** susijungia su dirvos dalelėmis ir suformuoja apsauginę plėvelę jos paviršiuje. Piktžolėms dygstant, jos skverbiasi per herbicidu apdorotą dirvos sluoksnį, absorbuodamos herbicidą per

ūglius ir šaknis. Piktžolės, dygstančios iš Gilesnių dirvos sluoksnių gali būti mažiau paveiktos, kadangi jų šaknys formuojasi herbicidu neapdorotoje dirvoje. Geriausias poveikis pasiekiamas, kai dirva lygi, negrumstuota, be augalų liekanų.

Purškiant **Legacy® Pro** piktžolėms sudygus, jos herbicidą absorbuoja per lapus. Mažos, aktyviai augančios piktžolės sunaikinamos geriausiai. Didesnės (3-4-ųjų lapelių) piktžolės taip pat paveikiamos, bet gali būti nevisai sunaikintos. Didelė drėgmė ir aukšta oro temperatūra sustiprina veikimą per lapus. Didesnės piktžolės mažiau jautrios herbicidui.

### Legacy® Pro efektyvumas

#### Labai jautrios/jautrios piktžolės (95-100 %):

Vienmetė miglė (*Poa annua*)

Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)

Veronikos (*Veronica* spp.)

Dirvinė čiuzutė (*Thlaspi arvense*)

Daržinė žliugė (*Stellaria media*)

Trikerė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Dirvinis bobramunis (*Anthemis arvensis*)

Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)

Vaistinė ramunė (*Matricaria chamomilla*)

#### Jautrios piktžolės (85-94,9 %):

Aguona birulė (*Papaver rhoeas*)

Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum inodorum*)

Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)

#### Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %):

Dirvinė smilguolė (*Apera spica-venti*)

Kibusis lipikas (*Galium aparine*)

Rugiagėlė (*Centaurea cyanus*)

#### Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9 %):

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)

Rapsų pabiros (*Brassica napus*)

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

**Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai**

**Naudojimo laikas:** 1-3 lapelių tarpsnyje (BBCH 10-13)

**Norma:** 1,8 L/ha Legacy® Pro

**Legacy® Pro** nepartartina naudoti, jei pasėlis paveiktas streso dėl šalnos, sausros, užmirkimo arba pasėliuose, kuriuose yra maisto medžiagų trūkumas.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1**

**Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 400 L/ha.**

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad nebūtų purškimo juostų persidengimo galulaukėse ir posūkiuose.

## FITOTOKSIŠKUMAS

Panaudojus Legacy® Pro, gali pasireikšti nežymūs fitotoksiškumo požymiai (pabalimas, pageltimas, chlorozė, nekrozė), tačiau šie požymiai laikui bėgant išnyksta ir neturi neigiamos įtakos derliui ir derliaus kokybei.

## MAIŠYMAS

Informacijos apie Legacy® Pro maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

Legacy® Pro mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

## SĖJOMAINA

Nuėmus javų, pirkštų Legacy® Pro, derlių, giliai suarus dirvą (20 cm), galima auginti visus augalus. Vasarinius miežius, vasarinius kviečius, cukrinius runkelius, žirnius taip pat galima sėti po minimalaus (5 cm) žemės įdirbimo.

Jei pasėliai neperžiemoja, pavasarį dirvą giliai suarus gali būti sėjami/sodinami bet kurie augalai. Po minimalaus žemės dirbimo (5 cm) gali būti sėjami/sodinami vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai arba žirniai. Jei pasėlis žūva rudenį, atsėti galima tik žieminius javais, giliai suarus dirvą.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Legacy® Pro sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: diflufenikanas (HRAC kodas 12), pendimetalinas (HRAC kodas 3) ir chlortoluronas (HRAC kodas 5). Trijų veikliųjų medžiagų derinys sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų. Vis dėlto bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Kryžminis atsparumas yra tikėtinas tarp pendimetalino ir kitų 3 grupės herbicidų. Taip pat tikėtina, kad kryžminis atsparumas yra tarp chlorotolurono ir kitų 5 grupės herbicidų.

Duomenų apie piktžolių atsparumą Legacy® Pro veikliosioms medžiagoms Lietuvoje šiuo metu nėra. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
2. Mišiniuose, paeilui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;

4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis.

### TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švari vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Legacy® Pro ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų vandenį. Nepalikite purkštuvu su tirpalu ilgesniam laikui. Po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą.

### PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po naudojimo kruopščiai išplaukite įrenginį. Visiškai ištuštinkite purkštuvu talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvu talpą švari vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plauinant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvu talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

### SAUGOS PRIEMONĖS

**Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontakto su produktu.**

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.**

**Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).**

**Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).**

**Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.**

**Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.**

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pritraukus nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvu talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## PRODUKTO LAIKYMAS

Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0° C iki +35° C.

## PASTABA!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytiems aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registruotas ženklas

## EESTI

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.**

## ÜLDKIRJELDUS

**Legacy® Pro** on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid üheheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -ordral ja -tritikaleel. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

**Legacy® Pro** on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab 40 g/L diflufenikaani, 300 g/L pendimetalini ja 250 g/L kloortolurooni. Kolme toimeaine kombinatsioon tagab umbrohtude tõrje laia spektri ja selle kõrge efektiivsuse, samuti vähendab see umbrohtude taimekaitsevahendile resistentsuse riski.

## TOIMEMEHHANISM

Diflufenikaan kuulub piridinkarboksamiidide, pendimetalin - dinitroaniiliniidide ja kloortoluroon - fenüülkarbamiidide herbitsiidide keemilisse rühma. Kõiki neid süsteemseid toimeaineid, mis toimivad kontaktelt ja mulla kaudu, omastavad taimed juurte ja lehtede kaudu. **Legacy® Pro** on tõhus kasutades seda enne umbrohu idanemist, samuti avaldab mõju ka idanevatele ja idanenud umbrohule.

**Diflufenikaan** pärsib karotenoidide biosünteesi. Karotenoidideta ei saa herbitsiididele vastuvõtlikud umbrohud toimida ja hävivad. Mõju umbrohule avaldub kudede valastumise näol, eriti kasvukuhiku kohtades. Diflufenikaan on efektiivne üheheiduleheliste ja laialehiste umbrohtude (*Lamium sp.*, *Veronica sp.*, *Viola sp.*, *Galium sp.* jms) vastu.

**Kloortoluroon** pärsib fotosünteesi elektronide ülekandeprotsessi, mis on vajalik taime elutähtsate funktsioonide säilitamiseks. Kloortoluroon on efektiivne paljude üheheiduleheliste umbrohtude nt *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides*, samuti põhiliste laialehiste umbrohtude (*Matricaria inodora*, *Centaurea cyanus*, *Stellaria media* jms) vastu.

**Pendimetalin** kuulub dinitroaniiliniidide keemilisse rühma, mis pärsib rakkude jagunemist. Herbitsiiditundlikud umbrohud hävivad idanemisel või juba idanenud umbrohtude puhustamisel peatub nende kasv. Taimekaitsevahendist mõjutatud umbrohud hävivad paari nädalaga. Pendimetalin on efektiivne mõnede üheheiduleheliste umbrohtude (*Poa annua*, *Apera spica-venti*) ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude (*Stellaria sp.*, *Veronica sp.*, *Viola sp.*, *Papaver sp.* jms) vastu.

## KASUTUSJUHEND

Parimat ja kiireimat mõju umbrohtudele saavutatakse kasutades **Legacy® Pro'd** enne või pärast nende idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Sõltuvalt kasvutingimustest hävivad taimekaitsevahendist mõjutatud umbrohud 2-4 nädalaga. **Legacy® Pro'l** on kontaktne ja kestav mullas säiliv mõju, mis püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat.

Pärast pritsimist seondub **Legacy® Pro** mullaosakestega ja moodustab mulla pinnal kaitsva kile. Umbrohtude idanemisel tungivad need läbi herbitsiididega töödeldud mullakihist ja herbitsiid imendub võrsete ja juurte kaudu. Umbrohud, mis idanevad sügavamatest mullakihtidest, võivad olla mõjutatud vähem, kuna nende juured moodustatakse herbitsiidiga töötlemata mullas. Parim toime saavutatakse siis, kui muld on tasane, mullatükkide ja taimejäädiketa.

**Legacy® Pro'ga** pritsimisel siis, kui umbrohud on juba idanenud, imendub herbitsiid läbi lehtede. Väikesed,

aktiivselt kasvavad umbrohud hävivad kõige paremini. Suuremad (3-4 lehega) umbrohud on samuti mõjutatud, kuid ei pruugi täielikult hävida. Kõrge õhuniiskus ja -temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Suuremad umbrohud on vähem herbitsiiditundlikud.

### Legacy® Pro tõhusus

#### Väga tundlikud/ tundlikud umbrohud (>95%):

Harilik rukkikastehein (*Apera spica venti*)  
Murunurmikas (*Poa annua*)  
Põld-rebasesaba (*Alopecurus myosuroides*)  
Roomav madar (*Galium aparine*)  
Kesalilled (*Matricaria* spp.)  
Harilik punand (*Lamium purpureum*)  
Põldkannikesed (*Viola* spp.)  
Mailased (*Veronica* spp.)  
Kukemagun (*Papaver rhoeas*)  
Põld-litterhein (*Thlaspi arvense*)  
Vesihein (*Stellaria media*)  
Harilik hiirekõrv (*Capsella bursa pastoris*)  
Põld-lõosilm (*Myosotis arvense*)  
Raps (*Brassica napus*)  
Kurerehad (*Geranium molle*)

#### Keskmiselt tundlikud (85 – 95 %):

Rukkiill (*Centaurea cyanus*)  
Valge hanemalts (*Chenopodium album*)

## KASUTUSOOVITUSED

### Talinisu, talioder, talitritikale

Kasutusaeg: 1-3 lehe faasis (BBCH 10-13)

Kulunorm: 2,0 L/ha Legacy® Pro'd

Legacy® Pro'd ei ole soovitatav kasutada, kui põllukultuur on mõjutatud stressist külma, põua või liigniiskuse tõttu või põllukultuuri toitainevaeguse korral.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1  
Soovituslik vee maht: 200 - 400 L/ha.

## SEGAMINE

Teavet Legacy® Pro segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiate tootja infomaterjalis, veebilehel või võtke ühendust tootja esindajaga.

## KÜLVIKORD

Tavaelukorras külvikorra piirangud puuduvad. Kui põllukultuur ei talvitu edukalt, võib kevadel sügavkülmise järel külvata/ istutada mistahes taimi. Pärast minimaalset maaharimist (5 cm) võib külvata/ istutada suviotra, -nisu, kartulit, ube või herneid. Kui põllukultuur häviv sügisel, võib uuesti

külvata ainult talviljju.

## RESISTENTSUSE TÕRJEVAHENDILE RISKI VÄHENDUSMEETMED

**Legacy® Pro** sisaldab 3 toimeainet: diflufenikaani (HRAC kood F1), pendimetaliini (HRAC kood K1) ja kloortolurooni (HRAC kood C2). Kolme toimeaine kombinatsioon vähendab umbrohtude taimekaitsevahendile resistentsuse tekkimise riski. Siiski võib mistahes umbrohupopulatsioonis olla vähem tundlikke või loomulikult vastupidavaid üksikuid taimi. Kui samal põllul kasutatakse mitu aastat järjest sama toime mehhanismiga herbitsiidi, paljunevad ja muutuvad domineerivaks loodusliku valiku tagajärjel vastupidavad umbrohuliigid. Taime peetakse resistentseks, kui pärast õigeaegset herbitsiidiga pihustamist ja soovitavas koguses jääb taim ellu.

Ristresistentsus on tõenäoline pendimetaliini ja muude K1-rühma herbitsiidide vahel. Samuti on tõenäoline, et ristresistentsus on olemas kloortolurooni ja muude C2-rühma herbitsiidide vahel.

Ained umbrohtude resistentsuse kohta **Legacy® Pro** toimeainetele Eestis hetkel puuduvad. Vältimaks umbrohtude resistentsuse teket tuleb järgida järgmisi soovitusi:

1. Rakendage umbrohutõrje integreeritud süsteemi;
2. Kasutage segudes, järjestikel või erinevatel aastatel samal põllul erineva toimega herbitsiidide, mis hävitavad samu umbrohtusid;
3. Kasutage herbitsiidi koguse soovitusliku täismäära ja soovituslikul ajal;
4. Pärast herbitsiidi kasutamist kontrollige, kas umbrohi on põllul hävinud. Ärge laske umbrohul paljuneda vegetatiivselt ja seemnete kaudu.

## OHUTUSABINÕUD

Rasedad ja fertiilses eas naised peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.

**Lahjendamata tootega töötades või puudutades sellega saastunud pindu** tuleb kanda kaitseriietust, mis on mõeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standarditele EN 340 ja EN 14605) ja kinniseid jalatseid. Tuleb kanda kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN 374), nt polüvinüülkloriidist, nitrilist ( $\geq 0,4$  mm) vms.

**Traktoriga veetava hüdraulilise pritsiga pritsimisel** soovitakse kasutada kaitseriietust, mis on mõeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standarditele EN 340 ja EN 14605), kanda kinniseid jalatseid ja kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN 374).

**Töötajad** võivad minna töödeldud alale pihustatud lahuse ärakuivamisel.

**Hügieeniabinõud.** Tööajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida lahuse sattumist nahale, silma ja tööriistele. Vältida töölahuse udu sissehingamist. Pärast tööd või enne vaheaega võtta töörõivad seljast, pesta ennast vee ja seebiga. Töörõivad hoida eraldi. Töörõivaste määrdumisel võtta töörõivad seljast ja puhastada. Kui puhastada ei ole võimalik, tuleb töörõivad hävitada vastavalt kehtivatele õigusaktide nõuetele.

## TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsi ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja viimased tilgad, tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pritsi ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid veejoaga survetugevusega 3-5 baari. Loputusvesi valada pritsipaaki.

Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 % pakendist puhta veega ja pärast korgi



tihedalt kinnikeeramist loksutada 30 sekundit, et vesi satuks pakendi kõikidesse nurkadesse. Seejärel valada loputusvesi pritsipaaki. Protseduuri korratakse vähemalt kolm korda nii kaua, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.

Pritsi või pakendi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud põllule. Vastavalt nõuetele loputatud pakendid on ohtlikud jäätmed, mida tuleb koguda eraldi muudest jäätmetest ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

## ESMAABI

Üldine nõuanne: Vältida aine sattumist nahale, silma ja riietele. Võtta saastunud tööriivad viivitamatult seljast. Probleemide tekkimisel pöörduda arsti poole. Näidata arstile pakendit, etiketti ja/või ohutuskaarte.

Sisehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: võtta viivitamatult seljast saastunud riietus ning pesta korralikult seebi ja sooja jooksva vee all, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: eemaldada viivitamatult kontaktläätsed ja loputada avatud silmad mõne minuti jooksul jooksva veega. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada suud viivitamatult veega.

Soovitused arstile: ravi vastavalt sümptomitele. Spetsiifiline vastumürk puudub.

**Ärge püüdke teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.**

Mürgistuse korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 8 5 2362052.

## SÄILITAMINE

Hoida toodet kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, laste kättesaamatus kohas. Hoida otsese päikesevalguse ja külma eest. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödadest. Hoida ainult tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.

## LAHUSE SEGAMINE

Täitke puhta veega pool pritsipaagi mahutist ning lülitage sisse segisti. Lisage vajalik kogus **Legacy® Pro'd** ja lisage ülejäänud vajaminev veekogus. Segisti olgu sisse lülitatud kogu pritsimisaja jooksul.

Paagisegude valmistamisel kasutage ainult puhast vett. Ärge jätke töölahust pritsi pikemaks ajaks seisma. Pärast pritsimist peske prits korralikult nii seest kui väljast.

## MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on tarnitud tootjapakendis. Kõik soovitused toote kasutamise suhtes põhinevad praegusel ajal tootja kasutuses oleval kogemusel. Tootja ja turustaja ei vastuta toote tõhususe eest, kui on rikutud etiketil näidatud toote säilitamis- ja kasutustingimusi ning samuti kui on tekkinud tingimused, mis on väljaspool tootja kontrolli (herbitsiidile resistentsete umbrohtude tekkimine jne).

® ADAMA registreeritud kaubamärk



# LEGACY® PRO



## ADAMA

©Adama Registrations B.V.



### HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/  
koncentruota suspensija/  
suspensiooikonsentraat (SC)



### Darbīgā vielas/Veiklīji medžiagas/Toimeained

- diflufenikans/diflufenikanas/diflufenikaan ..... 40 g/L
- pendimetalīns/pendimetalinas/pendimetalīn ..... 300 g/L
- hlortolurons/chlorotoluronas/kloortoluroon ..... 250 g/L



### Informācija / Informacija / Informatie

 **LATVIJA**

Reģistrācijas Nr.: 0415  
 Reģistrācijas klase: 2.  
 Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma  
 Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā  
 Pārstāvniecība Latvijā:  
 Tālr.: +371 2944 62 85

Ražotājs, tā adrese/  
 Gamintojas/Tootja/pakendāja:  
 ADAMA Agran Ltd.  
 P. O. Box 262  
 77102 Ashdod/Ashdod/Ashdod  
 Izraēla/Izraelis/Israel

 **LIETUVA**

Registracijos numeris: AS2-41H (2020)  
 Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės  
 Galiojimo laikas: 2 metai  
 Atstovas Lietuvoje:  
 Tel.: +370 85 210 86 22

Registreeimise haldaja:  
 ADAMA Registrations B.V.  
 P.O. Box 355  
 NL-3830 AK Leusden  
 Niderlande/Nyderlandai/  
 Madalmaad  
 Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00  
 www.adama.com

 **EESTI**

Eesti reg. nr.: 0541/03.02.15  
 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil  
 Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības  
 Ipašnieks, tā adrese /  
 Registrācijas savinikas /  
 Registreerimise haldaja:  
 ADAMA Registrations B.V.  
 P.O. Box 355  
 NL-3830 AK Leusden  
 Niderlande/Nyderlandai/  
 Madalmaad  
 Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00  
 www.adama.com

**LATVIJA**  
 Legacy® Pro – Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds izsmūža vienīgdlapju un izsmūža divlīgdlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. ● H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. ● H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● EUH208 Satur pendimetalīnu un 1,2-benzotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. ● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● P201 Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukciju. ● P280 Izmantojiet aizsargācīmus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīniskā palīdzību. ● P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīplju un ūdensteču tuvumā. Izstrāgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● SP3 Laiz aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīplēm un ūdenstečiem. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesi maziņšos sprauslās, aizsargjoslas lielumā līdz ūdenstīplēm un ūdenstečiem skatīt preparāta lietošanas instrukciju. ● SP3 Laiz aizsargātu neizdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaietītu neizdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi maziņšos sprauslās.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

**LIETUVA**  
 Legacy® Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms vienasikliems ir dviskikliems piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. ● Įtariama, kad sukelia vėžį. ● Įtariama, kad kenkia negimusiems vaikui. ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ● Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją. ● Surinkti ištekiusį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teises aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinčių/vengti taršos per drenąžį iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinčių ir melioracijos griovių ir naudoti 90% dulksnų mažinančius purškštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinčių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 90% dulksnų mažinančius purškštukus. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50% dulksnų mažinančius purškštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonai: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

**Sandėliavimas** – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginio saulės spinduliu ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35° C.

**EESTI**  
 Legacy® Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjes talinisel, -odral ja -tritikaleel.

Toode on mēeldud professionaalseks kasutamiseks. Toode sisaldab ohtlikku ainet: kloortoluroon.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. ● H361d Arvatavasti kahjustab loodet. ● H410 Väga mürgine veerorganismidele, pikaajaline toime. ● P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. ● P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. ● P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduka arsti poole. ● P501 Mahavoolanud toode kokku koguda. ● P391 Sisu/mahuti kõrvaldaa vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● EUH208 Sisaldab pendimetalini, 1,2-bensotiazoliini-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. ● EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● SP1 Vältida vahendi või selle pakendi veetä satumist (Seedmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida soostamist läbi looda ja teede drenaažide). ● SP3 Veerorganismide kaitsemiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervõrändist 10 meetrit pinnaveekogust. Mitesihtmärkeid mitte kaitsemiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervõrändist 5 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistus-teabekeskusega telefonil 8 5 2362052.

Hoistamine – Hoida toodet kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal päikesevalguse ja külma eest. Hoida otsest toiduinest ja loomasöödad. Hoida ainult tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.



UZMANĪBU  
ATSARGĪAI  
HOIATUS

# 4 x 5 L

## UN3082



GRUPA  
GRUPĖ  
GRUPP

# 5 | 3 | 12

HERBICĪDS  
HERBICIDAS  
HERBITSIID



SKALAUK TEISINGAI

L102450CFR\_14



# LEGACY<sup>®</sup> PRO



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



UN3082

LJ0245PAAR\_34

30 x 20 L