



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDAS

**koncentruota
suspensija**



Veikliosios medžiagos

● Metamitronas	350 g/L (30.7 %)
● Etofumezatas	150 g/L (13.2 %)



Informacija

Registracijos numeris: AS2-3H(2020)
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +8 5 21 08 622

Registracijos savininkas:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai
Tel.: +31 33 205 68 00
www.adama.com

Gamintojas:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
77102 Ashdod
Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

**NO VARNISH
AREA**



LIETUVA

L111562IPFR_06

5 L e



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA



HERBICIDAS

koncentruota suspensija



LIETUVA

Goltix[®] Super yra triazinonų ir benzofuranų at-rankinio veikimo kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas naikinti po sudygimo vienmetes dviskiltės piktžolės, taip pat turintis poveikį ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms, naudojamam cukrinių, pašarinių runkelių pasėliuose.

Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra 1,2-benzistiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. ● Surinkti ištekęsį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais auga-

GRUPĖ 5 | 15 HERBICIDAS

lais. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metrų apsaugos zoną iki nežemės ūkio paskirties žemės. ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba etofumezato dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, neviršijant 1 kg/ha etofumezato. ● Operatorius privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos, arba purkšti galima tik traktoriniais ir/ar savaeigiais lauko purkštuvais, kurie turi dulksnų mažinančią įrangą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Produktas Goltix[®] Super turi būti laikomas sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, saugiamame, sausame ir vėdinamame sandėlyje. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir šalčio, laikyti atskirai nuo maisto bei pašarų. Produktą laikyti 0-30 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

LT11562IPBB_06



ATSARGIAI

UN3082



LIETUVA



8

718077 001784

atidaryti čia





GOLTIX® SUPER



HERBICIDAS

koncentruota suspensija



LIETUVA

Goltix® Super yra triazinonų ir benzofuranų atrankinio veikimo kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas naikinti po sudygimo vienmetes dviskiltės piktžolės, taip pat turintis poveikį ir kai kurioms vienasiklėms piktžolėms, naudojamam cukrinių, pašarinių runkelių pasėliuose. **Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Sudytyje yra 1,2-benzistiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. ● Surinkti ištekęsį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais

GRUPĖ 5 | 15 HERBICIDAS

augalais. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kuro kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba etofumezato dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, neviršijant 1 kg/ha etofumezato. ● Operatorius privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos, arba purkšti galima tik traktoriniais ir/ar savaeigiais lauko purkštuvais, kurie turi dulksnų mažinančią įrangą. **Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

Sandėliavimas – Produktas Goltix® Super turi būti laikomas sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, saugiaiame, sausame ir vėdinamame sandėlyje. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir šalčio, laikyti atskirai nuo maisto bei pašarų. Produktą laikyti 0-30 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ATSARGIAI

UN3082



LIETUVA



8 718077 001784

LIJ562IPBB_06

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMO BŪDAS

Metamitronas įsisavinamas per augalų šaknis, daigus ir išnešiojamas po visą augalą. Jis veikia kaip fotosintezės inhibitorius (slopina elektronų judėjimą fotosintezės metu). Jautrių piktžolių daigai tampa chlorotiški, pagelsta ir galiausiai nuvysta. Metamitronas veiksmingas naikinant daugelį plačialapių piktžolių bei vienmetes migles.

Etofumesatas, kaip ir metamitronas, įsisavinamas per augalų šaknis bei daigus. Tai sisteminis herbicidas, kuris slopina ląstelių dalijimąsi bei lipidų sintezę. Etofumesato veikimo dėka piktžolių lapai pirmiausia kilsteli į viršų, paskui susisuka, tampa chlorotiniais ir netrukus sunyksta. Etofumesatas ypač veiksmingas naikinant dėmėtąjį rūgtį, daržines žiūges, balandas, trikertes žvagines, raudonžiedžius progailius.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Goltix® super yra atrankinio veikimo triazinonų ir benzofuranų herbicidų klasės kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas po sudygimo naikinti vienmetes dviskilties piktžoles, taip pat turi poveikį ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms, naudojamam cukrinių, pašarinių runkelių pasėliuose.

Jautrios piktžolės (≥85% efektyvumas):

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)
Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)
Dirvinė čiuzutė (*Thlaspi arvense*)
Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)
Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)
Šiurkštusis burnotis (*Amaranthus retroflexus*)
Nuodingoji šunpetre (*Aethusa cynapium*)
Raudonžiedis progailis (*Anagallis arvensis*)
Dėmėtasis rūgtis (*Persicaria maculosa*)
Dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*)
Gailioji dilgėlė (*Urtica urens*)
Juodoji kiauliuogė (*Solanum nigrum*)
Bevainikė ramunė (*Matricaria discoidea*)
Vienametė miglė (*Poa annua*)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (85–75% efektyvumas):

Kibusis lipikas (*Galium aparine*)
Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum perforatum*)
Savaime sudygę rapsai (*Brassica napus*)
Vijoklinis pelėvirkštis (*Fallopia convolvulus*)
Vaistinė ramunė (*Matricaria recutita*)
Veronikos (*Veronica sp.*)
Našlaitės (*Viola sp.*)

Vidutiniškai atsparios piktžolės (75–60% efektyvumas):

Trumpamakštis rūgtis (*Persicaria lapathifolia*)

Plačioji balandūnė (*Atriplex patula*)
Vienametis laiškėnis (*Mercurialis annua*)

Mažai jautrios piktžolės (<60% efektyvumas):
Dirvinis vijoklis (*Convulvulus arvensis*)
Parastoji takazolė (*Poligonum aviculare*)
Vaistinė žvirbliarūtė (*Fumaria officinalis*)
Paprastoji rietmenė (*Echinochloa crus-galli*)
Kitos vienkasklės piktžolės

PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Augalai: Cukriniai, pašariniai runkeliai.
Didžiausia vienkartinė norma: 2,0 L/ha
Vėliausias panaudojimas: kai runkeliai turi 4 poras lapų (BBCH 18).
Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 3
Intervalas tarp purškimų: 5–10 dienų
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 L/ha.

Naudojimo laikas, dažnumas ir normos priklauso nuo piktžolių išsivystymo. Geriausia herbicidu Goltix® Super purkšti piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje ir ne vėliau 4 tikrųjų lapelių tarpsnio. Labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą. Geriausias rezultatas gaunamas, kai dirva lygi ir pakankamai drėgna. Efektyvumui pagerinti rekomenduojama purkšti kartu su 0,5–1,0 L/ha Poweroil, ypač kai sausa ir piktžolės sudygę. Jei yra drėgna, galima naudoti mažesnę registruotą Goltix® Super normą.

Kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje		
1 purškimas	2 purškimas	3 purškimas
Goltix® Super 1,0–2,0 L/ha	Goltix® Super 1,0–2,0 L/ha	Goltix® Super 1,5–2,0 L/ha

Nepurškite, jei prognozuojamos šalnos, labai karštu oru, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai, jei cukriniai, pašariniai runkeliai ar burokėliai pažeisti ligų ir kenkėjų.

Dėmesio! Naudojant produktą kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtina pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Goltix® Super sudėtyje yra dvi skirtingą veikimo pobūdį turinčios veikliosios medžiagos. Metamitronas yra fotosintezės inhibitorius (HRAC kodas – C1), etofumezatas stabdo ląstelių dalijimąsi ir lipidų sintezę (HRAC kodas – N). Atsparumo išsivystymo rizika produktui Goltix® Super vertinama kaip vidutinė. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai atspariosios

piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC C1 grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms.

Siekiant išvengti piktžolių (ypač balandų ir šunramunių) atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima dažniau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
- mišiniuose paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
- naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra skilčialapių tarpsnyje esančios piktžolės;
- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis;
- išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

SĖJOMAINA

Įprastai nuėmus runkelių derlių, kitais metais, giliai suarus (20 cm), galima sėti visus augalus. Jei dėl kokių nors priežasčių pasėlius reikia atsėti, kai herbicidas jau buvo panaudotas, iškart, giliai suarus, galima sėti cukrinius runkelius, žirnius, svides ir rapsus. Visus kitus augalus, išskyrus dobilus ir žieminius javus, galima sėti, jei praėjo 3 mėnesiai ir po gilaus dirvos dirbimo. Dobilus ir žieminius javus galima sėti ne anksčiau kaip po 5 mėnesių ir gilaus dirvos dirbimo.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Purkštuvus turi būti švarus, jame negali būti jokių likučių, nes net ir nedidelis kiekis augimo reguliatorių arba triazinių gali stipriai pakenkti runkeliams ir burokėliams!

Labai svarbu prieš naudojimą produktą pakuotėje gerai suplakti. Iš pradžių vandeniu užpildoma tik ¼ purkštuvu bako dalis, įjungiamas maišytuvus, tada supilamas produktas ir tik po to supilamas likęs vanduo. Purškiamo smulkialašiu būdu. Paruoštą tirpalą būtina tuoj pat sunaudoti. Po darbo reikia nedelsiant gerai išplauti purkštuvą, kad likučiai nesukeltų jo gedimų.

MAIŠYMAS

Goltix® Super gali būti maišomas su kitais runkelių ir burokėlių pasėliuose naudojamais herbicidais. Siekiant didesnio efektyvumo, Goltix® Super rekomenduojama maišyti su herbicidu Kontakt. Prieš purškiant visą pasėlį, patariama nupurkšti mišiniu mažą pasėlio plotą, tokiu būdu patikrinant žemės ūkio augalų tolerantiškumą mišiniui. Dėl Goltix® Super maišymo informacijos su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

Goltix® Super mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

PATARIMAI NAUDOTOJUI

Goltix® Super negalima purkšti karštą dieną (daugiau +25 °C), stipriai šviečiant saulei arba kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Tirpalas gali pakenkti šalnų arba kenkėjų pažėistiems, silpniems, nuo maisto medžiagų trūkumo kenčiantiems, ligotiems runkeliams. Jei diena labai karšta, purkšti reikia vakare. Po purškimo Goltix® Super 3 valandas turi nelyti. Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke galima atlikti mechaninius darbus, praėjus 7 dienoms – rankų darbus.

Purškiant Goltix® Super, reikia išlaikyti 5–10 dienų laikotarpį tarp purškimų.

Dirvožemiuose, turinčiuose daugiau kaip 5 proc. organinių medžiagų, herbicido poveikis piktžolėms gali būti silpnesnis.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

PASTABA: Purkštų cukrinių runkelių lapų augimo periodu negalima naudoti gyvulių pašarui, o burokėlių lapų – žmonių maistui!

SANDĖLIAVIMAS

Produktas Goltix® Super turi būti laikomas sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, saugiam, sausame ir vėdinamame sandėlyje. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir šalčio, laikyti atskirai nuo maisto bei pašarų. Produktą laikyti 0–30 °C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išsvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuvė integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotės skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Pagal nustatytus reikalavimus išskalautes pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautes ar išskalautes nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštes).

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Purkšti galima tik traktoriniais ir/ar savaeigiais lauko purkštuvais turinčiais dulksną mažinančią įrangą, arba laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti

cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais ir/ar savaeigiais lauko purkštuvais, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir rekomenduojama mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gesinimo priemonės – vandens srovė, putos, sausos priemonės, CO₂.

Savaime produktas neušidegantis. Gaisro metu gali išsiskirti dujos. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Gesinimo vandenį sugerti smėliu ar žemėmis.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PASTABA

Gaminotojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje pakuotėje, tačiau jis neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai saugomas ar naudojamas.



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDAS

koncentruota
suspensija



Veiklosios medžiagos

- Metamitronas 350 g/L (30.7 %)
- Etofumezatas 150 g/L (13.2 %)



Informacija

Registracijos numeris: AS2-3H(2020)
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +8 5 21 08 622

Registracijos savininkas:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai
Tel.: +31 33 205 68 00
www.adama.com

Gamintojas:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
77102 Ashdod
Izraelis



Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

8



LIETUVA

UN3082

GRUPĖ 5 | 15 HERBICIDAS

LIETUVA

Goltix[®] Super yra triazinonų ir benzofuranų at-
rankinio veikimo kontaktinis ir dirvinis herbicidas,
skirtas naikinti po sudygimo vienmetes dviskiltes
piktžoles, taip pat turintis poveikį ir kai kurioms
vienaskiltėms piktžolėms, naudojamas cukrinių,
pašarinių runkelių pasėliuose.

Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra 1,2-benzistiazolin-3-ono. Gali sukel-
ti alerginę reakciją. ● Toksiška vandens organiz-
mams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant iš-
vengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos,
būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
● Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsaugin-
nius drabužius. ● Surinkti išteklėjusių medžiagą. ●
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų rei-
kalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos
produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įren-
ginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti tar-
šos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant
apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10
metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens tel-
kinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės
paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių
yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų
apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais auga-

lais. ● Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus, būtina išlaikyti 1 metrų apsaugos
zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. ●
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenau-
doti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos pro-
dukto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba
etofumezato dažniau kaip kas trejus metus tame
pačiame lauke, neviršijant 1 kg/ha etofumezato.
● Operatorius privalo laikytis ne mažesnės kaip
5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos,
gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių
ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar
savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos,
arba purkšti galima tik traktoriniais ir/ar savaei-
giais lauko purkštuvais, kurie turi dulksnų maži-
nančią įrangą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**


Sandėliavimas – Produktas Goltix[®] Super turi būti
laikomas sandariai uždarytoje, originalioje pakuo-
tėje, saugiame, sausame ir vėdinamame sandėly-
je. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir šalčio,
laikyti atskirai nuo maisto bei pašarų. Produktą
laikyti 0-30 °C temperatūroje. Saugoti vaikams
nepasiekiamoje vietoje.



ATSARGIAI

4 x 5 L

1115620CFR_06



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA



LIETUVA



ATSARGIAI



UN3082

LJJ562PAAR_06

30 x 20 L