



GOLTIX® GOLD



ADAMA



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija/
suspensioonikonsentraat (SC)

©Adama Quena N.V.



Darbīgā viela/Veikļioji medžiaga/Toimeaine

● metamitrons/metamitronas/metamitroon 700 g/L (58.3% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0851
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30



EESTI

Eesti reg. nr.: 868/19.01.24
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-90H(2020)
Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622

**UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,
tā adrese/Registrācijas saviniekas/
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Niederlande/Nyderlandai/Madalmaad
Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00

www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Iisrael

UN3082



L12314IPFR_02

**NO VARNISH
AREA**

5 L e



SKALAUK TEISINGAI

**Skaneit informacijai /
Nuskaityti QR kodą /
QR-koodi lugemine**

LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds izsmidzināšanai nezālī ierobežošanai cukurbietēs, lopbarības biešu, galdā biešu, ķimeņu un spinātu (sēklā) sējotās, dekoratīvo augu stādāudzētāvās un dekoratīvo augu stādījumos, parastās egles un zemeņu stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norij ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH208** Saturs 1,2-benzotiazoliolīn-3-āni. Var izraisīt alerģisku reakciju ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus ● **P301+P312** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Smidzinātājus ar SAINEŠANAS INFORMĀCIJASCENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta ● **P330** Izskalo muti ● **P391** Sargāties izslikstīto šķidrumu ● **P501** Atbīdīties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SPI** Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīkli un ūdenstecu tuvumā. Izslārgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargoslodzi ūdenstīpēm un ūdenstecēm ● **SPe3** Lai aizsargātu vēl neizdīgus kukurūzas un citus ar lietotāju nesaietītos augus, ievērot 5 m aizsargoslodzi līdz blokus laukum un vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparātu devai 1.0 – 3.0 l/a. Aizsargosla nav jāievēro, ja preparātu devai 1.0 – 3.0 l/a lieto 50% smidzinājuma nesei maisījumā sprauslas 5 smidzinātāju aizsardzības līdzekli lauka, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības doļa vai mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 5 m aizsargoslodzi no lauka malā, 8% maisījuma veido sastāvdaļas, par kuru toksicitāti nav ziņu (inhālatoīvais toksikums).

Avārijas gadījumā zīņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +40 °C.

LIETUVA

Goltix® Gold – Vair selektyvus, sisteminio poveikia herbicidas, skirtas vėniametams ir kai kurioms daugiametams dyviktelėms piktžolėms naikinti kukurūzi runkėliu, pašarinų runkėliu, valgomųjų burkėlių pasėliuose.

Goltix® Gold naudojamas brėškėse, sėkliniuose šėpinuose, krmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose,

spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamenta (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį pakitimus ● Sudėtyje yra 1,2-benzotiazoliol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją ● 8 procentus mišinio sudaro, nežinomo ūmaus toksikumo įkėpėvus, sukeliamosios daly ● Siekiant išvengti žmonių sveikatos ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas ● Neužterėti vandens augalų apsaugos produktų ar jų pakute (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršius vandens telkinių / vengti taršos per drenaciją iš sodų ar nuo kelių) ● Surinkti ištekėjusią medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus ● Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnį mažinančią įrangą, purškiant krmynus, brėskėse ● Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnį mažinančią įrangą purškiant kukurūzi runkėliu, pašarinų runkėliu, valgomųjų burkėlių, sėklinių spinatų pasėlius, dekoratyvinių medžių ir krūmų, eglių sodinukų, purškiant dekoratyvinius augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kuro kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrolo dariniai kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemesnė kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams dulksnį mažinančią prietaisus.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausioje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pasarų, ne aukštesnėje kaip +40°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

EESTI

Goltix® Gold on laia toimespektriga herbitsiid kahei-

dulheleiste ja mõninate üheiduleheliste umbrhulde tärks suhkrupeedi, söödapeedi, punapeedi, taimlates, dekoratiivtaimedel, metsatundus, maasikatel, kõnnel, seemnaks kasvatataval spinatil ning peiluldel.

Goltix® Gold võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetisustist omav isik. Enne taimekaitsevahendi kasutamist loe hoolikalt toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab 700 g/L kahta metamitrooni. Toode on mõeldud külvielseks ja külvi järgseks ühe- ja kaheleheliste umbrhulde tärks.

H302 Allaneelamisel kahjulik ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit ● **EUH208** Sisaldab 1,2-benzotiazoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni ● **H411** Mürine veorganismidele, pikaajaline toime ● **P264** Pärast käitlemist pesta hooliga vahendiga kokkupuutunud kehaosi ● **P270** Toote käitlemisel ajal mitte süüa, juua ega suitsetada ● **P301+P312+P330** ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKUSEGA või arstiga. Loputada suud ● **P280** Kanda kaitsekindaid ● **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda ● **SPe3** Veorganismide kaitsemiseks pidada maapeelika koristatavatel kasutusel kinni mittepritsatavast pulvervõandist 10 m pinnaeesekogust ● **SPe3** Mittesihetavatel kaitsemiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhervõandist ja triivi vähendavast otsikute kombinatsioonist, millele liivaf infeloh vastavast tabelist ● **SPI** Vältida vahendi või selle pakendi vete sattumist (Seadmine pinnaev lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lähi-
numeri: 16662.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendide kasutamise ja hoiukoha täpsemd nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Taimkaitsevahendit hoiatuse selleks soovis ruumis, taimekaitsevahendi väikes koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürigise aine puhul kasutatav hoiatusmärg. Taimkaitsevahendit hoiatuse eraldi toidust, ravimistest ja söödast, et vältida nende saastumist taimkaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +40°C.

UFI: 2JHQ-9DFT-8VOK-69KJ



8 718077 013510

atdaryti šia
atveriet šit
avada siit

LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, ķimeņu un spinātu (sēklai) sējumos, dekoratīvo augu stādaudzētavās un dekoratīvo augu stādījumos, parastās eales un zemuņu stādījumos.

[illegible]

Avārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

LIETUVA

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametams ir kai kurioms daugiametams dvisklėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose.

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, krmnuose, dekoratyvinių augalų

daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

[illegible]

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandēliavimas – Produktā laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +40°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamose vietose.

EESTI

Goltix® Gold on laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suhkrupeedil, söödapeedil, punapeedil, taimlates, dekoratiivtaimedel, metsanduses, maasikatel, köömnel, seemneks kasvatataval spinatil ning peulijüüdel.

Goltix® Goldi võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Enne taimekaitsevahendi kasutamist loe hoolikalt toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab 700 g/L kohta metamitrooni. Toode on mõeldud külvielseks ja külvi järgseks ühe- ja kaheleheliste umbrohtude tõrieks.

H302 Allaneemisel ohustamine – EUH401 Inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikke väetämisjäreldajaid kasutadesühendit – EUH208 Sisaldab 1,2-ben-
zotiasoliini-3-ooni. Võib esine kutsuda allergilise reaktsiooni + H411 Mürgine veegorastimisele, pikaajaline toime + P264 Pärast käitlemist peseda hoolikalt käsi seebi ja vee all + P273 Vältida keskkonda sattumist + P270 Tooted käitluses ajal mitte süüa, juua ega suitsetada + P301+P312-P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSABEKEKSEGA või arstiga. Loputada suud + P280 Kanda kaitsekindad + P391 Mahavooland toote kokkuga koguda + SpE5 Veegorasti-
miskeskuste vaheliste kanalite puhastamisel kasutusel sinne mittepritsitavast puhuvõrõndist 10 m pinnaeekogudest + SpE3 Mittesit-märkiat-
made kaitsmiseks pidada kindi kulunormile vastav
puhvõrõondide ja triivi vähendamate otsikute kombinatsioon, mille laele infolehel vastav
+ SpE4 Välgid vahendi vii selle paksust
vett, et kuni see ei ole täiesti kuiv, mitte
puhadada/Välita saastamist läbi laudu ja teede
drenaažide).

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse
lühinumber: 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgeise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimist ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +40°C.

UFI: 2JHQ-9DFT-8V0K-69KJ

LATVIJA

PIRMĀ PALĪDŽĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar tekoša ūdens strūklu un ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, tās nekavējoties izskalot ar tekoša ūdens strūklu 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Speciāla antidota nav. Ārstēšana simptomātiska.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

DROŠĪBAS PRAŠĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darboties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus.

Pēc darba nekavējoties novilt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra-jāmazgā.

Dekoratīvo augu stādījumos (tai skaitā, stādaudzētavās) pēc produkta Goltix Gold lietošanas ieiet apstrādātajā teritorijā atļauts pēc 2 dienām

Lietošanas norādījumi

Iedarbības veids

Goltix® Gold ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Tas iedarbojas uz nezālēm galvenokārt caur saknēm (kā augsnes herbicīds). Tāpēc herbicīdu var lietot pirms nezāļu sadīgšanas, tādējādi nodrošinot caur augsni augsti efektīvu iedarbību uz dīgstošām nezālēm. Caur saknēm herbicīdu uzņems visas dīgstošās nezāles.

Sējumus ar Goltix® Gold var apstrādāt arī, kad jau sadīgušās nezāles. Lai panāktu labu nezāļu kontroles efektivitāti, nezālēm jābūt attīstības sākuma stadijā - dīglapu – pirmo īsto lapu fāzē. Produkts iedarbojas akropetāli – pa nezāļu augu audiem pārvietojas virzienā no apakšas uz augšu. Metamitrone pieder triaziononu ķīmisko vielu grupai (HRAC grupa C1). Metamitrone iedarbojas uz nezālēm, kavējot fotosintēzes procesu (fotosistēmā II).

Goltix® Gold efektivitāte ar devām 0.5 – 3.0 L/ha

Nezāļu suga	Pirms un pēc kultūrauga sadīgšanas, L/ha		Pēc kultūrauga sadīgšanas, L/ha		
	4 x 0.75*	3 x 1.0**	4 x 0.5	4 x 0.75	3 x 1.0
Rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>)	-	-	x	xx	xxx
Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	-	xx	xx	xx	xx
Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	xx	xx	xxx	xxx	x

Sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)	xxx	xxxx	-	x	x
Maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>)	-	-	xxx	x	-
Dārza vējagriķis (<i>Polygonum convolvulus</i>)	-	x	x	x	-
Blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>)	xx	xx	x	xx	-
Tiruma sinepe (<i>Sinapis arvensis</i>)	-	xxx	-	-	-
Parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	xxx	x	xxx	xxx	x
Tiruma kumelīte (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)	-	-	x	xx	xxxx
Tiruma vijolīte (<i>Viola arvensis</i>)	x	-	xx	xx	x

*1 reizi pirms, 3 reizes pēc kultūrauga sadīgšanas; **1 reizi pirms, 2 reizes pēc kultūrauga sadīgšanas

xxxx efektivitāte 95-100%

xxx efektivitāte 85-94.9%

xx efektivitāte 70-84.9%

x efektivitāte 50-69.9%

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Ievērojiet tabulā sniegtos norādījumus.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Cukurbietes, lopbarības bietes, galdas bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	pirms sadīgšanas: 0.5 – 1.0; pēc sadīgšanas: 0.5 – 1.0		<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumu pēc sējas līdz to sadīgšanai (AS 00-09) pa nezālēm digļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Maksimālā preparāta deva sezonā 3 L/ha	-	1 reize pirms sadīgšanas un 3 reizes pēc sadīgšanas
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5 – 1.0		<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumus pēc sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18), pa nezālēm digļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas. Maksimālā preparāta deva sezonā 3 L/ha	-	4

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogai-dīšanas laiks, dienās	Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā
Dekoratīvie koki*, krūmi*, (stādaudzētavā)	Īsmūža divdīglapju nezāles	2.0 – 3.0		Apsmidzināt starprindas stādījumā vai sējumā, kad nezāles ir aktīvi augoša, augu augstums mazāks par 50 cm. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūraugiem.	-	1
Dekoratīvie koki*, dekoratīvie krūmi*	Īsmūža divdīglapju nezāles	3.0		Apsmidzināt starprindas stādījumā vai sējumā, kad nezāles ir aktīvi augoša, augu augstums mazāks par 50 cm. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūraugiem.	-	1
Parastās egles*	Īsmūža divdīglapju nezāles	1.0		Apsmidzināt stādījumu agri pavasarī (aprīlis-maijs) vai rudenī (augusts-septembris), augu augstums mazāks par 50 cm	-	1
Ķīmenes* (sējas gada)	Īsmūža divdīglapju nezāles	0.75		<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pirmo reizi pirms sadīgšanas (AS 00-09) un otro reizi pēc tā sadīgšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19)	-	2
	Īsmūža divdīglapju nezāles	1.0		<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pēc sadīgšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19), nezāles līdz 2 lapu stadijai.	-	1
Ķīmenes* (ražas gadā)	Īsmūža divdīglapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumu pavasarī līdz kultūrauga galvenais dzinums sāk izstiepties (rozete 15 cm augsta) (AS 31), nezāļu dīgšanas sākumā, atkārtoti ne ātrāk kā pēc 7 dienām	60	2
Zemenes* (jaunie stādījumi)	Īsmūža divdīglapju nezāles	0.5 – 1.0		Apsmidzināt stādījumu 14 dienas pēc stādīšanas, pirms ziedēšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Zemenes* (ražojoši stādījumi)	Īsmūža divdīglapju nezāles	0.5 – 1.0		Apsmidzināt stādījumu pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Spināti* (sēklī)	Īsmūža divdīglapju nezāles	1.0		Apsmidzināt kultūrauga sējumu pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas uzdevumiem.

Preparāta drošums kultūraugiem, kuri ir mazais lietojums, vispirms ieteicams pārbaudīt nelielā platībā.

Piezīmes

Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 1.0 – 3.0 l/ha. Aizsargjosla nav jāievēro, ja preparāta devai 1.0 – 3.0 l/ha lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 5 m aizsargjoslu no lauka malas.

Dekoratīvo augu stādījumos (tai skaitā, stādaudzētavās) pēc produkta Goltix Gold lietošanas ietiet apstrādātajā teritorijā atļauts pēc 2 dienām.

Ūdens daudzums: 150-400 L/ha.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Goltix® Gold var jaukt ar citiem herbicīdiem ar tādu pašu reģistrētu lietojumu. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju vai ražotāja pārstāvi. Veicot platību apsrādi pēc nezāļu sadīgšanas, pievienot eļļu kā virsmas aktīvo vielu. Tādējādi tiks sekmēta produkta iekļūšana nezāļu lapās.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATĀVOŠANA

Gādājiet, lai smidzinātājs būtu tīrs un nebūtu piesārņots. Lai izsmidzināšanas tvertnē pēc apstrādes nepaliktu lieks darba šķidrums, rūpīgi aprēķiniet nepieciešamā maisījuma daudzumu. Uzpildiet 1/4 - 1/2 izsmidzināšanas tvertnes ar tīru ūdeni, sāciet maisīšanu, pievienojiet aprēķināto un nomērīto produkta daudzumu un turpiniet uzpildīt izsmidzināšanas tvertni, vienlaikus maisot, kamēr pievienojat kādu citu produktu. Turpiniet maisīt jaukšanas un apstrādes laikā. Uzpildot izsmidzināšanas tvertni, uzpildes šļūtenei vienmēr jāatrodas virs ūdens līmeņa, lai novērstu darba šķidruma atpakaļsūkšanu. Kad tiek sagatavots darba šķidrums, tas nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenskrātuvēs vai ūdenstilpēs.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Notīriet smidzināšanas iekārtas uzreiz pēc lietošanas gan no iekšpuses, gan ārpusēs.

Sāciet ar smidzinātāja iekšējo virsmu tīrīšanu:

1. Iztukšojiet smidzinātāju, izsmidzinot atlikušo darba šķidrumu turpat uz lauka.
2. Tad piepildiet trešdaļu tvertnes ar skalošanas ūdeni un izskalojiet smidzinātāju.
3. Izsmidziniet skalošanai izmantoto ūdeni uz kultūraugiem.
4. Atkal uzpildiet vienu trešdaļu tvertnes ar ūdeni.
5. Otrās skalošanas laikā pievienojiet piemērotu tīrīšanas līdzekli.
6. Izlaidiet ūdeni ar tīrīšanas līdzekli pa visu sistēmu un iztukšojiet sistēmu.
7. Pedējo reizi uzpildiet vienu trešdaļu tvertnes ar ūdeni.

8. Izlaidiet ūdeni pa visu sistēmu un un iztukšojiet sistēmu.
Turpiniet veikt smidzinātāja un traktora ārējo virsmu tīrīšanu.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STARTĒGIJA

Rezistences attīstības risks pret šo produktu tiek uzskatīts par zemu vai vidēju. Darbīgā viela metamitrons pieder pie HRAC grupas C1 – fotosintēzes inhibitori fotosistēmā II (ķīmisko vielu grupa – triazinoni). Šī herbicīda atkārtota var palielināt risku, ka dažas nezāļu sugas kļūs rezistentas pret šiem savienojumiem, apgrūtinot ierobežošanu. Lai samazinātu risku, nepieciešams apgūt stratēģiju rezistences novēršanai un pārvaldīšanai.

Audzētājiem ieteicams lietot herbicīdus, pamīšus izmantojot dažādas metodes, vai tvertnes maisījumus, kurā ir divas vai vairāk aktīvās vielas, kas iedarbojas uz attiecīgajām nezālēm. Nezāļu sugām, kuras ir visgrūtāk ierobežot, lietojiet Goltix® Gold, apstrādi veicot nezāļu efektīvai kontrolei vispiemērotākajā laikā. Šī metode jālieto kopā ar pareizu augmaīnu un augsnes apstrādes metodēm, piem., izmantojot cietas sēklas guļtnes paņēmieni, kultivāciju un neselektīvu herbicīdu izmantošanu pirmssējās. Detalizētākus ieteikumus par nezāļu rezistences pārvaldību var saņemt no Herbicīdu rezistences rīcības komisijas (Herbicide Resistance Action Group (HRAC)) un Nezāļu rezistences rīcības grupas (Weed Resistance Action Group (WRAG)). Ievērojiet WRAG vadlīnijas.

Atkārtota sēja un pēckultūras

Ja cukurbiešu sējums kāda iemesla dēļ ir gājis bojā, tad tad tajā pašā gadā var sēt: ja zeme netiek apstrādāta, atkārtoti sēt var tikai kukurbietes un lopbarības bietes;

- ja zeme tiek uzarta, var audzēt kukurūzu un kartupeļus;
- uzarot zemi un nogaidot divus mēnešus, var sēt zālājus sēklai.

Rudenī ziemājus var sēt tajā pašā sezonā, ja pēc pēdējās apstrādes ar Goltix® Gold ir pagājušas 16 nedēļas. Nākamajā sezonā pēc Goltix® Gold lietošanas kultūraugus var sēt bez ierobežojumiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc iepakojuma iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantojot darba šķīduma pagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +40 °C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.

Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Goltix® Gold yra selektyvus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienameis ir kai kurias daugiameis dviskiltis piktžolės prieš ir po jų sudygimo. Goltix® Gold sudėtyje esanti triazinonų grupės veiklioji medžiaga metamitronas, pagal HRAC priskiriamas C1 grupei, slopina fotosintezę II fotosistemoje. Metamitronas įsisavinamas per šaknis ir žaliąsias augalo dalis, ir išnešiojamas po visą augalą, per kelias dienas piktžolės pabūla, atsiranda nekrotinės dėmės, piktžolės nuvysta.

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	1 – 2	7 dienos	0,5 - 2 (ne daugiau kaip 3 L/ha per sezoną)	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalies pasiro- dymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarps- nio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, antrą kartą po sudygimo Norma prieš sudy- gimą: 0,5-2 L/ha Norma po sudygimo: 0,5-1,0 L/ha Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	3	7 dienos	1,0	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžemi- nės augalo dalies pasi- rodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarps- nio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudy- gimą, antrą ir trečią kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	4	7 dienos	0,75	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžemi- nės augalo dalie pasi- rodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarps- nio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudy- gimą, kitus kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Dekoratyvinių augalų daigynai Dekoratyviniai augalai (medžiai ir krūmai) Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	1	-	1,0	200-400	Purkšti tarpueilius augalų ramybės metu, birželio – rugpjūčio mėn., apsaugant au- galus	
Eglučių sodinukai (<i>Picea abies</i>)	1	-	1,0	150-400	Purkšti balandžio-ge- gužės arba rugpjū- čio-spalio mėn.	Didžiausia norma per sezoną 1 L/ha
Kmynai 1-ais sėjos metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti balandžio- rugpjūčio mėn. Po sėjos iki sudygimo BBCH 00-08 arba nuo išsiskleidusių pirmųjų Lapelių tarpsnio iki išsi- skleidę 9 lapeliai BBCH 11-19	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius Didžiausia norma se- zonui 1.5 L/ha
Kmynai 2-ais metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti gegužės mėn., prieš stiebo pailgėjimą, kai augalo aukštis ne daugiau kaip 15 cm (vėliausiai BBCH 31 – stiebo ilgėjimo pradžia, matomos stiebo užuomazgos)	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius.
Naujai įveistas braškynas	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn. 14 dienų po sodinimo, prieš žy- dėjimą	
Deračios braškės	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn., prieš žydėjimą	

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Sėkliniai špinatai	1	-	1,0	100-400	Purkšti pavasarį, prieš sudygimą, 1-2 dienas po sėjos	

Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki **kmynų** derliaus ėmimo - ne mažiau kaip **60 dienų**.

Dėmesio!

Cukrinius runkelius, pašarinius runkelius valgomuosius burokėlius galima purkšti naudojant vieną iš 3-jų purškimo schemų, neviršijant didžiausios 3,0 L/ha normos per sezoną.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

Piktžolių jautrumas	Veiksmingumas	Piktžolės, purškiant prieš sudygimą	Piktžolės, purškiant po sudygimo
Labai jautrios piktžolės	95-100 %	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)
Jautrios piktžolės	85-94.9 %	Dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)	Rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės	70-84.9%	Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) dėmėtasis rūgtis (<i>Persicaria maculosa</i>)	Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) švelnusis snaputis (<i>Geranium molle</i>) raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės	50-69.9%	Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)	Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Goltix® Gold efektyviausias kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, egliųčių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

SĖJOMAINA

Panaudojus Goltix® Gold, kitą sezoną gali būti sėjami visi augalai.

Jei dėl kokių nors priežasčių Goltix® Gold apdorotas cukrinių runkelių pasėlis žūsta, tais pačiais metais galima sėti:

- be dirvos dirbimo atsėti galima tik cukrinius arba pašarinius runkelius;
- po arimo gali būti sėjami kukurūzai ir arba sodinamos bulvės;
- po arimo ir po 2 mėnesių laikotarpio galima sėti žolę sėklai.

Žeminiai javai gali būti sėjami tą patį sezoną, jeigu praėjo 16 savaičių nuo paskutinio purškimo Goltix® Gold.

MIŠINIAI

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Goltix® Gold mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veikloji medžiaga metamitronas priklauso HRAC grupei C1 – fotosintezės inhibitoriams II fotosistemoje (cheminė grupė – triazinonai). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti piktžolių, natūraliai atsparių C1 grupės herbicidams.

Pakartotinai to paties veikimo herbicidų naudojimas gali padidinti piktžolių atsparumo išsivystymo riziką, todėl herbicido veiksmingumas gali sumažėti. Siekiant sumažinti riziką, reikėtų taikyti atsparumo prevencijos ir valdymo strategiją.

- Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
- Mišiniuose, paėliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
- Naudokite rekomenduojamą Goltix® Gold normą ir tinkamu laiku, ypač sunkiai kontroliuojamoms piktžolių rūšims.
- Naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones: sėjomainą, gilų dirvos dirbimą.

Daugiau rekomendacijų apie piktžolių atsparumo valdymą galima rasti Atsparumo herbicidams veiksmų grupės (HRAC) ir Piktžolių atsparumo veiksmų grupės (WRAG) informacinėse sistemose.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Naudojimui rekomenduojami traktoriniai purkštuvai.

Prieš naudojant, darbo įrangą turi būti tinkamai kalibruota, nustatytas tinkamas judėjimo greitis, slėgis ir purškiamo tirpalo paskirstymo tolygumas.

PURŠKIAMO TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai apskaičiuokite reikalingą tirpalo kiekį, kad po purškimo purkštuve neliktų neišpurkšto tirpalo likučių. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite. Po to 1/4-1/2 purkštuvų talpos pripildykite švari vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite apskaičiuotą reikalingą produkto kiekį, tada supilkite į maišytuvą kitus produktus. Siekiant išlaikyti vienodą purškimo mišinio sudėtį, maišymą tęskite ir purškimo metu. Pildant purkštuvą talpą, vamzdis visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos.

PURŠKIMO ĮRANGOS PLOVIMAS

Baigus purkšti, purškimo įrangą turi būti iš karto gerai išplauta.

Iš pradžių išplaukite purkštuvų talpos vidų:

1. Produkto likučius išpurškite ant Goltix® Gold nupurkštų augalų
2. Trečdalį purkštuvų užpildykite švari vandeniu ir išskalaukite.
3. Išpurškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdalį purkštuvų vėl užpildykite švari vandeniu.
5. Įplikite plovimui skirtą priemonę, kad išskalauti antrą kartą.
6. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį ant Goltix® Gold nupurkštų augalų.
7. Užpildykite trečdalį purkštuvų vandeniu trečią kartą.
8. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį Goltix® Gold nupurkštų augalų.

Baigus plauti purkštuvų talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina dėvėti cheminės medžiagos atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina dėvėti cheminės medžiagos atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo

(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet koks sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkinti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Parijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvu talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +40°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

KASUTUSJUHEND

Toimemehhanism

Metamitroon kuulub HRAC klassifikatsiooni järgi 5 gruppi. Toimeviisiks on fotosünteesi pärssimine fotosüsteemis II. Metamitroon kuulub triasinoonide keemilisse gruppi. Metamitroonil on efekt nii mulla kui ka lehtede kaudu mõjudes. Enamasti imendub taimekaitsevahend juurte kaudu, kuid mõju avaldub ka lehtede kaudu, misjärel levib preparaati taimes laiali.

Mittesihtmärgitud taimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhervööndite ja triivi vähendavate otsakute kombinatsioonist.

Mittepritsitav puhervöönd meetrites				
Kasutusalala ja ühekordne kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
Punapeet, suhkrupeet, söödapeet 0,5-2 l/ha	5	-	-	-
Taimlad (ilutaimed ja puukultuurid) 2-3 l/ha	5	-	-	-
Ilupuud ja -põõsad 3 l/ha	5	-	-	-
Metsataimla kuusk (<i>Picea abies</i>) 1 l/ha	5	-	-	-
Köömen 0,75-2 l/ha	5	-	-	-
Maasikas 1,75 l/ha	5	-	-	-
Maasikas alla 1,75 l/ha	-	-	-	-
Peulill 0,5-2 l/ha	5	-	-	-
Spinat seemneks 1 l/ha	-	-	-	-

Taimekaitsevahendi täpsemateks kasutustingimusteks järgi allpool olevas tabelis toodud juhiseid.

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsemiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsemiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Suhkrupeet, söödapect, punapeet	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 4	7	0.5 - 2	200-400	Tärgamiseel-selt: BBCH 00-09 (külvist kuni idanemise lõpuni) Tärgamisjärg-selt: BBCH 10-18 (idulehtede ilmumistest maapinnale kuni 8 leheni)	Maksimaalselt 4 korda hooaja jooksul: 1x tärgamisseelselt + 3x tärgamisjärgselt või 4x tärgamisjärgselt. Doos tärgamisseelselt: 0,5-2 L/ha Tärgamisjärgselt: 0,5-1 L/ha Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul kokku on 3 L/ha
Taimlad (ilutaimed ja puukultuurid)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	2 - 3	200-400	Taimed puhkeajas või varjestatud pihustamine riidade vahele	Väikese kasvupinnaga kultuur
Ilupuud ja põõsad	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	3	200-400	Taimed puhkeajas või varjestatud pihustamine riidade vahele	Väikese kasvupinnaga kultuur
Metsataimla kuusk (<i>Picea abies</i>)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	7	1	150-400	Aprill-mai, august-oktoober	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul on 3 L/ha

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Köömen (külviaastal)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 2	14	0.75 - 1.5	200-400	Aprill-august/ esimene tööt-luskord BBCH 00-08 (külvist kuni iduvarre kasvamiseni mullapinnani) Teine tööt-luskord BBCH 11-19 (esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni) esimesel kasvuaastal	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisaeg on augusti lõpp, pritsida kui umbrohud on maksimaalselt kasvufaasis BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud) Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Köömen (külviaastal)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	2	200-400	Aprill-august/ BBCH 11-19 (esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni) esimesel külviaastal	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisaeg on augusti lõpp, pritsida kui umbrohud on maksimaalselt kasvufaasis BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud)

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Köömen (koristusaas-tal)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 2	7	0.75 - 1.5	200-400	Mai/mai koristusaas-tal; jaotatud pritsimine enne peavarre pikkuskasvu, maksimaalseks kõrguseks 15 cm maikuu jooksul	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisaeg on kui umbrohtudel on kasvufaas BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud). Ootaeag tuleneb pritsimise ajast: mai lõpus pritsimise korral tohib koristada alles juuli lõpus Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Maasikas, äsja istutatud põllul	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1.75	200-300	Aprill-juuni Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist	Väikese kasvupinnaga kultuur
Maasikas, teisel ja enamal kasvuaastal	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1.75	200-300	Aprill-oktoober Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust	Väikese kasvupinnaga kultuur
Maasikas, äsja istutatud põllul	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	10	0.5 - 1	200-300	Aprill-juuni Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimisikordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimisikorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Maasikas, teisel ja enamal kasvuaastal	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	10	0.5 - 1	200-300	Aprill-oktoober Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Peulill	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	5	0.5 - 2	300-500	Tärgamisjärgselt: kasvufaasis BBCH 13-39 (kolmest pärislehest kuni vars on saavutanud täispikkuse)	Väikese kasvupinnaga kultuur Kõrgeimat doosi kasutada kui umbrohtudel on arenenud rohkem kui 2-4 lehte Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Spinat seemneks	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1	100-400	Tärgamisel kasvufaasis BBCH 00-09 (külviist kuni idulehtede tungimiseni mullapinnale)	Väikese kasvupinnaga kultuur

RESISTENTSUSE OHT

Selle toote resistentsuse riski loetakse madalaks kuni keskmiseks. Toimeaine metamitroon kuulub HRAC klassifikatsiooni järgi 5 gruppi - inhibiitor fotosünteesi pärssimiseks fotosüsteemis II (keemiline grupp – triasoonid). Sama toimeviisiga herbitsiidide korduvkasutamisel võib suureneda resistentsete umbrohtude tekkimise oht, mis võib viia vähese efektiivsuseni umbrohtude üle.

Tootjatele soovitatakse kasutada erineva toimeviisiga herbitsiidide kasutamisena kas erinevate pritsimistena või paagiseguna, kus kaks või enam komponenti on efektiivsed sihtumbrohtude vastu. Kasutage Goltix® Gold'i soovitatud kulunorme ning etiketil märgitud pritsimisaja, et tagada hea tulemus raskesti tõrjutavate umbrohtude üle. Ülaltoodud tuleks kasutada koos viljavahelduse ning viljelussüsteemi rakendamisega nt. varane külv, kasvatamine ja mitteselektiivsete herbitsiidide kasutamine enne külv.

Täiendavaid juhendeid umbrohtude resistentsuse ohjamise kohta saab Herbitsiidiresistentsuse tegevusrühma (HRAC) ja umbrohttõrje tegevusrühma (WRAG) kodulehelt. Järgige WRAG'i juhiseid.

TAARA KÄITLEMINE

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

OPTIMAALSED TINGIMUSED UMBROHTUDE KONTROLLIKS

Parim efektiivsus Goltix® Gold'iga saavutatakse kui umbrohud on väikesed ja aktiivse kasvuga.

VILJAVAHELDUS

Peale Goltix® Gold'i kasutamist võib järgnevaid kultuure külvata ilma piiranguteta. Siiski, kui suhkrupeedi, söödapeedi või punapeedi kasvatamine ebaõnnestus, on ainsad võimalused järgnevad:

- Ilma mullaharimiseta võib külvata vaid suhkru- või söödapeedi;
- Peale kündmist võib külvata maisi või kartulit;
- Peale kündi ning peale 2 kuulist ooteperioodi võib külvata heintaimi seemnekasvatuseks.

Taliteravilju võib külvata samal hooajal, kuid viimase Goltix® Gold'i kasutamise ja külvil vahele peab jääma 16 nädalat.

Mistahes suvikultuure võib külvata Goltix® Gold'i kasutamisele järgneval aastal.

KASUTUSVIIS

Enne kasutamist tuleb kõik pritsi osad nõuetekohaselt kalibreerida, arvestades taimekaitsetöökasutatavat liikumiskiirust, kulunormi ja jaotuse ühtlikkust. Pritsi tulevaid ilmaga (tuule kiirus maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Hoiduda preparaadi pritsimisest kõrgetel temperatuuridel (üle +25°C) ja intensiivses päikesevalguses.

PAAGISEGUD

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust tootja, edasimüüja või nõustajaga.

PRITSI PUHASTAMINE

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel väldi maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Pritsipaak tühjendada töödeldud alale või spetsiaalsesse mahutisse.

PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

HOIUSTAMINE

Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +40°C. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

Säilivusaeg originaalpakendis 2 a.

JURIIDILINE VASTUTUS

Tootja ei vastuta ettenägematute tingimuste eest, nagu ilmastikutingimused, hilinenud ümbertöötlus, pinnasetüüp, kasutamismeetod ja muud asjaolud, mis võivad preparaadi toimet mõjutada. Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul, kui see ostetakse ja seda säilitatakse suletud originaalpakendis.



GOLTIX® GOLD

©Adama Quena N.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija/
suspensiooikontsentrāts (SC)



Darbīgā viela/Veiklīoļi medžiaga/Toimeaine

● metemitrons/metamitronas/metamitroon 700 g/L (58.3% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0851
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un
izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma
neatvērtā, oriģinālā
iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas/Tootja/
pakadāja:
ADAMA Agran Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Iisrael



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-
90H(2020)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622



EESTI

Eesti reg. nr.: 868/19.01.24
Partii nr. ja valmistamise
kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Registrācijas apliecības
īpašnieks, tā adrese/
Registrācijas savininkas/
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Niederlande/Nyderlandai/
Madalmaad
Tālr./Tel./Tel.:
+31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds
ismūža divlāpļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu,
loparības biešu, gada biešu, ķimeņu un spinātu
(sēklai) sējumos, dekoratīvo augu stādāudzētāvās un
dekoratīvo augu stādījumos, parastās egles un zeme-
ņu stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norij ● H411 Toksisks ūdens organis-
miem ar ilgstošām sekām ● EUH208 Saturs 1,2-ben-
zisothiazolīn-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju ●
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un
videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● P280 Izmantoj
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas
aizsargus ● P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazi-
nāties ar SAINĒŠANAS INFORMĀCIJASCENTRU/ār-
st, ja jums ir sliktā pašsajūta ● P330 Izskaloj muti ●
P391 Savākt izsīkstošo šķidrumu ● P501 Atbrīvoties no
satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības ● SPI Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardi-
bz līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izstrādāties
no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ce-
ļiem ● SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot
10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem
● SPE3 Lai aizsargātu vai neizdaļģus kultūraugus
un citus ar lietojumu nesaietīšus augus, ievērot 5 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecī-
bā neizmantojamai zemei, ja lieto preparātu devu
1.0 – 3.0 l/ha. Aizsargjosla nav jāievēro, ja preparāta
devai 1.0 – 3.0 l/ha lieto 50% smidzinājuma nenesi
mazinošas sprauslas ● Smidzinot augu aizsardzības
līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto
plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju
grupas, nepieciešams ievērot 5 m aizsargjoslu no
lauka malas ● 8% maisījuma veido sastāvdaļas, par
kuru toksicitāti nav ziņu (inhlatīvais toksiskums).

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepa-
kojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās,
vēsās, labi vēdināmās un aizsērējamās telpās, bēr-
niem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt
temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par
+40 °C.

LIETUVA

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio
herbicidas, skirtas viena metams ir kai kurioms dau-
giametams dviskiltemis piktžolėms naikinti cukrinių
runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių
pasėliuose.

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špa-
nuose, kmyse, dekoratyvinių augų daigynuose,
spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, deka-
ratyvinuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinu-

kuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamenta (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus ● Labai toksiška vandens orga-
nizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Sudėtyje yra
1,2-benzisothiazolīn-3-one. Gali sukelti alerginę reak-
ciją ● 8 procentus veikia sudaro, nežinomo ūmaus
toksiškumo įkvėpus, sušedamosios dalys ● Siekiant
išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos,
būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus ●
Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą kūno
vijas ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produ-
ktu ar jo pakute (neplauti purškimo ir įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drena-
žą iš sodybių ar nuo kelių) ● Surinkti ištekejusią medžiagą
● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktu
reikalavimus ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis
ir gyvulius, operatoriai privalo laikytis ne mažes-
nės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių
ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekre-
acinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo
naudoti dulksnį mažinančią įrangą, purškiant kmy-
nus, braškes ● Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis
ir gyvulius, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės
kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių
ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekre-
acinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo
naudoti dulksnį mažinančią įrangą purškiant cukri-
nių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių,
sėklinių spinatų pasėlius, dekoratyvinius medžius ir
krūmus, eglių sodinukus, purškiant dekoratyvinius
augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis
medelynuose ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį,
nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos pro-
dukto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip
kartą per trejus metus tame pačiame lauke ● Siekiant
apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1
metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir
melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netikslinius
augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki
ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc.
dulksnį mažinančią purkštukus.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždaryto-
je gamyklos taroje, sausose, vėsioje, gerai vėdinamoje
patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir
pašarų, ne aukštesnėje kaip +40°C ir ne žemesnėje
kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekia-
moje vietoje.

EESTI

Goltix® Gold on
lata toimespektriga
herbitsiid kaheidu-
leheliste ja mõni-
gate üheiduleheliste
umbrohtude tõrjes
suhkrupedil, söoda-
peedil, punapeedil,
taimlates, dekoratiiv-
tamedel, metsan-
duses, masikatel,
kõõnnel, seemneks
kasvatataval spinatil

ning peulilledel.

Goltix® Goldi võeti osta ja kasu-
tada ainult taimekaitsetunnistust
omav isik.
Enne taimekaitsevahendi kasutamist
loe hoolikalt toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensiooikontsentrāts, mis
sisaldab 700 g/L kohta metamitrooni. Toode
on mõeldud külvieelseks ja külvijärgseks ühe- ja
kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

H302 Allaneelamisel kahjulik ● EUH401 Inimeste
tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit ● EUH208 Sisaldab 1,2-benzisotia-
zoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni
● H411 Mürine veorganismidele, pikajaline toime
● P264 Pärast käitumise peata hooliga vahendiga
kõrku puutunud kehast ● P270 Toote käitlemise ajal
mitte süa, juua ega suitsetada ● P301+P312+P330
ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral
võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või
arstiga. Loputada suu ● P280 Kanda kaitsekin-
daid ● P391 Mahavoolanud toode kokku koguda ●
SPE3 Veorganismide kaitsmiseks pidada maasika
koristustajad kasutama kinni mittepritsitavast
puhvervõandist 10 m pinnaseveekogudest ● SPE3
Mittesihmarmatamised kaitsmiseks pidada kin-
ni kulunormi vastavast puhvervõandite ja triivi
vahendavate otsikute kombinatsioonist, mille leib
infolehel vastavast tabelist ● SP1 Vältida vahendi või
selle pakendi vettide sattumist (Seadmeid pinnavee la-
hedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda
ja teede drenaazide).

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse ühi-
number: 16662.
Pinnajärgi põhjavee kaitse eesmärgil toote kasu-
tamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011
määruse nr 90 „Taimekaitsevahendite kasutamise
ja hoiukoha täpsendam nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Taimekaitsevahendit hoitakse selleks
sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse
puhl ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis
on lukustatud ja millel on mürise aine puhul kasu-
tatava hoiatusmärgi. Taimekaitsevahendit hoitakse
eraldi toidust, ravimist ja söödist, et vältida nende
saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida tempera-
tuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +40°C.



UZMANĪBU
ATSARGAI
HOIATUS



ADAMA

L123140CFR_02

Skaneit informacijai /
Nuskaityti QR kodą /
QR-koodi lugemine



SKALAUK TEISINGAI



8 718077 013527

UN3082

GRUPA
GRUPĖ
GRUPP

5

HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

4 x 5 L



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



UN3082

L12314PAAR_02

30 x 20 L