



ULTRACA®



ADAMA

©Adama Agricultural Solutions Ltd.



FUNGICĪDS/FUNGICIDAS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga

• difenokonazols/difenokonazolas 250 g/l (23,6%)



Informācija / Informacija



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0988
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 29446285

Importētājs/Platintojs
UAB "ADAMA Northern Europe"
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132, Vilnius
Lietuva/Lietuva
Tālr./Tel.+370 52 108622

Reģistrācijas savininkas/Reģistrācijas
apliecības īpašnieks, tā adrese
Syngenta Polska Sp. z o.o. Ul.
Szamocka 8 01-748 Warszawa
Polska/Polska



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-
59F(2025)
Partijos numeris ir pagaminimo
data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622

Tālr./Tel.+370 52420017

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas
Syngenta Crop Protection AG
Bāzele/Bazelis
Šveice/Šveicarija
Tālr./Tel.+370 52420017

BĪSTAMI
PAVOJINGA



UN3082

NO VARNISH
AREA

L509993IPFR_01

5 L e



Skatiet informācijai /
Nuskaityti QR kodą



LATVIJA

Ultraca® – Sistēmas iedarbības funkcīdēs slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, speltas kviešu, ziemas rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos.

Satur aromātiskus C10–C13 ogļūdeņražus (<1% naftalīna).

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos • **H315** Kairina ādu • **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu • **H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P280** Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargu un sejas aizsargu • **P301+P310** NORĪŠANAS GADĪJUMA: nekavējoties sazināties ar SAINĒŠANAS CENTRU vai ārstu • **P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu • **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalošanu • **P308+P313** JA saskaras vai ir aizdomas par iedarbību: sazināties ar SAINĒŠANAS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu • **P331** NEIZRAISĪT vemšanu • **P332+P313** JA rodas ādas iekaisums, lūdziet medicīniskā palīdzību • **P337+P313** JA acu iekaisums nepāriet, lūdziet medicīniskā palīdzību • **P391** Savākt izšķīstīto šķidrumu • **P501** Atbrīvojies no satura un iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā un izvairīties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm • Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

LITUVA

Ultraca® – sisteminio veikimo funkcīdēs, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių spelta kviečių, žieminių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra aromatinių C10–C13 angliavandenilių (<1% naftaleno).

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį • Dirgina odą • Sukelia smarkų akių dirginimą • Įtariama, kad sukelia vėžį • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas • Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas • Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją • Nesant kontaktinio vėmimo • Esant poveikiui arba įeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Įeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją • Surinkti ištekėjusį medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuotę (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąžą iš sodų bei ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Produkto saugojimas – Laikyti gerai vėdinamose, raknamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu +35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytu Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

UFI: 8U8M-KDU5-0V02-8V1V

**GRUPA 3 FUNGICIDŲ
GRUPĖ 3 FUNGICIDAS**

8 718077 016627



LATVIJA

LITUVA

atidaryti čia
atveriet šeit

L509931PBB_01



ULTRACA®



LATVIJA

Ultraca® – Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešos, vasaras kviešu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, seltas kviešu, ziemas rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos.

Satur aromātiskus C10–C13 ogļūdeņražus (<1% naftalīna).

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos

● **H315** Kairina ādu ● **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu ● **H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P280** Izmantojot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus un sejas aizsargu ● **P301+P310** NORIŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

● **P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ● **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACĪM:

uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes, izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalot ● **P308+P313** JA saskaršas vai ir aizdomas par iedarbību: sazināties ar SAINĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu ● **P331** NEIZRAISĪT vemšanu ● **P332+P313** Ja rodas ādas iekaisums, lūdziet medicīnu palīdzību ● **P337+P313** Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet medicīnu palīdzību ● **P391** Savākt izžāvēto šķidrumu

● **P501** Atbrīvoties no satura un iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā un izvairīties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ● Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Ultraca® – sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių seltos kviečių, žieminių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra aromatinių C10–C13 angliavandenilių (<1% naftaleno).

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį ● Dirgina odą ● Sukelia smarkų akių dirginimą ● Įtariama, kad sukelia vėžį ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ● Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją ● Neskatinti vėmimo ● Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Jeigu akių dirginimas nepaiešina, kreiptis į gydytoją ● Surinkti ištekėjusį medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuotę (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per dreną ži- so- dybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Produkto saugojimas – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu +35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

UFI: 8U8M-KDU5-0V02-8V1V

GRUPA 3 FUNGICIDUS
GRUPĖ 3 FUNGICIDAS



8 718077 016627

10188DIE66057

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīndēšanās informācijas centra tālrunis: **+371 67042473**.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassegā, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

PREPARĀTA APRAKSTS

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskajai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.

Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret *Deuteromycetes*, *Basidiomycetes* un *Ascomycetes* sēnēm.

ULTRAC[®] EFEKTIVITĀTE SLIMĪBU IEROBEŽOŠANĀ

Slimība	Ziemas kviešu un vasaras kviešu sējums ar 0.5 l/ha	Ziemas tritikāles un vasaras tritikāles sējums ar 0.5 l/ha	Rudzu sējums ar 0.5 l/ha	Ziemas rapša sējums ar 0.25 l/ha	Cukurbiešu un lopbarības biešu sējums ar 0.5 l/ha
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	XX	XX			
Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	XX	XX			
Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	XX	XXX	XXX		

Slimība	Ziemas kviešu un vasaras kviešu sējums ar 0.5 l/ha	Ziemas tritikāles un vasaras tritikāles sējums ar 0.5 l/ha	Rudzu sējums ar 0.5 l/ha	Ziemas rapša sējums ar 0.25 l/ha	Cukurbiešu un lopbarības biešu sējums ar 0.5 l/ha
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	XX	XX			
Sausā puve (<i>Plenodomus lingam</i>)				X	
Biešu lapu sīklankumainība (<i>Cercospora beticola</i>)					XXX
Biešu lapu sarmplankumainība (<i>Ramularia beticola</i>)					XXX
Biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>)					XXX
Biešu milttrasa (<i>Erysiphe betae</i>)					XXX

XXX- labi ierobežo – efektivitāte > 80%;
 XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80 %;
 X – vāji ierobežo – efektivitāte < 60%

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Devā, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, speltas kvieši*	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.4-0.5	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33-69).	35	1

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Devā, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas tritikāle, va-saras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.4-0.5	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33-69).	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.4-0.5	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas vidum (AS 33-65)	35	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu milttrasa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>), biešu lapu sarmplankumainība (<i>Ramularia beticola</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>)	0.4-0.5	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapotnes izveidošanas līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi (AS 39-49)	21	2
Ziemas rapsis	Sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	0.25	Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 14-18)	-	2

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Ūdens patēriņš: 100 – 400 l/ha.

LIETOŠANAS TEHNOLOĢIJA.

Ultracra® deva ir 0.4-0.5 l/ha. Zemāku preparāta devu izmanto mazāk uzņēmīgām labības šķirnēm un gadījumos, kad slimības izplatīšanās risks nav liels. Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30 – 50 cm virs augiem. Blīvās kultūrās izmantojiet vairāk ūdens, lai augus labi pārklātu ar smidzināšanas šķidrumu. Lietus, 2h pēc izsmidzināšanas, neatstāj negatīvu ietekmi uz līdzēja efektivitāti. Gaisa temperatūrai smidzināšanas laikā jābūt vismaz 12°C. Izvairieties no apstrādes, ja kultūraugi cieš no stresa, ko izraisa slimības, kaitēkļu uzbrukums, sals, sausums, barības vielu deficīts vai citi faktori, kas samazina kultūraugu augšanu. Nelietot augu aizsardzības līdzekli, ja gaisa temperatūra ir augstāka par 25°C vai vēja ātrums ir lielāks par 4 m/s.

Bezlietus periods: 2 stundas.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo Ultracra® daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalojiet ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienojiet darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti).

KULTŪRAUGU IZTURĪBA

Lietojot Ultracra® saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fitotoksiskuma risks. Tomēr ļoti retos gadījumos Ultracra® var izraisīt nelielu un pārejošu fitotoksicitāti (hlorozi, nekrozi vai krāsas izmaiņas), īpaši, ja to lieto agrīnā augšanas stadijā (AS 33-39). Tas neietekmē augu kvalitāti un ražu. Ja smidzināšanai tiek izmantots neliels ūdens daudzums (<200 l/ha), potenciāli var rasties fitotoksicitātes risks lopbarības bietēm.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Ultracra® darbīgā viela difenokonazols pieder DMI (demetilācijas inhibitori) fungicīdu grupai, FRAC 3.grupa. Šo grupu sauc par sterolu biosintēzes inhibitoriem.

Lai samazinātu rezistences izveidošanās risku, ievērojiet sekojošus norādījumus:

Nelietojiet šīs klases fungicīdus vienam un tam pašam kultūraugam vienā sezonā vairāk par 2 reizēm, sevišķi pret augsta riska patogēnu platībā, kurā slimība stipri izplatīta.

Ja nepieciešama atkārtota apstrāde, fungicīdu no DMI inhibitoru klases lietojiet maisījumā vai aizvietojiet ar citas klases fungicīdu, ar kuru tam nav krusteniskā rezistence.

Nelietojiet samazinātas fungicīdu devas, sekojiet lietošanas norādījumiem.

Konsultāciju iegūšanai fungicīda rezistences jautājumā vērsieties pie augu aizsardzības speciālista vai iepazīstieties ar informāciju FRAC* mājas lapā (*www.frac.info).

SAVIETOJAMĪBA

Ultraca® ir lietojams maisījumos ar biežāk lietotiem insekticīdiem un fungicīdiem. Neskaidrību gadījumos griezties firmu pārstāvniecībās.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Beidzot darbu, ieteicams veikt sekojošu smidzinātāja tīrīšanu:

1. Tvertni pilnībā iztukšo uz lauka, uzpilda ar tīru ūdeni un atkal pilnībā iztukšo.
2. Noskalo smidzināšanas tehniku no ārpuses ar tīru ūdeni.
3. Piepilda tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni, pievieno mazgāšanas līdzekli, piemēram, All Clear Extra (0,5 l uz 100 l ūdens) vai uz nātrija hipohlorītu bāzētu tīrīšanas līdzekli, nedaudz izsmidzina caur sprauslām un ar ieslēgtu maisītāju atstāj uz 10-15 minūtēm. Tvertni pilnībā iztukšo un rūpīgi skalo ar tīru ūdeni.
4. Noņem sprauslas un filtrus, un mazgā ar to pašu mazgāšanas līdzekli, tādā pašā koncentrācijā kā smidzinātāja tvertni.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet mglotājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

ŠĶIDRUMA IZŠĻAKSTĪŠANĀS VAI NOPLŪDE

Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušo preparātu var savākt to apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķīmikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Piezīme: izlijušo preparātu aizliegts izmantot.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0°C līdz +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

ULTRACA® – sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių spelta kviečių, žieminių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų.

Difenokonazolas įsivainamas per žaliąsias augalo dalis. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga, greitai patenkanti į augalų ir judanti tarpuląsiais. Jis stabdo sterolų, patogeninių grybų ląstelių membranos statybinį medžiagų, biosintezę dygstančių sporų sporadaičiuose ir neleidžia vystytis grybienai. Difenokonazolui būdingas ilgas, stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Apsaugo nuo: Lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*)
Geltonųjų rūdžių (*Puccinia striiformis*)
Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)
Kviečių dryžligės (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Norma: 0,4-0,5 l/ha.

Mažesnė norma naudojama mažiau ligoms jautriose kviečių veislėse bei kai ligų plitimo rizika nėra didelė. Nuo kviečių dryžligės naudoti didesnę normą.

Purškimo laikas: pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo trečiojo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 33-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 30 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Apsaugo nuo: Lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*)
Geltonųjų rūdžių (*Puccinia striiformis*)
Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)
Kviečių dryžligės (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Norma: 0,4-0,5 l/ha.

Mažesnė norma naudojama mažiau ligoms jautriose kvietrugių veislėse bei kai ligų plitimo rizika nėra

didelė. Nuo kviečių dryžligės naudoti didesnę normą.

Purškimo laikas: pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo trečiojo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 33-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 30 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Žieminiai ir vasariniai spelta kviečiai

Apsaugo nuo: Lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*)
Geltonųjų rūdžių (*Puccinia striiformis*)
Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)
Kviečių dryžligės (*Pyrenophora tritici-repentis*)
Varpų septoriozės (*Parastagonospora nodorum*)*

Norma: 0,4-0,5 l/ha.

Mažesnė norma naudojama mažiau ligoms jautriose spelta kviečių veislėse bei kai ligų plitimo rizika nėra didelė. Nuo kviečių dryžligės naudoti didesnę normą.

Purškimo laikas: pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo trečiojo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 33-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 30 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

*MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Naudojimas spelta kviečiuose nuo varpų septoriozės išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą. Atsakomybę už veiksmingumą prisiima produkto naudotojas.

Žieminiai rugiai

Apsaugo nuo: Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)

Norma: 0,4-0,5 l/ha

Mažesnė norma naudojama mažiau ligoms jautriose rugių veislėse bei kai ligų plitimo rizika nėra didelė.

Purškimo laikas: pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo trečiojo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 33-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 30 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Žieminiai rapsai

Apsaugo nuo: Fomozės (*Plenodomus lingam*)

Norma: 0,25 l/ha

Purškimo laikas: purkšti rudenį 4-8 lapelių tarpsnyje (BBCH 14-18).

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Cukriniai ir pašariniai runkeliai

Apsaugo nuo:

- Rudmargės (*Cercospora beticola*)
- Miltligės (*Erysiphe betae*)
- Baltulių (*Ramularia beticola*)
- Rūdžių (*Uromyces betae*)

Norma: 0,4-0,5 l/ha.

Purškimo laikas: pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo tada, kai lapai dengia 90 proc. tarpueilių iki runkeliai pasiekia technologinę brandą (BBCH 39-49).

Didžiausias purškimų skaičius: 2 kartai

Mažiausias intervalas tarp purškimų: 15-21 diena

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 21 diena

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tankiuose pasėliuose naudoti didesnį vandens kiekį, kad augalai gerai pasidengtų purškiamu tirpalu.

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

Produktą naudoti, kai oro temperatūra purškimo metu yra ne mažiau nei 12° C.

Nenaudokite Ultraca®, kai augalai yra paveikti streso, pažeisti ligų, kenkėjų, šalnų ar sausros, kenčia dėl maisto medžiagų stygiaus.

FITOTOKSIŠKUMAS

Tinkamai naudojamas nefitotoksiškas.

Retais atvejais, ypač panaudojus Ultraca® ankstyvaisiais augimo tarpsniais (BBCH 33-39), kai prieš ir po purškimo susidaro nepalankios oro sąlygos normaliam augalų augimui ir vystymuisi, javams gali pasireikšti fitotoksiškumas (chlorozė, pašviesėjimas), tačiau tai greitai praeina ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei. Jei purškiant naudojamas nedidelis vandens kiekis (<200 l/ha), fitotoksiškumas gali pasireikšti pašarinių runkelių pasėliuose.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams

MAIŠYMAS

Ultraca® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais suderinamumas, poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Ultracra® sudėtyje esantis difenokonazolas priklauso triazolų cheminei grupei. Pagal veikimo būdą difenokonazolas priskiriamas DMI fungicidams (FRAC* 3 grupė). Šios grupės veikliosioms medžiagoms būdinga vidutinė atsparumo išsivystymo rizika. DMI fungicidams nebūdingas kryžminis atsparumas kitų grupių fungicidams.

Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, Ultracra® būtina naudoti laikantis šių rekomendacijų:

- Ultracra® purškite pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Venkite gydomųjų purškimų;
- naudokite rekomenduojamas fungicido normas ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;
- Ultracra® naudokite mišiniuose su kito veikimo būdo fungicidais;
- pakartotinam purškimui tame pačiame lauke nenaudokite vienų DMI fungicidų. Pasirinkite kitą veikimo būdą turinčius fungicidus arba jų mišinius. Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų padermių susidarymo riziką.

Fungicidų naudojimas nepanaikina būtinybės sėti ligoms atsparias veisles, taikyti sėjomainą, naudoti sveiką sėklinę medžiagą ir laikytis geros žemės ūkio praktikos.

Visada naudokitės FRAC (www.frac.info) naujausiais atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

*FRAC – veiklos su atsparumu fungicidams komitetas

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus.

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rankų, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukąs nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Susitępus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purškti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais ar savaeigiais lauko purkštuvais. Purškimui naudoti lauko purkštuvus su plyšiniais, smulkialaisiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0–4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi būti pakeltos 30–50 cm virš augalų. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš pradedant ruošti tirpalą, būtina įsitikinti, ar purkštuvą yra kruopščiai išplautas, kad nebūtų kitų augalų apsaugos produktų likučių. Tiksliai nustatyti reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Pusę purkštuvo talpos užpildyti švariu vandeniu ir įjungti maišytuvą. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Ultracra® kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvą turi būti įjungtas. Paruoštas tirpalas turi būti išpurškias nedelsiant.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplauti purškimo įrangą. Visiškai ištuštinti purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimti visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus išplauti purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaukiant purkštuvą, vandens įpilti ne mažiau 10 proc. purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplauti vidiniais purkštukais. Vandenį išleisti pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškšti ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą

su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu + 35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnų, kurių jis negali kontroliuoti. Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių patogeninių grybų padermių, nuo kurių produktas gali būti neveiksmingas. Tokių grybų padermių atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.



ULTRACA®

©Adama Agricultural Solutions Ltd.

FUNGICĪDS/FUNGICIDAS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)

Darbīgā viela/Veikloji medžiaga
● difenokonazols/difenokonazolas 250 g/l (23,6%)

Informācija / Informacja



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0988
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un
izgatavošanas
datums: skatīt uz
iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
Pārstāvēniecība Latvijā:
Tālr.: +371 29446285

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas
Syngenta Crop Protection
AG
Bāzele/Bazelis
Šveice/Šveicarija
Tālr./Tel. +370 52420017



LIETUVA

Reģistracijos numeris:
AS2-59F(2025)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622

Importētājs/Platintojas
UAB "ADAMA Northern
Europe"
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132, Vilnius
Lietuva/Lietuva
Tālr./Tel. +370 52 108622

Registracijos savininkas/
Reģistrācijas apliecinātājs
Ipašnieks, tā adrese
Syngenta Polska Sp. z o.o.
Ul. Szamocka 8 01-748
Warszawa
Polska/Polska
Tālr./Tel. +370 52420017

LATVIJA

Ultraca® – Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, speltas kviešu, ziemas rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos.

Satur aromātiskus C10-C13 ogļūdeņražus (<1% naftalīna).

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos ● H315 Kairina ādu ● H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu ● H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību ● P280 Izmantojot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus un sejas aizsargu ● P301+P310 NORIŠANAS GADIJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDEŠANĀS CENTRU vai ārstu ● P302+P352 SASKARĒ AR ADU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ● P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes, izņemot kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalot ● P308+P313 JA saskaras vai ir aizdomas par iedarbību: sazināties ar SAINDEŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu ● P331 NEIZRAISĪT vemšanu ● P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums, lūdziet medicīniskās palīdzības ● P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet medicīniskās palīdzības ● P391 Savākt izsīkstošo šķidrums ● P501 Atbrīvoties no satura un iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlpu un ūdensteču tuvumā un izvairīties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlpēm un ūdenstečiem ● Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C.

LIETUVA

Ultraca® – sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių spelta kviečių, žieminių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra aromatinių C10-C13 angliavandenilių (<1 % naftaleno).

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį ● Dirgina odą ● Sukelia smarkų akių dirginimą ● Įtariama, kad sukelia vėžį ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ● Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją ● Neskatinti vėmimo ● Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją ● Surinkti ištekęsį medžiagą ● Talyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuotę (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telikinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telikinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Produkto saugojimas – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo lengvųjų užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje negu +35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.



**BĪSTAMI
PAVOJINGA**

LS09E30CFR_01

4 x 5 L



Skaneit informacijai /
Nuskaityti QR kodą



UN3082



8 718077 016634

**GRUPA
GRUPĖ** **3** **FUNGICĪDS
FUNGICIDAS**



ULTRACA®



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



BĪSTAMI/PAVOJINGA



UN3082

L50993PAAR_01

30 x 20 L