

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az **Adama Hungary Zrt.** (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) ügyfélnek a **Merpan 80 WDG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **Merpan 80 WDG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/773/1/2007 MgSzHK számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

12. Engedélyokirat érvényessége: **2026. május 1.**

II. I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Almatermésűek <i>alma, körte, birs, naspolya</i>	varasodás, monília betegség	10	7	1,25-2,0	800-1500	<i>rügypattanástól (BBCH 07) végső gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 80)</i>
Csonthéjasok <i>cseresznye, meggy,</i>	sztigminás betegség, monília betegség, antraknózis	3	7	1,25-2,0	800-1200	<i>rügypattanástól (BBCH 07) zöldborsó nagyságú gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 71-74)</i>
<i>szilva, őszibarack, nektarin, kajsz</i>	tafrinás levélfodrosodás, sztigminás, monília betegség	4				<i>rügypattanástól (BBCH 07) 70-80%-os gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 77-78)</i>

szamóca	gombabetegségek, kivéve: lisztharmat	2	7	1,25	400-600	<i>betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81)</i>
málna	gombabetegségek, kivéve: lisztharmat	6	7	1,25	400-600	<i>betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81)</i>
paradicsom	paradicsomvész, alternáriás betegség, szürkerothadás	4	7	1,25-1,6	400-600	<i>5 leveles állapottól (BBCH 15) az 1. bogyó teljes kifejlődéséig (BBCH 71)</i>

Előírt növényvédelmi technológia:

Alma, körte, birs, naspolya: Varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdni, és a fertőzés erőssége alapján 7-10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkszerű használata célszerű.

Cseresznye, meggy, szilva, nektarin, őszibarack, kajsi: A monília virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és szíromhulláskor célszerű permetezni. Meggyben antraknózis ellen a kezeléseket a gyümölcsnövekedés kezdeti időszakára kell időzíteni. Zöldborsó nagyságú gyümölcsállapotig 1-2 alkalommal szükséges permetezni. Őszibarackban és nektarinban a tafrinás levélfodrosodás ellen a kezeléseket a rügypattanást követő időszakban javasolt elvégezni 8-10 naponként 2-3 alkalommal, fertőzési nyomástól függően a készítményt önmagában, vagy felszívódó fungicidek kombinációs partnereként használva. Tavasszal, hűvös időjárás esetén csontthéjasokban a hajtás- és gyümölcsnövekedés idején végrehajtott kezelések a sztigminás betegség ellen is védelmet nyújtanak. A készítmény jégverést és vihart követően 12 órán belül kipermetezve segíti a sebzáródást és gátolja a fertőzések kialakulását. Ez utóbbi kezeléskor fokozottan kell ügyelni a várakozási idő betartására.

Szamóca, málna: szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban fertőzést megelőző kezeléssel használható fel. Fertőzésre kedvező feltételek között a kezeléseket eltérő hatóanyagú készítményekkel váltott használat mellett a virágzás elején, teljes virágzáskor és a virágok 80 %-os elvirágzásakor kell elvégezni. *Málnában* levél- és vesszőbetegségek ellen a védekezést rügypattanáskor kell kezdeni, és azt a virágzásig kétszer, 10 naponként megismételni. Erős fertőzés esetén szüret után, a letermett vesszők eltávolítását követően 2-3 alkalommal, 10 naponta kiegészítő kezelésekre lehet szükség. *Szamócában* levélfoltosságok ellen a termésszedést követően, a fertőzés erőssége alapján 1-2 alkalommal, 10-12 naponként célszerű védekezni.

Paradicsom: a kezeléseket az előrejelzése alapozva, preventíven kell elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni.

A készítmény kijuttatása ültetvényekben csak olyan berendezéssel történhet, amellyel jelentősen növelhető a kijuttatás precizitása és pontossága, ezáltal nagymértékben csökkenthető a készítmény nem cél felületekre jutó mennyisége. A kezeléskor a permetlé talajra jutó mennyiségét legalább 20%-kal szükséges csökkenteni a nem precíziós kijuttatási technológiákhoz képest.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kontakt hatású készítmény.

Hatásmechanizmus:

kaptán: sejtlegzést gátló ftálimidszármazék (FRAC kód: M4)

III. Az engedélyokirat 15. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

15. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

a kiszerelés tömege: 30g, 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg

a csomagolószerszám anyaga: laminált tasak (1 kg, 5 kg), ill.
polietilénnel bélelt papírsák (10 kg, 20 kg)

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Az ügyfél köteles a raktári készleteken lévő készítményeket 2025. május 1. napjáig átcímkézni. A 02.5/773/1/2007 MgSzHK számú engedély alapján címkézett készítmények legfeljebb 2026. május 1-ig használhatók fel.

A megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján tájékoztatni.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2024. december 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba


igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(743/2024)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 30 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/773/2/2007. MgSzHK
- 1.2. Növényvédő szer neve: Merpan 80 WDG
- 1.3. Engedélyokirat tulajdonosa: Adama Hungary Zrt.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -
- 1.5. A növényvédő szer gyártója: Adama Makhteshim Ltd
Beer-Sheva 84100, Izrael

2. A növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer

3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői:

hatóanyag

ISO név

IUPAC név

CAS szám

részaránya

kaptán

N-(triklorometiltio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid

133-06-2

800 g/kg

4. Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. hatóanyag tartalom

kaptán (HPLC)

80,0± 2,5 % (m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok

5.2 Nedvesedő képesség
(MT 53.3)

teljes nedvesedés > 1 perc

5.3 Nedves szitamaradék
(MT 185)

< 1 % (75 µm szitán)

5.4 Szuszpenzió stabilitás
(MT 184)

>75 %

5.5 Habzóképesség
(MT 47.2)

< 20 cm³ (1 perc után)

Tárolási stabilitás

5.7 Tárolási stabilitás 54 °C-on
(MT 46.3)

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az 5.2, 5.3 és 5.4 előírásainak.

6. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Almatermésűek <i>alma, körte, birs, naspolya</i>	varasodás, monília betegség	10	7	1,25-2,0	800-1500	<i>rügypattanástól (BBCH 07) végső gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 80)</i>
Csonthéjasok <i>cseresznye, meggy,</i>	sztigminás betegség, monília betegség, antraknózis	3	7	1,25-2,0	800-1200	<i>rügypattanástól (BBCH 07) zöldborsó nagyságú gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 71-74)</i>
<i>szilva, őszibarack, nektarin, kajsz</i>	tafrinás levélfodrosodás, sztigminás, monília betegség	4				<i>rügypattanástól (BBCH 07) 70-80%-os gyümölcsméret kialakulásáig (BBCH 77-78)</i>
szamóca	gombabetegségek, kivéve: lisztharmat	2	7	1,25	400-600	<i>betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81)</i>
málna	gombabetegségek, kivéve: lisztharmat	6	7	1,25	400-600	<i>betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81)</i>
paradicsom	paradicsomvész, alternáriás betegség, szürkerothadás	4	7	1,25-1,6	400-600	<i>5 leveles állapottól (BBCH 15) az 1. bogvó teljes kifejlődéséig (BBCH 71)</i>

Előírt növényvédelmi technológia:

Alma, körte, birs, naspolya: Varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdni, és a fertőzés erőssége alapján 7-10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkyszerű használata célszerű.

Cseresznye, meggy, szilva, nektarin, őszibarack, kajszi: A monília virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és szíromhulláskor célszerű permetezni. Meggyben antraknózis ellen a kezeléseket a gyümölcsnövekedés kezdeti időszakára kell időzíteni. Zöldborsó nagyságú gyümölcsállapotig 1-2 alkalommal szükséges permetezni. Őszibarackban és nektarinban a tafrinás levélfodrosodás ellen a kezeléseket a rügypattanást követő időszakban javasolt elvégezni 8-10 naponként 2-3 alkalommal, fertőzési nyomástól függően a készítményt önmagában, vagy felszívódó fungicidek kombinációs partnereként használva. Tavasszal, hűvös időjárás esetén csonthéjasokban a hajtás- és gyümölcsnövekedés idején végrehajtott kezelések a sztigminás betegség ellen is védelmet nyújtanak. A készítmény jégverést és vihart követően 12 órán belül kipermetezve segíti a sebzáródást és gátolja a fertőzések kialakulását. Ez utóbbi kezeléskor fokozottan kell ügyelni a várakozási idő betartására.

Szamóca, málna: szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban fertőzést megelőző kezeléssel használható fel. Fertőzésre kedvező feltételek között a kezeléseket eltérő hatóanyagú készítményekkel váltott használat mellett a virágzás elején, teljes virágzáskor és a virágok 80 %-os elvirágzásakor kell elvégezni. *Málnában* levél- és vesszőbetegségek ellen a védekezést rügypattanáskor kell kezdeni, és azt a virágzásig kétszer, 10 naponként megismételni. Erős fertőzés esetén szüret után, a letermett vesszők eltávolítását követően 2-3 alkalommal, 10 naponta kiegészítő kezelésekre lehet szükség. *Szamócában* levélfoltosságok ellen a természedést követően, a fertőzés erőssége alapján 1-2 alkalommal, 10-12 naponként célszerű védekezni.

Paradicsom: a kezeléseket az előrejelzése alapozva, preventíven kell elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni.

A készítmény kijuttatása ültetvényekben csak olyan berendezéssel történhet, amellyel jelentősen növelhető a kijuttatás precizitása és pontossága, ezáltal nagymértékben csökkenthető a készítmény nem cél felületekre jutó mennyisége. A kezeléskor a permetlé talajra jutó mennyiségét legalább 20%-kal szükséges csökkenteni a nem precíziós kijuttatási technológiákhoz képest.

Légi kijuttatás:..nem engedélyezett

Kontakt hatású készítmény.

Hatásmechanizmus:

kaptán: sejtlégzést gátló ftálimidszármazék (FRAC kód: M4)

7. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

7.1. Veszélyességi besorolás

7.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*:	nem jelölésköteles;
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

7.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P405	Elzárva tárolandó.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

7.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
- SPe 2** A talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területeken ne használja!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növényekre, bogyós gyümölcsűekre és zöldségfélékre **5 m**, almatermésűekre és csonthéjasokra **30 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

7.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

8. Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
almatermésűek	28
csonthéjasok	21
szamóca	14
málna	10
paradicsom	21

9. Munkaegészségügyi óvrendszabályok:**Egyéni védőfelszerelés:**

Előkészítőknak és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli, védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés.*

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs.*

10. Forgalmazási kategória: I.

11. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

12. Engedélyokirat érvényessége: 2026. május 1.

13. -

14. -

15. A növényvédő szer készrelése, csomagolása:

a készrelés tömege: 30g, 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg

a csomagolóanyag: laminált tasak (1 kg, 5 kg), ill.
polietilénnel bélelt papírsák (10 kg, 20 kg)

Budapest, 2024. december 13.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.