

USO AGRÍCOLA



FUNGICIDA

SULFACOB® - 25

sulfato de cobre pentahidratado

FUNGICIDA

CRISTALES SOLUBLES

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Sulfato de Cobre: Sulfato de cobre pentahidratado "con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 25 %". Equivalente a 250 g de i.a./kg	98.23
INGREDIENTES INERTES: Impurezas.	1.77
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-FUNG-0357-006-039-098

CONTENIDO NETO:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:

INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

POTRERILLOS No. 6,
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 57810.
TEL.: + 52 (55) 51 13 26 06.

DISTRIBUIDOR:

INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.
E-mail: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
TEL.: + 52 (55) 55 24 83 69.

HECHO EN MÉXICO.

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, cubrebocas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Mezcle los preparativos con un removedor, nunca con las manos, aunque tenga los guantes puestos. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. No use la boca para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de aplicación y protección, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ÉSTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lave la parte afectada con abundante agua corriente limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, dé a beber un vaso con agua, no induzca el vómito pues es probable que este se presente en forma espontánea. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Inorgánicos.

Síntomas de intoxicación: En caso de ingestión produce malestar estomacal. Irrita la piel temporalmente.

Antídoto y tratamiento: En caso de intoxicación el tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 00 928 00; 01 (55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS).

GARANTÍA

Como la aplicación, manejo, transporte y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, **Ingeniería Industrial, S.A. DE C.V.**, no se hace responsable de su uso y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

SULFACOB® - 25 es un fungicida agrícola preventivo diseñado para preparar caldo bordelés. No se aplique sin antes neutralizar la preparación con cal agrícola. Úsese en las dosis que abajo se indican contra las siguientes enfermedades:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS POR HECTÁREA COMO CALDO BORDELES (kg)
AGUACATERO (SL)	SARNA O ROÑA <i>Sphaceloma persea</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Cercospora purpurea</i>	20 a 30
APIO (SL)	TIZÓN TARDÍO <i>Septoria apii</i> MANCHA FOLIAR <i>Phyllosticta apii</i>	4 a 6
CACAO (SL)	MAZORCA NEGRA <i>Phytophthora palmivora</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> PUDRICIÓN MORENA <i>Diplodia theobromae</i>	4 a 6
CAFETO (SL)	MANCHA DE HIERRO <i>Cercospora coffeicola</i> MOHO DE HILACHAS <i>Corticium koleroga</i> MAL ROSADO <i>Corticium salmonicolor</i> ROYA DEL CAFETO <i>Hemileia vastatrix</i> OJO DE GALLO <i>Omphalia flavida</i>	4 a 6
CÍTRICOS (SL)	ROÑA O SARNA <i>Elsinoe fawcetti</i> MELANOSIS <i>Diaporthe citri</i> MANCHA GRASIENTA <i>Mycosphaerella citri</i>	20 a 30
MELÓN SANDÍA CALABAZA (SL)	CENICILLA <i>Erysiphe cichoracearum</i> MILDIÚ <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum lagenarium</i>	3 a 5
CHILE (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> MANCHA BACTERIANA <i>Xanthomonas vesicatoria</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum capsici</i> MANCHA DEL TALLO <i>Cercospora capsici</i>	1.5 a 2
FRIJOL (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ROYA O CHAHUXTLE <i>Uromyces phaseoli</i>	4 a 6
GUAYABO (SL)	ANTRACNOSIS O CLAVO <i>Gloeosporium psidii</i> FUMAGINA <i>Capnodium sp.</i> PUDRICIÓN DEL FRUTO <i>Diplodia natalensis</i>	10 a 20

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS POR HECTÁREA COMO CALDO BORDELES (kg)
MANGO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum gloesporioides</i> FUMAGINA <i>Capnodium sp.</i> PUDRICIÓN DEL FRUTO <i>Diplodia natalensis</i>	10 a 20
PAPA (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Stemphylium solani</i>	4 a 6
PAPAYO (SL)	TIZÓN O MARCHITEZ SUREÑA <i>Sclerotium rolfsii</i> SARNA O ROÑA <i>Spongospora subterranea</i>	10 a 15
PLÁTANO (SL)	CHAMUSCO O SIGATOKA <i>Mycosphaerella musicola</i>	8 a 10
TABACO (SL)	OJO DE RANA <i>Cercospora nicotianae</i>	4 a 6
TOMATE (JITOMATE) (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i> ANTRACNOSIS <i>Glomerella cingulata</i> MANCHA GRIS DE LA HOJA <i>Stemphylium solani</i> MARCHITEZ <i>Phytium sp.</i>	4 a 6
VID (SL)	MILDIÚ <i>Plasmopara viticola</i> CENICILLA <i>Uncinula necator</i>	8 a 10

IMPORTANTE: La dosis por cada 100 L de agua es de 1.0 kg de **SULFACOB® - 25** y 1.0 kg de cal para cualquiera de los cultivos aquí recomendados.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

Preparación: Para preparar una barrica de 200 litros del caldo bordelés, disolver 2.0 kg de **SULFACOB® - 25** en aproximadamente 180 litros de agua; aparte disolver 2.0 kg de cal en aproximadamente 20 litros de agua y agregarla lentamente agitando de manera constante, hasta formar un precipitado azul claro. Prepare únicamente la cantidad de caldo bordelés que se va a utilizar. **ÚSELO EL MISMO DÍA**, no se deje almacenado.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 km/h) ni cuando exista alta probabilidad de lluvia.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se utiliza en los cultivos y las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con Fenvalerato, Paratión, Clorpirifós, Diclorán ni con productos de fuerte reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

