

RESISTENTIEGROEP 5 HERBICIDE

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
 Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen.
Contact met de huid
 Aangestoste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Bij klachten een arts raadplegen.
Contact met de ogen
 Onmiddellijk afspülen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende -minstens 15 minuten- blijven spoelen met zuiver water. Medische hulp inroepen als symptomen aanhouden.
Inname
 Mond grondig met water spoelen. Veel water (stern) drinken. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief lijst toepassingsgebieden versie 2.0, Cijb juni 2013) onder de vermeldde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teefcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teefcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Buiten	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 kg/ha ²	1	-	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	6	-	5
Rode biet	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 kg/ha ²	1	-	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	6	-	5
Bloembal- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	voor opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 - 4 kg/ha ²	2	5 kg/ha	7
	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 - 4 kg/ha ²	2	5 kg/ha	7
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ²	10	-	7
Bloembal- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	voor opkomst of na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1 - 2 kg/ha ²	2	4 kg/ha	7

¹ Straatgras (Poa annua)
² Dosering afhankelijk van de grondsoort
 * In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.
³ LDS in combinatie met olie.
⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen.
⁵ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de onbedekte teelt van togetes, aardbei, spinazie m.u.v. roosstelen, anjiliet, tuimelde, knolraap, knolraap, knolveldier, mierks-wortel, organo voor etherische oliën, zomerbloemen, bloemsterrijgewassen, sierheesters inclusief rozen, heide soorten, de vaste plantenteelt, de bloemenzaadteelt, en de verdelings- en zaadteelt is beoordeeld conform artikel 91 EG 1007/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fyto-toetsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom uitgegaan van geen preëxpositie uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.



© ADAMA Registrations B.V.

HERBICIDE Waterdispergeerbaar granulaat



Werkzame stof

● Metamitron 70%



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 8629N (W.11)

Toelatinghouder:
 ADAMA Registrations B.V.,
 Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
 Nederland

www.adama.com
 Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mis deze is leeggemaakt zoals wettelijk is voorgeschreven



L11120IPWP_05

5 KG e

UN3077

UFI: RJU1-52AQ-00T-SAKU



8 718077 000534

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teefcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teefcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Togetes (groenbemester)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	5	5 kg/ha	7
Aardbei (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 kg/ha ²	3	3 kg/ha	10
Spinazie m.u.v. roosstelen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	4 kg/ha per 12 maanden	-
Anjiliet (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Tuimelde (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Knolraap (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Knolraap (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Knolveldier (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
na het planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	-	-	
Mierkswortel (onbedekte teelt)	na het planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Organo voor etherische oliën (onbedekte teelt)	na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	3	5 kg/ha	10
Zomerbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ²	9	-	-	
Bloemsterrijgewassen m.u.v. zomerbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha	9	-	-	
Sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 kg/ha ²	3	3 kg/ha	10
Heide soorten (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 kg/ha ²	3	3 kg/ha	10
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	10	5 kg/ha	7
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ²	9	-	-	
Wendelings- en granenzaadteelt en zaadteelt van kruidenten, bieten, peulvruchten, olijfboude zaden, verselgewassen, groenbemesters-gevoelen, veldgewassen en wild, cichorei, boekweit, meestrap, quinoa, ried, wuiv, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-

¹ Straatgras (Poa annua)
² Dosering afhankelijk van de grondsoort.
³ Eventueel in combinatie met toegelaten middelen.

Toepassingsvoorwaarden
 Mijkt een bieringewe door welke oorzaak dan ook (bijv. verstechde of insectenwa) en is Goltix WG toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:
 - zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
 - na ploegen kunnen mais en aardappelen worden geteeld.

Resistentie management
 Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.
 Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN
Voorkomen emissie
 Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stellen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor eventuele slootstoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele reststoffen die niet over het loot besloten perceel kunnen worden uitgedren in een biologisch zuiveringstelsel om onnodig milieubelasting te voorkomen.
 Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER
 De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Door door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden. kunnen wij in verband daarmee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of gebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENSGELIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENSGELIE
 Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken ● **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik ● **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
 Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur is geventileerd.

HANTEREN EN OPSLAG
 Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Opslaan in gesloten originele verpakking in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



GOLTIX[®] WG



ADAMA



HERBICIDE

Waterdispergeerbaar
granulaat

© ADAMA Registrations B.V.



Werkzame stof

- Metamitron 70%



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 8629N (W.11)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is leeggemaakt zoals
wettelijk is voorgeschreven



www.agrirecover.eu

UN3077



8 718077 000541



NEDERLAND

RESISTENTIEGROEP 5 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik ● P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water

verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur is geventileerd.

HANTEREN EN OPSLAG
Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Opslaan in gesloten originele verpakking in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

L111200CFR_05

4 x 5 KG



GOLTIX[®] WG



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



SPECIMEN



UN3077

LJJJ20PAAR_05

16 x 20
KG