



MAVRIK®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



INSECTICIDE

Emulsie, olie in water



Werkzame stof

- Tau-fluvalinaat 240 g/L (23,87 %w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16750N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L2296&IPFR_02



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

**NO VARNISH
AREA**

5 L e



MAVRIK®



ADAMA



INSECTICIDE

Emulsie, olie in water



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280C:** Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-

GROEP 3A INSECTICIDE

punt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren in gesloten originele verpakking. Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L2296AIPBB_02



WAARSCHUWING

UN3082

UFI: 1WSG-DD75-0V00-SRJS



NEDERLAND



8 718077 015019

hier openen



EERSTE HULP



GEbruik &
DOSIS



MAVRIK®



ADAMA



INSECTICIDE

Emulsie, olie in water



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRA-
GEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280C:** Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder

GROEP 3A INSECTICIDE

afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren in gesloten originele verpakking. Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN3082

UFI: 1WSG-DD75-0V00-SRJS



L22966IPB8_02

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens de Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aan- tal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aan- tal liter mid- del per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Aardappelen	Kevers ¹	0,2 L/ha	2	0,4 L/ha	14	7
Wintertarwe, Winter- gerst, Winterrogge, Tri- ticale	Cicaden ²	0,2 L/ha	1	0,50 L/ha**	10	30
	Galmuggen	0,15 L/ha	2			
	Bladluizen	0,2 L/ha	1			
		0,15 L/ha	2			
Zomergranen	Galmuggen Bladluizen	0,15 L/ha	2	0,3 L/ha	10	30
Droog te oogsten erwten	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	14
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				
Droog te oogsten bonen	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	14
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				
Koolzaad	Kevers ⁴ Bladluizen	0,2 L/ha	2	0,4 L/ha	7	30
Zonnebloem	Bladluizen	0,3 L/ha	2	0,6 L/ha	14	60
Aardbei (onbedekte teelt)	Bladluizen Mijten Vliegen ⁵	0,3 L/ha	2	0,6 L/ha	14	7
Druif (onbedekte teelt)	Cicaden	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	21
	Mijten Trips	0,3 L/ha				
Boon met peul (onbedekte teelt)	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	7
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aan- tal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aan- tal liter mid- del per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	7
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	7
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Bladluizen Galmuggen	0,2 L/ha	2	0,6 L/ha	14	7
	Rupsen ³ Trips	0,3 L/ha				
Meloen (onbedekte teelt)	Bladluizen	0,2 L/ha	2	0,4 L/ha	14	7
Aubergine (onbedekte teelt)	Bladluizen	0,2 L/ha	2	0,4 L/ha	14	3
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Bladluizen Rupsen ⁶	0,3 L/ha	1	0,3 L/ha	-	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Bladluizen Rupsen ⁶	0,3 L/ha	1	0,3 L/ha	-	7
Wortelen (onbedekte teelt)	Bladluizen	0,3 L/ha	2	0,6 L/ha	14	14
Artisjok (onbedekte teelt)	Bladluizen	0,3 L/ha	2	0,6 L/ha	7	7
Boomkwekerijgewassen m.u.v. hoge laanbo- men*** (onbedekte teelt)	Bladluizen	0,2 L/ha	2	0,8 L/ha	14	-
	Wolluizen Wants ⁷	0,4 L/ha				

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepas-
singsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per
toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Maximaal 1 toepassing van 0,2 L/ha in de herfst en 2 toepassingen van 0,15 L/ha in de lente

*** Met een hoogte > 5 m

¹ Coloradokever (*Leptinotarsa decemlineata*)

² Cicaden (*Psammotettix alienus*)

³ Erwtepeulboorder (*Cydia nigricana*)

⁴ koolzaadglanskever (*Meligethes* spp), koolzaadaardvloo (*Psylliodes chrysocephala*), raapstamsnuitkever (*Ceu-
torhynchus napi*)

⁵ Suzuki fruitvlieg (*Drosophila suzukii*)

⁶ Grote koolwitje (*Pieris brassicae*)

⁷ Plataannetwants (*Corythucha ciliata*)

Het gebruik in de teelt van aromatische en medicinale kruid- en wortelgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teelt- cyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aromatische en medi- nale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen Kevers	0,4 L/ha	2	14
Aromatische en medi- nale wortelgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen Kevers	0,4 L/ha	2	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepas-
singsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen, wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, haver, zomerrogge, triticale, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, koolzaad, zonnebloem, aardbei, druif, boon met peul, boon zonder peul, erwt met en zonder peul, wortelen, artisjok, aromatische en medicinale kruid-
gewassen, aromatische en medicinale wortelgewassen het middel toepassen in 100 tot 400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloemkoolachtigen, sluitkoolachtigen, aubergine en meloen het middel toepassen in
100 tot 500 liter water per ha.

In de teelt van boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 500 tot 1000 liter water per ha.

In het geval van neerwaartse toepassing, het middel uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen appa-
raatuur.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas

Behandelde aromatische en medicinale kruidgewassen, en aromatische en medicinale wortelgewassen niet voor
menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toe-
passing van het middel in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomergranen, koolzaad,
aardappelen, aubergine, meloen, bloem- en sluitkoolachtigen, droog te oogsten erwten en bonen, erwten en
bonen met en zonder peul en artisjok uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt
van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 225 cm ge-
meten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de
perceelgrens, of;

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van zonnebloemen, wortelen en aardbeien uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 250 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens, of;

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen, is toepassing van het middel in de teelt van spullen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing van het middel in de teelt van druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van druiven op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 325 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing van het middel in de teelt van opzetters op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 1000 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van opzetters op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 575 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen, is toepassing van het middel in de teelt van boomkwekerijgewassen (neerwaarts bespoten) en kruidenteelt vers of gedroogd m.u.v. kruidenzaadgewassen (onbedekte teelt) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 250 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van boomkwekerijgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat als werkzame stof tau-fluvalinate. Tau-fluvalinate behoort tot de groep van "Sodium Channel modulators". De IRAC code is 3A. Het resistentierisico is hoog. Het maximaal aantal toepassingen tegen perzikluis en stuifmeelkever is 1. Wissel af met toegelaten middelen op basis van een andere werkzame stof. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



MAVRIK®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



INSECTICIDE

Emulsie, olie in water



Werkzame stof

- Tau-fluvalinaat . . 240 g/L (23,87 %w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16750N

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8 718077 015026



NEDERLAND

GROEP 3A INSECTICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P280C: Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding ● P501: Inhoud/verpakking

afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Achter slot bewaren in gesloten originele verpakking. Vorstvrij bewaren in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING



ADAMA

L229680CFR_02

4 x 5 L



MAVRIK®



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L22968PAAR_02

30 x 20 L