



FOX[®] 480 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15193N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.



**NO VARNISH
AREA**

5 L e

L10923IPFR_07



FOX[®] 480 SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P391:** Gelekte/gemorst stoffen opruimen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SPI:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS



NERDERLAND



8 718077 013961

hier openen

GROEP 14 HERBICIDE

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: UJ5Q-HD40-2V07-HM09



FOX[®] 480 SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
● **P273:** Voorkom lozing in het milieu ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-punt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING

GROEP 14 HERBICIDE

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: UJ5Q-HD40-2V07-HM09



NEDERLAND



8 718077 013961

10942IPBB_07

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inname

Prehospitaal : symptomatische behandeling.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Wintergraan m.u.v. kanariegras	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Zomergraan m.u.v. haver	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Engels raagras (graszaadteelt)	Na opkomst	Ereprijs ¹ , Paarse dovenetel ² , Hoenderbeet ³	0,65 L/ha	1 in maart-april
Graszdenteelt	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Golfterrein	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Ereprijs (*Veronica* spp.)

²Paarse dovenetel (*Lamium purpureum*)

³Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanne-melijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassin-gen per 12 maanden
Graszaadteelt m.u.v. Engels raagras	Na opkomst	Ereprijs ¹ , Akkerviooltje ² , Paarse dovenetel ³ , Hoenderbeet ⁴	0,65 L/ha	2 1 ^a toepassing in aug-nov 2 ^a toepassing in maart-april
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Tussen of over het gewas **	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^a toepassing in april-mei 2 ^a toepassing in aug-sept
Laanbomen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^a toepassing in april-mei 2 ^a toepassing in aug-sept

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanne- melijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassin- gen per 12 maanden
Klimplanten (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Heide soorten (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Tussen of over het gewas **	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Tussen of over het gewas **	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (onbedekte teelt)	Tussen of over het gewas **	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,65 L/ha	2 1 ^e toepassing in april-mei 2 ^e toepassing in aug-sept

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepas-
singsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Spuiten over het gewas alleen na de bloei (BBCH 70), op een afgehard gewas.

¹ Ereprijs (*Veronica* spp.)

² Akkerviooltje (*Viola arvensis*)

³ Paarse dovenetel (*Lamium purpureum*)

⁴ Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintergraan m.u.v. kanariegras, zomergraan m.u.v. haver, graszaadteelt, graszodenteelt en golf-
terrein het middel toepassen van het 3-blad stadium (BBCH 13) tot uitstoeling (BBCH 29).

Binnen 3 maanden na toepassing van het middel mag geen beweiding worden toegepast en mag het gewas niet
vervoerd worden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoort behorende geleedpotigen te beschermen, is toepassing van het middel met een dosering van 1,5 L/ha uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van

- Een techniek uit tenminste klasse DRT97,5, of
- Een techniek uit tenminste klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/ insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en planten te beschermen, is toepassing in de teelt van Engels raaigras op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 95 in combinatie met een teeltvrije zone van 125 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en planten te beschermen, is toepassing in de teelt van Engels raaigras op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een van de volgende driftreducerende maatregelen:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens).

Als vervanggewassen na verlies van gewas in de winter, worden zomergranen of raaigrassen aanbevolen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



FOX[®] 480 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15193N (W.3)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8 718077 013978



NEDERLAND



GROEP 14 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P273: Voorkom lozing in het milieu ● P391: Gelekte/gemorste stof opruimen ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

4 x 5 L

L107230CFR-07

 **FOX[®] 480 SC**



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L10923PAAR_07

30 x 20 L