



Maxentis®

 fungicide
Plug en Spray



Het probleem

In Nederlandse granen komen diverse belangrijke schimmelziekten voor.

In winter- en zomertarwe en triticale gaat het met name om *Septoria tritici*, gele roest, bruine roest, echte meeldauw en aarfusarium.

In winter- en zomergerst spelen echte meeldauw, bladvlekkenziekte, ramularia, netvlekkenziekte en bruine roest een grote rol; in rogge vooral bladvlekkenziekte en bruine roest.

De vroege bladziekten zoals *Septoria*, *rhynchosporium*, meeldauw en netvlekkenziekte

bouwen zich meestal op vanaf het late winter-/vroeg voorjaar (maart–april) en bereiken hun grootste impact in het voorjaar (april–mei) rond stengelstrekking en vlagblad.

Gele roest kan al vroeg in het voorjaar toeslaan en piekt vaak in april–mei.

Fusarium in tarwe is vooral kritisch rond de bloei (eind mei–juni), wanneer vochtig weer zorgt voor aarbesmetting en daarmee mycotoxinen.

Bruine roest in tarwe, gerst en rogge treden meestal later in het seizoen op en veroorzaken de meeste schade van bloei tot begin afrijping (juni–juli), vooral bij warm en vochtig weer.

Het is daarom van fundamenteel belang om te beschikken over oplossingen die worden gekenmerkt door een breed bestrijdingsspectrum, een effectieve preventieve en curatieve werking en een uitstekende duurwerking.



Echte meeldauw



Netvlekkenziekte



Septoria



Bruine roest



Gele roest



Ramularia



FUNGICIDE



MAXENTIS®

T1 fungicide
Plug en Spray

Dé oplossing

Onze Maxentis®, bestaande uit 200 g/l azoxystrobin en 150 g/l prothioconazool tegen verschillende schimmels in graangewassen.

Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe
Wintergerst, zomergerst
Winterrogge, zomerrogge
Wintertriticale, zomertriticale

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Septoria (<i>Septoria tritici</i>)	1 l/ha, 1 toepassing
Gele roest (<i>Puccinia striiformis</i>)	
Bruine roest (<i>Puccinia recondita</i>)	
Echte meeldauw (<i>Blumeria graminis</i>)	
Fusarium (<i>Fusarium</i> sp.)	
Bladvlekkenziekte (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	
Netvlekkenziekte (<i>Pyrenophora teres</i>)	
Bruine roest (<i>Puccinia hordei</i>)	

Formuleringstype

Suspensie concentraat (SC)

Verpakkingsgrootte

5 liter

Ons advies

In granen kan Maxentis® worden gebruikt in een T1 - T3 toepassing in een spuitschema met andere fungiciden, of solo. Wij adviseren de Maxentis in te zetten op de T1, omdat hij daar goed tot zijn recht komt.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per hectare.

Meer details? Scan hier





Effectiviteit van Maxentis®

Maxentis® in gerst

Proeven 2018-2024




Maxentis® in tarwe

Proeven 2018-2024



Positionering van Maxentis®

Maxentis® fungicide kan worden toegepast in tarwe vanaf begin strekking (BBCH30 – BBCH 32) tot volle bloei (BBCH69). In gerst kan Maxentis® worden toegepast vanaf begin strekking tot volle bloei (BBCH65). Aan te passen aan de ziektedruk en de gevoeligheid van het ras.






Stavento® toevoegen voor meerwaarde

In granen adviseren wij de toevoeging van Stavento® in het schema.

Stavento® geeft meerwaarde:

- Stavento® beschermt actieve stoffen voor resistentievorming. Zo voorkom je ook shifting.
- Stavento® verlengt de periode van groen blad.

Hieronder staan de proefresultaten van Stavento® op zowel de T1 als de T2, als beide behandelingen.



In tarwe duiden de Stavento® proeven aan dat er goede effectiviteit is op septoria.

In gerst is Stavento® dé referentie tegen ramularia. Gebruik 1,5 liter per hectare.

Stavento® mag 1 tot 2 keer toegepast worden. Voor meer informatie benadert u uw adviseur.



Voegt waardevolle effectiviteit toe tegen Septoria en Ramularia



Verlengt de periode van groen blad



Significant rendement op de investering



Resistentiemanagement om effectiviteit van single-sites te beschermen





FUNGICIDE



ADAMA

STAVENTO®

De essentiële multi-dite fungicide:
Duurzame beheersing van graanziekten



Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe

Wintergerst, zomergerst

Ons advies

Wij adviseren Stavento in te zetten op zowel de T1, als de T2 voor het beste resultaat. Gebruik 1,5 liter per hectare Stavento voor maximaal 2 behandelingen.

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Septoria (Septoria tritici)	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)	
Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)	
Ramularia (Ramularia collocygni)	

Actieve stof

500 g/l folpet

Formuleringstype

Suspensieconcentraat (SC)

Verpakkingsgrootte

In 5 & 10 liter verkrijgbaar

Meer details? Scan hier



Als u vragen heeft over het spuitschema, de positionering van het product of andere vragen, neem dan contact met ons op of uw adviseur.

ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK, Leusden, Nederland
+31 33 205 6800 | info.ane@adama.com | adama.com/nederland/nl



Volg ons op social media



Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Raadpleeg altijd het etiket voor de aanvullende eisen zoals toepassingsstadium, risicobeperkende maatregelen en andere opmerkingen. Let vooral op aanvullende instructies, pictogrammen en gevarenaanduidingen voor een veilig gebruik van het product.