

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

Scan voor gebruik



ADAMA

Werkzame stof: **Gehalte:**
Metamitron 525 g/L (45,1 % w/w)
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

5 L e

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

ANEGOLNLSIT/07/A
T318A_09
NL162560MF-R4

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280C:**
Beschermdende handschoenen en beschermende kleding
dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 006352 >



www.phytofarrecover.eu



NEDERLAND



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks
zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

ANEGOLNLSLT/07/B
S318B_09
NL162580MF-R4

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280C:**
Beschermdende handschoenen en beschermende kleding
dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



www.phytotarrecover.eu



NEDERLAND



8 718077 006352 >



hier openen



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks
zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling.

Het middel is uitsluitend toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juli 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden

Toepas- singsgebied	Type toepas- sing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter per ha per teeltcyclus
Bieten	Na op- komst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 L/ha	3	7	6 L/ha
	of	Eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1	10 tussen voor- en na-opkomst toepassing	
	Na op- komst		1 L/ha ¹	3	5	
	of	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,75 – 1,25 L/ha ¹	6	5	

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor de verlaagde doseringen.

¹in LDS-systeem

Het gebruik in de teelt van bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp), bolbloemen en knolbloemen en pioen is beoordeeld conform artikel 51 EC 107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepas- singsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepas- singen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen	Maximaal aantal liter per ha per teeltcyclus
Lelie (onbedekte vermeerde- ringsteelt)	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7-1 L/ha	6	5 dagen	6 L/ha
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte vermeerde- ringsteelt)	Voor- opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	2	5 dagen	6 L/ha
	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7-1 L/ha	6		
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Voor- opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	2	5 dagen	6 L/ha
	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7-1 L/ha	6		
Pioen (snijbloemen, onbedekte teelt)	Voor opkomst en na opkomst onder het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	3	5 dagen	4,5 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Drag beschermende kleding en handschoenen tijdens het handmatig spuiten in lelie, gladiol (vermeerderingsteelt), pioen, hyacint, narcissen en andere bloembollen en bloemknollen.

Drag geschikte handschoenen en kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die quinmerac bevatten slechts eens per twee jaar worden toegepast, waarbij niet meer dan 6 liter middel per hectare mag worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp), en bolbloemen en knolbloemen in de periode 1 september tot

1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix Queen toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;
- na ploegen en een wachttijd van 2 maanden na de laatste toepassing kunnen raaigras en klaver worden geteeld.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.

Metamitron behoort tot de triazinonen de Hrac code is C1, Quinmerac behoort tot de quinoli-necarboxylic-zuren de Hrac code is O.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie-management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

Werkzame stof:
Metamitron
Quinmerac

Gehalte:
525 g/L (45,1 % w/w)
40 g/L (3,4 % w/w)

Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)

Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.



ADAMA

ANEGOLQNL5LT/07/C1
T318C_09
NL62581MF-R4

GOLTIX® QUEEN

GOLTIX® QUEEN

Herbicide

Maximaal effectief en veilig onkruidvrij



Werkzame stof: Metamitron
Gehalte: 525 g/L (45,1 % w/w)
Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC 5, 4

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)
Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van 525 g/L Metamitron (45,1 % w/w) en Quinmerac 40 g/L (3,4 % w/w)

Toelatingsnummer: 14298N (W.7)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken •
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



UN 3082

ANEGOLN15LT/07/C2
T318D_09
NL16258MF-R4

GOLTIX[®] QUEEN



NEDERLAND



30 x 20 L



UN 3082

ANEGOLQNL5LT/07/X T318P_09 NL162581MF-R4



ADAMA
Northern Europe B.V.