

# GOLTIX® SUPER

## Herbicide

Scan voor gebruik



ADAMA

**Werkzame stof:**  
Metamitron  
Ethofumesaat

**Gehalte:**  
350 g/L (31,3%w/w)  
150 g/L (13,5%w/w)

**Aard van het preparaat:**

Suspensie concentraat

**Resistentiecode:** HRAC C1,N

**Toelatingsnummer:** 12982N (W.5)

**Toelatingshouder:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

5 L e

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

ANEGOLSNL517/04/A  
T3524A/10

# GOLTIX® SUPER



## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en  
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N (W.5)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN  
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden •

**SP 1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn  
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is  
bedrijfsafval, mits deze  
is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.

**UN 3082**

**STORL**  
VERPAKKING

BEDRIJFS-  
AFVAL



NEDERLAND



8 718077 002248 >

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-  
on. Kan een allergische reactie veroorzaken

• **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en het  
milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend  
herbetreden nadat de spuitvloeistof is  
opgedroogd; werkzaamheden kunnen  
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik  
van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats  
is vereist. Verwijderd houden van eet- en  
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in  
de oorspronkelijke verpakking bewaren. De  
verpakking mag niet worden hergebruikt.

### WAARSCHUWING



ANEGOLSNL5LT/04/B  
53524B/10

# GOLTIX® SUPER

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en  
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N **W.5**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN  
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden •

**SP 1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn  
verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is  
bedrijfsafval, mits deze  
is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 002248 >

**UN 3082**

**STORL**  
VERPAKKING  
BEDRIJFS-  
AFVAL



**NEDERLAND**



hier openen



### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-  
on. Kan een allergische reactie veroorzaken

• **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en het  
milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend  
herbetreden nadat de spuitvloeistof is  
opgedroogd; werkzaamheden kunnen  
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik  
van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats  
is vereist. Verwijderd houden van eet- en  
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in  
de oorspronkelijke verpakking bewaren. De  
verpakking mag niet worden hergebruikt.

### WAARSCHUWING



ANEGOLSNL5LT/04/B  
53524B/10

## EERSTE HULP MAATREGELEN

### **Inademing**

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

### **Contact met de huid**

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

### **Contact met de ogen**

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

### **Inname**

Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

## ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden

| Toepassings-<br>gebied | Type<br>toepassing | Werkzaam-<br>heid getoetst<br>op                                          | Dosering*<br>(middel) per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepas-<br>singen per<br>teeltcyclus | Maximaal<br>aantal liter<br>middel per<br>ha per<br>teeltcyclus | Minimum<br>interval<br>tussen toe-<br>passingen in<br>dagen |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bieten                 | voor<br>opkomst    | Eenjarige<br>breed-<br>bladige<br>onkruiden en<br>straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha**                                | 1                                                          | 6 L/ha                                                          | -                                                           |
|                        | na<br>opkomst      | Eenjarige<br>breed-<br>bladige<br>onkruiden en<br>straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha**                                | 3                                                          |                                                                 | 7                                                           |
|                        |                    |                                                                           | 1 L/ha***                               | 6                                                          |                                                                 | 7                                                           |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* In combinatie met 0,5-1 liter per ha minerale of plantaardige olie.

\*\*\* In LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen en in combinatie met 0,5-1 L/ha minerale of plantaardige olie.

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per hectare.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen wortel-, knol- en bladgewassen en graan voor diervoeder telen.

Na toepassen van het middel altijd goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van het middel de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden:

suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raagrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze volggewassen dan geen ethofumesaat bevattende middelen toepassen.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen Ethofumesaat en Metamitron. De werkzame stof Ethofumesaat behoort tot de Benzofuranen, de HRAC code is N. De werkzame stof Metamitron behoort tot de Triazinonen, de HRAC code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Algemeen

In de toepassingen voor de opkomst werkt Goltix® Super als bodemherbicide, bij na opkomst toepassingen is Goltix® Super werkzaam als zowel blad- als bodemherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na opkomst toepassingen.

Ongevoelig voor Goltix® Super zijn wilde haver, hanenpoot, bingelkruid en wortelonkruiden.

### Attentie

- Aan de combinaties van Goltix® Super met plantaardige of minerale olie en/of met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd.
- Goltix® Super dient niet na-opkomst te worden toegepast als nachtvorst wordt verwacht óf in een periode met temperaturen boven de 25°C.
- Bij temperaturen overdag boven de 20°C dient de bespuiting na opkomst bij voorkeur in de avonduren te worden uitgevoerd.

### Gewassen

Bieten, ter bestrijding van éénjarige breedbladige onkruiden en straatgras

### Toepassingen voor opkomst van het gewas

De meeste onkruiden worden verzwakt door een vooropkomst toepassing van 2 L/ha Goltix® Super. Deze toepassing is met name noodzakelijk wanneer veel kamille of straatgras wordt verwacht.

### Toepassingen voor- en na-opkomst van het gewas

Kort voor opkomst en na opkomst van het gewas kan Goltix® Super op verschillende momenten worden toegepast. De mogelijkheden zijn in het volgende overzicht weergegeven.

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eerste toepassing | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in vóór-opkomst van de bieten                                                 |
| Tweede toepassing | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst vanaf het kiembladstadium tot het 2-4-bladstadium van de bieten |
| Derde toepassing  | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten                           |
| of                |                                                                                                                                            |
| Eerste toepassing | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten                            |
| Tweede toepassing | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 2-4-bladstadium van de bieten                            |
| Derde toepassing  | 2 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten                           |

### Toepassing in het Lage Dosering Systeem

Dosering: 1 L/ha Goltix® Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie, in combinatie met fenmedifam

Eerste toepassing na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten

Vervolg toepassing Uitvoeren afhankelijk van de onkruiddruk in het kiembladstadium van het onkruid

Maximaal 6 toepassingen per seizoen.

- De selectiviteit van de aanbevolen toepassingen van Goltix® Super in bieten is groot. De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van bijvoorbeeld nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslemping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen.

### **Voorkomen emissie**

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele

restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen. Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

# GOLTIX® SUPER

Herbicide

**Werkzame stof:**  
Metamitron  
Ethofumesaat

**Gehalte:**  
350 g/L (31,3%w/w)  
150 g/L (13,5%w/w)

**Aard van het preparaat:**  
Suspensie concentraat  
**Resistentiecode:** HRAC C1,N

**Toelatingsnummer:** 12982N (W.5)  
**Toelatingshouder:**  
ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK LEUSDEN, Nederland  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.



ANEGOLSNL5LT/04/C1  
T3524C/10

GOLTIX® SUPER

# GOLTIX® SUPER

## Herbicide



**Werkzame stof:** Metamitron  
**Gehalte:** 350 g/L (31,3%w/w)  
Ethofumesaat 150 g/L (13,5%w/w)

**Aard van het preparaat:** Suspensie concentraat  
**Resistentiecode:** HRAC C1,N

**Toelatingsnummer:** 12982N (W.5)  
**Toelatinghouder:** ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK LEUSDEN, Nederland  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd.

Scan voor gebruik



Suspensie concentraat (SC) op basis van  
350 g/L Metamitron (31,3 % w/w) en  
150 g/L Ethofumesaat (13,5 % w/w)

Toelatingsnummer 12982N (W.5)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar  
voor de menselijke gezondheid en het  
milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN  
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende  
organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen  
houden • **SP 1:** Zorg ervoor dat u met het  
product of zijn verpakking geen water  
verontreinigt.

Deze verpakking is  
bedrijfsafval, mits deze  
is schoongespoeld zoals  
wettelijk is voorgeschreven.



8 718077 002255 >

UN 3082



### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-  
on. Kan een allergische reactie veroorzaken  
• **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om  
gevaar voor de menselijke gezondheid en  
het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend  
herbetreden nadat de spuitvloeistof is  
opgedroogd; werkzaamheden kunnen  
vervolgens worden uitgevoerd zonder  
gebruik van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats  
is vereist. Verwijderd houden van eet- en  
drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend  
in de oorspronkelijke verpakking  
bewaren. De verpakking mag niet worden  
hergebruikt.

### WAARSCHUWING



ANEGOLSNLT/04/C2  
13524D/10

# GOLTIX<sup>®</sup> SUPER



NEDERLAND



WAARSCHUWING

30 x 20 L



UN 3082

T3524P/10

ANEGOLSL5LT/04/X

ADAMA  
Northern Europe B.V.

