



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA

©ADAMA Registrations B.V.



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stoffen

- Ethofumesaat 150 g/L (13,5 % w/w)
- Metamitron 350 g/L (31,3 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12982N (W.5)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven



www.agrirecover.eu

**NO VARNISH
AREA**



NEDERLAND

L101071PFR_12

5 L e



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA



HERBICIDE

Suspensie concentraat

©ADAMA Registrations B.V.



Werkzame stoffen

- Ethofumesaat 150 g/L (13,5 % w/w)
- Metamitron 350 g/L (31,3 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12982N (W.5)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven



www.agrirecover.eu

UN3082



8 718077 002255



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ●
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMEN- TEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG


Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

L101070CFCR_12

4 x 5 L



GOLTIX[®] SUPER



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L1J0J07PAAR_112

30 x 20
L



GOLTIX[®] SUPER



HERBICIDE

Suspensie concentraat

RESISTENTIEGROEP N | C1 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water veront-

reinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEbruik & DOSIS



NERDERLAND



8 718077 002248

hier openen



L10107IPBB_12



GOLTIX[®] SUPER



HERBICIDE

Suspensie concentraat



RESISTENTIEGROEP N | C1 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082



NEDERLAND



8 718077 002248

LJ0107IPBB_12

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha**	1	6 L/ha	-
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha**	3		7
			1 L/ha***	6		7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** In combinatie met 0,5 - 1 liter per ha minerale of plantaardige olie.

*** In LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen en in combinatie met 0,5 - 1 L/ha minerale of plantaardige olie.

¹ Straatgras (*Poa annua*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per hectare.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen wortel-, knol- en bladgewassen en graan voor diervoeder telen.

Na toepassen van het middel altijd goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van het middel de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze volggewassen dan geen ethofumesaat bevattende middelen toepassen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen Ethofumesaat en Metamitron. De werkzame stof Ethofumesaat behoort tot de Benzofuranen, de HRAC code is N. De werkzame stof Metamitron behoort tot de Triazinonen, de HRAC code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Algemeen

In de toepassingen voor de opkomst werkt Goltix Super als bodemherbicide, bij na opkomst toepassingen is Goltix Super werkzaam als zowel blad- als bodemherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na opkomst toepassingen.

Ongevoelig voor Goltix Super zijn wilde haver, hanenpoot, bingelkruid en wortelonkruiden.

Attentie

-Aan de combinaties van Goltix Super met plantaardige of minerale olie en/of met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd.

-Goltix Super dient niet na-opkomst te worden toegepast als nachtvorst wordt verwacht óf in een periode met temperaturen boven de 25°C.

-Bij temperaturen overdag boven de 20°C dient de bespuiting na opkomst bij voorkeur in de avonden te worden uitgevoerd.

Gewassen

Bieten, ter bestrijding van éénjarige breedbladige onkruiden en straatgras

Toepassingen voor opkomst van het gewas

De meeste onkruiden worden verzwakt door een vooropkomst toepassing van 2 L/ha Goltix Super. Deze toepassing is met name noodzakelijk wanneer veel kamille of straatgras wordt verwacht.

Toepassingen voor- en na-opkomst van het gewas

Kort voor opkomst en na opkomst van het gewas kan Goltix Super op verschillende momenten worden toegepast. De mogelijkheden zijn in het volgende overzicht weergegeven.

Eerste toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in vóór-opkomst van de bieten
Tweede toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst vanaf het kiembladstadium tot het 2-4-bladstadium van de bieten
Derde toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten

of

Eerste toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten
Tweede toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 2-4-bladstadium van de bieten
Derde toepassing	2 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie in na-opkomst in het 4-10 bladstadium van de bieten

Toepassing in het Lage Dosering Systeem

Dosering: 1 L/ha Goltix Super + 0,5-1 L minerale of plantaardige olie, in combinatie met fenmedifam

Eerste toepassing	na-opkomst in het kiembladstadium van de bieten
Vervolg toepassing	Uitvoeren afhankelijk van de onkruiddruk in het kiembladstadium van het onkruid
Maximaal 6 toepassingen per seizoen.	

De selectiviteit van de aanbevolen toepassingen van Goltix Super in bieten is groot. De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van bijvoorbeeld nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslemping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.