

GEWAS	TOEPASSINGSTADIUM	WERKZAAMHEID AANNEMELIJK TEGEN	DOSERING	MAX AANTAL TOEPASSINGEN (INTERVAL)
Aardappelen	Voor poten	Rhizoctonia	5 L/ha bij veurtoepassing 0,3 L/ton bij knoltoepassing	1
Groenteteelt	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacterien	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Uien	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Valse meeldauw	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Suikerbieten	Vanaf bladontwikkeling tot oogst	Cercospora	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Rode bieten	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Cercospora	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Sla	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Bremia	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Bloembol- en bloemknolgewassen	Boldompeling	Fusarium	2,5%	1
	Grondbehandeling	Rhizoctonia, Pythium	15 L/ha	1
	Gewasbespuiting	Botrytis	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Kleinfruit en overige fruitsoorten	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Echte meeldauw	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Groot fruit	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Echte meeldauw	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Aromatische kruidgewassen	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacterien	3 L/ha	4-8 (14 dagen)
Voedergewassen	Vanaf blad- tot vruchtontwikkeling	Plantpathogene schimmels en bacterien	3 L/ha	4-8 (14 dagen)

Bron: CTGB