



# CAPONE®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



**FUNGICIDE**

**Suspensie concentraat**



## Werkzame stof

● Captan . . . . . 500 g/L (41 % w/w)



## Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16175N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



## Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

**NO VARNISH  
AREA**

10 L e

L20778IPFR\_05

|                          |                   |                                                                                              |                           |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | Capone®           | <br>ADAMA |                           |
| Country                  | NL                |                                                                                              |                           |
| Package size             | 10 L              |                                                                                              |                           |
| Label code               | L20778IPFR_05     |                                                                                              |                           |
| Label dimensions (w x h) | 170mm x 150mm     |                                                                                              |                           |
| Label date               | 12-12-50 11.02.26 | Name                                                                                         |                           |
| Smallest font on page    | 11.98 pt          | Status                                                                                       |                           |
|                          |                   | Template                                                                                     | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



# CAPONE®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



## Werkzame stof

- Captan . . . . 500 g/L (41 % w/w)

## ! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16175N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



## Scan voor gebruik



UN3082



8

718077 012964



NERLAND



GEVAAR



ADAMA

## GROEP M4 FUNGICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL  
Captan

### GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
● H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker  
● H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden  
● H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden  
● P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen  
● P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen  
● P280: Draag bescher-

mende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming  
● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen  
● P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen  
● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval  
● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L207780CFR\_05


2 x 10 L

|                          |                   |                                    |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Product name             | Capone®           |                                    |
| Country                  | NL                |                                    |
| Package size             | 10 L              |                                    |
| Label code               | L207780CFR_05     |                                    |
| Label dimensions (w x h) | 300mm x 165mm     | Name                               |
| Label date               | 12.12.20 11.02.26 | Status                             |
| Smallest font on page    | 8,68 pt           | Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |

**ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS  
SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S.  
(CAPTAN)**



**UN3082**





**UN3082**

**ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS  
SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S.  
(CAPTAN)**

L20778IPS1\_05



**9**



# CAPONE®



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



## UN3082

L20778PAAR\_05

30 x 20 L

|                          |                   |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Product name             | Capone®           |  |
| Country                  | NL                |                                                                                     |
| Package size             | 10 L              |                                                                                     |
| Label code               | L20778PAAR_05     |                                                                                     |
| Label dimensions (w x h) | 297mm x 210mm     |                                                                                     |
| Label date               | 12-12-10 11:02:26 | Name                                                                                |
| Smallest font on page    | <SmallestFont>    | Status                                                                              |
|                          |                   | Template Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt                                                  |

## FUNGICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**  
Captan

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
**• H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker  
**• H361f:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden **• H372:** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
**• H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### VOORZORGSMAATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden **• P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen **• P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen **• P280:** Draag

### GROEP M4 FUNGICIDE

beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming **• P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen **• P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen **• P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval **• SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



**GEVAAR**

**UN3082**

UFI: 3DXJ-7F1Y-MQ02-J0TE



NEDERLAND



8 718077 012957

hier openen



EERSTE HULP



GEBRUIK & DOSIS

|                          |                   |          |                           |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Product name             | Capone®           |          |                           |
| Country                  | NL                |          |                           |
| Package size             | 10 L              |          |                           |
| Label code               | L20778IPBB_05     |          |                           |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     | Name     |                           |
| Label date               | 12.12.20 11.02.26 | Status   |                           |
| Smallest font on page    | 7.88 pt           | Template | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |



L20778IPBB\_05



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL  
Captan

#### GEVARENAANDUIDINGEN

**H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361f:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden • **H372:** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### VOORZORGSMATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Draag beschermende handschoenen/bescher-

#### GROEP M4 FUNGICIDE

mende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen • **P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

#### HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR



UN3082

UFI: 3DXJ-7F1Y-MQ02-J0TE



NEDERLAND



8 718077 012957

L2077&IPBB\_05

|                          |                   |          |                           |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Product name             | Capone®           |          |                           |
| Country                  | NL                |          |                           |
| Package size             | 10 L              |          |                           |
| Label code               | L2077&IPBB_05     |          |                           |
| Label dimensions (w x h) | 170mm x 144mm     |          |                           |
| Label date               | 12-12-50 11.02.26 | Name     | Status                    |
| Smallest font on page    | 8,1 pt            | Template | Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt |

## EERSTE HULP MAATREGELEN

### Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

### Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

### Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.

### Inname

Laten braken. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. De mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

Contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (alleen professionele hulpverleners) voor bijkomende inlichtingen.

|                          |                   |                                                                                     |                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Product name             | Capone®           |  |                           |
| Country                  | NL                |                                                                                     |                           |
| Package size             | 10 L              |                                                                                     |                           |
| Label code               |                   |                                                                                     |                           |
| Label dimensions (w x h) | 145mm x 150mm     | Name                                                                                |                           |
| Label date               | 12:12:50 11.02.26 | Status                                                                              |                           |
| Smallest font on page    | 7 pt              | Template                                                                            | Rect_SLT_1Lang_NA_NA.indt |

# WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassingsgebied         | Type toepassing              | Te bestrijden organisme                               | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Appel                     | Gewasbehandeling             | Schurft <sup>1</sup>                                  | 0,2% (200 mL per 100 L water)    | 1,1 L/ha <sup>1</sup>                     | 15 per 12 maanden                                              | 24,1 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 28                           |
|                           |                              |                                                       | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 1,47 L/ha <sup>2</sup>                    | 10 per 12 maanden                                              |                                             | 10                                            |                              |
|                           |                              | Bewaarrot <sup>3</sup><br>Bewaar-schurft <sup>1</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 1,1 L/ha <sup>3</sup>                     | 4 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             |                              |
|                           | Gewasbehandeling na de oogst | Vruchtboomkanker <sup>4</sup>                         | 0,4% (400 mL per 100 L water)    | 1,57 L/ha <sup>4</sup>                    | 2 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             | -                            |
| Peer                      | Gewasbehandeling             | Schurft <sup>5</sup><br>Zwartvruchtrot <sup>15</sup>  | 0,2% (200 mL per 100 L water)    | 1,1 L/ha <sup>1</sup>                     | 15 per 12 maanden                                              | 24,1 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 28                           |
|                           |                              |                                                       | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 1,47 L/ha <sup>2</sup>                    | 10 per 12 maanden                                              |                                             | 10                                            |                              |
|                           |                              | Bewaarrot <sup>3</sup><br>Bewaar-schurft <sup>5</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 1,1 L/ha <sup>3</sup>                     | 4 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             |                              |
|                           | Gewasbehandeling na de oogst | Vruchtboomkanker <sup>4</sup>                         | 0,4% (400 mL per 100 L water)    | 1,57 L/ha <sup>4</sup>                    | 2 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             | -                            |
| Aardbei (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling             | Vruchtrot (grauwe schimmel) <sup>6</sup>              | 0,25% (250 g per 100 L water)    | 1,5 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               | 3,0 L/ha per 12 maanden                     | 10                                            | 14                           |
| Aardbei (bedekte teelt)   | Gewasbehandeling             | Vruchtrot (grauwe schimmel) <sup>6</sup>              | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               | 6,0 L/ha per 12 maanden                     | 10                                            | 14                           |

| Toepassingsgebied            | Type toepassing                      | Te bestrijden organisme              | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Aalbes (onbedekte teelt)     | Gewasbehandeling na de oogst         | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>  | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                | 9,0 L/ha per 12 maanden                     | 7                                             | -                            |
|                              | Gewasbehandeling na wintersnoei      |                                      | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                                |                                             | -                                             | -                            |
| Aalbes (bedekte teelt)       | Gewasbehandeling van bloei tot oogst | Bloesemrot en vruchtrot <sup>6</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 6 per 12 maanden                                                | 27,0 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 7                            |
|                              | Gewasbehandeling na de oogst         | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>  | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                |                                             | 7                                             | -                            |
|                              | Gewasbehandeling na wintersnoei      |                                      | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                                |                                             | -                                             | -                            |
| Kruisbes (onbedekte teelt)   | Gewasbehandeling na de oogst         | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>  | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                | 9,0 L/ha per 12 maanden                     | 7                                             | -                            |
|                              | Gewasbehandeling na wintersnoei      |                                      | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                                |                                             | -                                             | -                            |
| Kruisbes (bedekte teelt)     | Gewasbehandeling van bloei tot oogst | Bloesemrot en vruchtrot <sup>6</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 6 per 12 maanden                                                | 27,0 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 7                            |
|                              | Gewasbehandeling na de oogst         | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>  | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                |                                             | 7                                             | -                            |
|                              | Gewasbehandeling na wintersnoei      |                                      | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                                |                                             | -                                             | -                            |
| Blauwe bes (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling na de oogst         | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>  | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                | 9,0 L/ha per 12 maanden                     | 7                                             | -                            |
|                              | Gewasbehandeling na wintersnoei      |                                      | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                                |                                             | -                                             | -                            |

| Toepassingsgebied          | Type toepassing                                                                    | Te bestrijden organisme                                                     | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Blauwe bes (bedekte teelt) | Gewasbehandeling van bloei tot oogst                                               | Bloesemrot en vruchtrot <sup>6</sup>                                        | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 6 per 12 maanden                                               | 27,0 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 7                           |
|                            | Gewasbehandeling na de oogst                                                       | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>                                         | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             | -                           |
|                            | Gewasbehandeling na wintersnoei                                                    |                                                                             | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                               |                                             | -                                             | -                           |
| Braam (onbedekte teelt)    | Gewasbehandeling na de oogst                                                       | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>                                         | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                               | 9,0 L/ha per 12 maanden                     | 7                                             | -                           |
| Braam (bedekte teelt)      | Gewasbehandeling van bloei tot einde bloei                                         | Bloesemrot <sup>6</sup>                                                     | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 6 per 12 maanden                                               | 27,0 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 7                           |
|                            | Gewasbehandeling na de oogst                                                       | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup>                                         | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             | -                           |
| Framboos (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling na de oogst                                                       | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup><br>Didimella-stengelziekte <sup>2</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                               | 9,0 L/ha per 12 maanden                     | 7                                             | -                           |
| Framboos (bedekte teelt)   | Gewasbehandeling van bloei tot einde bloei                                         | Bloesemrot <sup>6</sup>                                                     | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 6 per 12 maanden                                               | 27,0 L/ha per 12 maanden                    | 7                                             | 7                           |
|                            | Gewasbehandeling na de oogst                                                       | Botrytis-stengelziekte <sup>6</sup><br>Didimella-stengelziekte <sup>2</sup> | 0,25% (250 mL per 100 L water)   | 3,0 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                               |                                             | 7                                             | -                           |
| Anemonen, wol              | Gewasbehandeling (BBCH 12-39, 2 <sup>de</sup> blad zichtbaar – knolvorming begint) | Colletotrichum <sup>19</sup>                                                | 1,65 L/ha                        | 1,65 L/ha                                 | 5 per teeltcyclus                                              | 8,25 L/ha per teeltcyclus                   | 7                                             | -                           |
| Ranonkels, wol             | Gewasbehandeling (BBCH 12-39, 2 <sup>de</sup> blad zichtbaar – knolvorming begint) | Colletotrichum <sup>19</sup>                                                | 1,65 L/ha                        | 1,65 L/ha                                 | 5 per teeltcyclus                                              | 8,25 L/ha per teeltcyclus                   | 7                                             | -                           |

| Toepassingsgebied                                                                                                                                     | Type toepassing                                   | Te bestrijden organisme       | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Bloembollen van tulp (vermeerderingsteelt)                                                                                                            | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 1,4% (1,4 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bolbloemen van tulp (bloementeel)                                                                                                                     | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 0,55% (0,55 L per 100 L water)   | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloemknollen van gladiool (vermeerderingsteelt van kralen) m.u.v. <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i>                                | Dompelbehandeling na warmwaterbehandeling of      | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
|                                                                                                                                                       | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 2,2% (2,2 L per 100 L water)     | -                                         |                                                                | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloemknollen en knolbloemen van gladiool (vermeerderingsteelt van pitten en bloementeel), m.u.v. <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i> | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembol- en bloemknolgewassen van <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i>                                                               | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 2,2% (2,2 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembollen van lelie (vermeerderingsteelt)                                                                                                           | Dompelbehandeling voor of na warmwaterbehandeling | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 2,2% (2,2 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
|                                                                                                                                                       | Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 0,5% (0,5 L per 100L water)      | -                                         |                                                                | -                                           | -                                             | -                            |
| Bolbloemen van lelie (niet-grondgebonden bedekte bloementeel)                                                                                         | Dompelbehandeling                                 | Schimmelziekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |

| Toepassingsgebied                                                            | Type toepassing                                   | Te bestrijden organisme      | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Bolbloemen van lelie (onbedekte bloementeel)                                 | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100L water)      | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembollen van grofbollige narcis (vermeerderingsteelt)                     | Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling | Schimmellekten <sup>16</sup> | 0,28% (0,28 L per 100 L water)   | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembollen van miniatuur narcis (vermeerderingsteelt)                       | Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bolbloemen van miniatuur narcis (bloementeel)                                | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bolbloemen van grofbollige narcis (niet grondgebonden bloementeel)           | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembollen en bolbloemen van hyacint (vermeerderingsteelt en bloementeel)   | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloembol- en bloemknolgewassen van iris (vermeerderingsteelt en bloementeel) | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloemknollen en knolbloemen van krokus (vermeerderingsteelt en bloementeel)  | Dompelbehandeling                                 | Schimmellekten <sup>16</sup> | 1,1% (1,1 L per 100 L water)     | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Bloemknollen van Anemoon (vermeerderingsteelt van wol)                       | Plantgoedbehandeling                              | Schimmellekten <sup>16</sup> | 545 mL per 10 kg wol             | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |

| Toepassingsgebied                                                                                                         | Type toepassing   | Te bestrijden organisme                                                                                                                                                               | Dosering (middel) per toepassing          | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Bloemknollen en knolbloemen van Anemoon (vermeerderingsteelt m.u.v. wol en bloementeel)                                   | Dompelbehandeling | Schimmelziekten <sup>16</sup>                                                                                                                                                         | 1,65% (1,65 L per 100 L water)            | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Overige bloembol- en bloemknolgewassen (bijgoed), die in het voorjaar geplant worden (vermeerderingsteelt en bloementeel) | Dompelbehandeling | Schimmelziekten <sup>16</sup>                                                                                                                                                         | 1% (1,0 L per 100 L water)                | -                                         | 1 per teeltcyclus                                              | -                                           | -                                             | -                            |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)                                                                                      | Gewasbehandeling  | Blad- en twijgziekte <sup>7</sup><br>Schurft <sup>8</sup><br>Roetdauw <sup>9,10,11</sup><br>Oortjesziekte <sup>12</sup>                                                               | 0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water) | 3,5 L/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 17,5 L/ha per 12 maanden                    | 10                                            | -                            |
| Vaste planten (bedekte teelt)                                                                                             | Gewasbehandeling  | Bladvlekkenziekte <sup>13</sup><br>Vlekkenziekte <sup>14</sup>                                                                                                                        | 0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water) | 3,5 L/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 17,5 L/ha per 12 maanden                    | 10                                            | -                            |
| Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)                                                                                      | Gewasbehandeling  | Bladvlekkenziekte <sup>13</sup><br>Oortjesziekte <sup>12</sup><br>Kiemplantenziekten <sup>17</sup><br>Voetrot <sup>18</sup><br>Krulbladziekte <sup>19</sup><br>Kroonrot <sup>20</sup> | 0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water) | 4,2 L/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 21,0 L/ha per 12 maanden                    | 10                                            | -                            |

<sup>1</sup> Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 550 L/ha

<sup>2</sup> Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 588 L/ha

<sup>3</sup> Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 440 L/ha

<sup>4</sup> Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 393 L/ha

<sup>1</sup> *Venturia inaequalis*

<sup>2</sup> *Didymella applanata*

<sup>3</sup> *Gloeosporium*

- <sup>4</sup> *Nectria*  
<sup>5</sup> *Venturia pirina*  
<sup>6</sup> *Botryotinia fuckeliana*  
<sup>7</sup> *Venturia macularis*  
<sup>8</sup> *Venturia* spp.  
<sup>9</sup> *Dematiaceae*  
<sup>10</sup> *Exobasidium vaccinii*  
<sup>11</sup> *Exobasidium rhododendri* (Rododendronbladgast)  
<sup>12</sup> *Exobasidium vaccinii* var. japonicum  
<sup>13</sup> *Ramularia agrestis* (bladvlekkenziekte)  
<sup>14</sup> *Mycocentrospora acerina* (vlekkenziekte)  
<sup>15</sup> *Stemphylium vesicarium*  
<sup>16</sup> Complex van *Penicillium* spp., *Colletotrichum* spp., *Pythium* spp.  
<sup>17</sup> *Botrytis* spp., *Thielaviopsis* spp., *Rhizoctonia* spp.  
<sup>18</sup> *Fusarium* spp., *Phytophthora* spp., *Cantorspora acerina*  
<sup>19</sup> *Colletotrichum acutatum*  
<sup>20</sup> *Sclerotium* spp.

Het gebruik in de grondgebonden bolbloementeel van lelie, en de teelt van vruchtbomen en struiken en *Buxus* is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxici-teitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                                                                                                                                           | Type toepas-sing                       | Te bestrijden organisme           | Dosering (middel) per toe-passing | Maxima-le dosering (middel) per toe-passing | Maximaal aantal toe-passin-gen per 12 maanden | Maximaal aantal li-ter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tus-sen toepas-singen in dagen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bolbloemen van lelie (grondgebonden be-dekte bloementeel)                                                                                                   | Dompelbehan-deling                     | Schimmelziek-ten <sup>16</sup>    | 0,55% (550 ml per 100 L water)    | -                                           | 1 per teelt-cyclus                            | -                                                                      | -                                               |
| Vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt); moerbedden, 1 <sup>ste</sup> , 2 <sup>de</sup> en 3 <sup>de</sup> jaars teelt van vruchtbomen | Gewasbehan-deling (neerwaarts spuiten) | Schurft <sup>1</sup>              | 0,2% (200 ml per 100 L water)     | 2,0 L/ha                                    | 15                                            | 38 L/ha                                                                | 7                                               |
|                                                                                                                                                             |                                        | Vruchtboom-kanker <sup>2</sup>    | 0,4% (400 ml per 100 L water)     | 4,0 L/ha                                    | 2                                             |                                                                        | 7                                               |
| <i>Buxus</i> (onbedekte teelt)                                                                                                                              | Gewasbehan-deling                      | Blad- en tak-sterfte <sup>3</sup> | 0,2% (200 ml per 100 L water)     | 2,0 L/ha                                    | 15                                            | 30 L/ha                                                                | 7                                               |

<sup>1</sup> *Venturia* spp.

<sup>2</sup> *Nectria galligena*

<sup>3</sup> *Cylindrocladium buxicola*

<sup>16</sup> Complex van *Penicillium* spp., *Colletotrichum* spp., *Pythium* spp.

### **Toepassingsvoorwaarden**

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuit-boom (spuitfiets).

Het middel in vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt) tegen schurft niet toepassen na BBCH 85 (gevoerde afrijping).

In de teelt van boomkwekerijgewassen van vruchtbomen (onbedekte teelt) dient het middel verspoten te worden met een volume van 500-1400 L water/ha.

In de teelt van buxus dient het middel verspoten te worden met een volume van 500-1000 L water/ha.

Dit middel mag niet in een tankmix samen met enig ander toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van captan worden toegepast.

Binnen het aangegeven minimum interval voor toepassing van dit middel mag geen ander toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van captan toegepast worden.

Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet in oppervlaktewater terechtkomt.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van appels en peren op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel in de periode vóór 1 mei en vanaf 50% bladval gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien

- dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelmiddel plaatsvindt;
- Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruip;
- Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer.
- Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringstelsel (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosecc) verwerkt worden conform wetgeving.

Om in het water levende organismen, zoogdieren en bijen te beschermen in de teelt van appel en peer het middel in het onder de tabel aangegeven maximale spuitvolume toepassen. Gebruik hiervoor geschikte spuitapparatuur die de precisie van de toepassing verhoogt.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product in de onbedekte teelt niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.

## AANBEVELINGEN

### Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*