



# GOLTIX® SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



**HERBICIDE**

**Suspensie concentraat**



## Werkzame stof

- Metamitron . . . . . 700 g/L (58,3 % w/w)



## Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.7)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



## Scan voor gebruik



Lege, schone  
en droge  
verpakking kan  
bij STORL  
worden  
ingeleverd.



**NO VARNISH  
AREA**

**10 L e**

L126931PFR\_02



**UN3082**

**ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS  
SUBSTANCE  
LIQUID, N.O.S.  
(METAMITRON)**

L12693IPS1\_02

**9**



# GOLTIX<sup>®</sup> SC



ADAMA



## HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**  
Metamitron

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermen de kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren

**GROEP 5 HERBICIDE**

naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

### HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

**UN3082**

UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1



NEDERLAND



8 718077 016276

hier openen

LJ2693IPBB\_02



WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &  
DOSIS



# GOLTIX<sup>®</sup> SC



## HERBICIDE

### Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

**STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL**  
Metamitron

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor

**GROEP 5 HERBICIDE**

gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

**EUH208:** Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

### HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

**UN3082**

UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1



NEREDLAND



8 718077 016276

20\_88DIE692T7

## EERSTE HULP MAATREGELEN

### Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Een arts raadplegen.

### Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

### Contact met de ogen

Het oog gedurende 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Een arts raadplegen.

### Inname

De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Een arts raadplegen.

## ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

| Toepassingsgebied                                             | Type toepassing            | Werkzaamheid gestoet op                                     | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bieten                                                        | voor opkomst               | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5–3 L/ha <sup>2</sup>         | 1 per teeltcyclus                                              | 5 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                             |
|                                                               | rond opkomst               | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha <sup>3</sup>             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                       | 14 <sup>7</sup>                               |
|                                                               | na opkomst                 | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5–1 L/ha <sup>4</sup>         | 6 per teeltcyclus                                              |                                                                       | 5 <sup>8</sup>                                |
| Afrikaantjes ( <i>Tagetes</i> ) als groenbemester             | na opkomst                 | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5–2 L/ha <sup>2</sup>         | 5 per teeltcyclus                                              | 5 L/ha per teeltcyclus                                                | 7                                             |
| Rode biet                                                     | voor opkomst               | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5–3 L/ha <sup>2</sup>         | 1 per teeltcyclus                                              | 5 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                             |
|                                                               | rond opkomst               | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha <sup>3</sup>             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                       | 14 <sup>7</sup>                               |
|                                                               | na opkomst                 | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5–1 L/ha <sup>4</sup>         | 6 per teeltcyclus                                              |                                                                       | 5 <sup>8</sup>                                |
| Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie (onbedekte teelt) | rond opkomst en na opkomst | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha <sup>2</sup>             | 2 per teeltcyclus                                              | 4 L/ha per teeltcyclus                                                | 7                                             |
| Lelie (onbedekte teelt)                                       | rond opkomst of na opkomst | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                              | 5 L/ha per teeltcyclus                                                | 7                                             |
|                                                               | na opkomst                 | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5 L/ha <sup>5</sup>           | 10 per teeltcyclus                                             |                                                                       |                                               |
| Lelie (bedekte teelt)                                         | Rond opkomst en na opkomst | Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1–2 L/ha <sup>6</sup>           | 2 per 12 maanden                                               | 4 L/ha per 12 maanden                                                 | 7                                             |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Dosering afhankelijk van de grondsoort

<sup>3</sup> In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

<sup>4</sup> LDS in combinatie met toegelaten middelen

<sup>5</sup> LDS in combinatie met toegelaten middelen.

<sup>6</sup> De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

<sup>7</sup> Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

<sup>8</sup> Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1007/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                            | Type toepassing | Werkzaamheid aan-nemelijk tegen                             | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassing |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Spinazie m.u.v. raapstelen (onbedekte teelt) | voor opkomst    | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>       | 1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden                            | 2 L/ha per teeltcyclus, 4 L/ha per 12 maanden                         | -                                  |
| Snijbiet (onbedekte teelt)                   | voor opkomst    | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>       | 1 per teeltcyclus                                              | 2 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                  |
| Tuinmelde (onbedekte teelt)                  | voor opkomst    | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>       | 1 per teeltcyclus                                              | 2 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                  |
| Knolraap (onbedekte teelt)                   | voor opkomst    | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>       | 1 per teeltcyclus                                              | 2 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                  |
| Koolraap (onbedekte teelt)                   | voor opkomst    | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>       | 1 per teeltcyclus                                              | 2 L/ha per teeltcyclus                                                | -                                  |

| Toepassingsgebied                                                                                  | Type toepassing  | Werkzaamheid aan-<br>nemelijk tegen                         | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal aan-<br>tal toepassin-<br>gen per teelt-<br>cyclus of per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal li-<br>ter middel<br>per ha per<br>teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval tus-<br>sen toepas-<br>singen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Knolselderij<br>(onbedekte teelt)                                                                  | voor het planten | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                                                | 2 L/ha per teeltcyclus                                                                    | -                                                 |
|                                                                                                    | na het planten   | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                                                |                                                                                           | -                                                 |
| Mierikswortel<br>(onbedekte teelt)                                                                 | na het planten   | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                                                | 2 L/ha per teeltcyclus                                                                    | -                                                 |
| Bloemisterijgewassen<br>(onbedekte teelt)                                                          | voor opkomst     | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                                                | 5 L/ha per teeltcyclus                                                                    | -                                                 |
|                                                                                                    | na opkomst       | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5 L/ha                              | 9 per teeltcyclus                                                                |                                                                                           | 7                                                 |
| Sierheesters incl. rozen<br>(onbedekte teelt)                                                      | na opkomst       | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5 - 1 L/ha <sup>2</sup>             | 3 per teeltcyclus                                                                | 3 L/ha per teeltcyclus                                                                    | 10                                                |
| Heide soorten<br>(onbedekte teelt)                                                                 | na opkomst       | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 0,5 - 1 L/ha <sup>2</sup>             | 3 per teeltcyclus                                                                | 3 L/ha per teeltcyclus                                                                    | 10                                                |
| Veredeling en zaadteelt<br>m.u.v. aardappel, mais,<br>granen en graszaadteelt<br>(onbedekte teelt) | voor opkomst     | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup> | 1,5 - 2 L/ha <sup>2</sup>             | 1 per teeltcyclus                                                                | 2 L/ha per teeltcyclus                                                                    | -                                                 |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Dosering afhankelijk van de grondsoort.

### Overige toepassingsvoorwaarden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volgewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazinonen. De Hrac code is 5.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.*

*Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*



# GOLTIX<sup>®</sup> SC

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



## Werkzame stof

- Metamitron 700 g/L (58,3 % w/w)

## ! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.7)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,  
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



## Scan voor gebruik



UN3082



8 718077 016283



NEDERLAND



## GROEP 5 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL  
Metamitron

### GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-

punt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

### HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING




ADAMA

2 × 10 L

L12629N00692T1

**ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS SUBSTANCE  
LIQUID, N.O.S.  
(METAMITRON)**



**9**

**UN3082**



# GOLTIX<sup>®</sup> SC



ADAMA



NEDERLAND



**WAARSCHUWING**



**UN3082**

LJ2693PAAR\_02

30 x 20 L