



CAPONE®



ADAMA

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

● Captan 500 g/L (41 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16175N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



De lege verpakking kan schoon en droog worden aangeboden bij de STORL-inzameling.

**NO VARNISH
AREA**

10 L e

L23318IPFR_01

Product name	Capone®	 ADAMA	
Country	NL		
Package size	10 L		
Label code	L23318IPFR_01		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	11.3.16 12.10.26	Name	
Smallest font on page	11.98 pt	Status	
		Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt



CAPONE®

© ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Captan 500 g/L (41 % w/w)

! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 16175N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8

718077 013756



NEDERLAND



GEVAAR



ADAMA

GROEP M4 FUNGICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
● H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker
● H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
● H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
● P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
● P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
● P280: Draag bescher-

mende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming
● P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen
● P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen
● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L23318OCFR_01

2 x 10 L


Product name	Capone®	
Country	NL	
Package size	10 L	
Label code	L23318OCFR_01	
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Name
Label date	11/53/44 12/10/26	Status
Smallest font on page	8,68 pt	Template Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt

**ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(CAPTAN)**



9

UN3082





UN3082

**ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(CAPTAN)**

L23318IPS1_01



9



CAPONE®



ADAMA



NEDERLAND



GEVAAR



UN3082

L2331&PAAR_01

30 x 20 L

Product name	Capone®	
Country	NL	
Package size	10 L	
Label code	L2331&PAAR_01	
Label dimensions (w x h)	297mm x 210mm	
Label date	11:53:46.12.10.26	Name
Smallest font on page	<SmallestFont>	Status
		Template Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt

FUNGICIDE

Suspensie concentraat

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
• H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker
• H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
• H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
• H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
• P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
• P280: Draag

GROEP M4 FUNGICIDE

beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming
• P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen
• P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
• SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: 3DXJ-7F1Y-MQ02-J0TE



NEDERLAND



8 718077 013749

hier openen



GEVAAR



EERSTE HULP



GEBRUIK & DOSIS

Product name	Capone®		
Country	NL		
Package size	10 L		
Label code	L23318IPBB_01		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name	
Label date	11/33/46 12/10/26	Status	
Smallest font on page	7,88 pt	Template	Rect_SLT_1Lang_NA_NA.indt



L23318IPBB_01





FUNGICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Captan

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H361f:** Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden • **H372:** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen • **P280:** Draag beschermende handschoenen/bescher-

GROEP M4 FUNGICIDE

mende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming • **P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen • **P314:** Bij onwel voelen een arts raadplegen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



GEVAAR



UN3082

UFI: 3DXJ-7F1Y-MQ02-J0TE



NEDERLAND



8 718077 013749

123181PBB_01

Product name	Capone®		
Country	NL		
Package size	10 L		
Label code	L233181PBB_01		
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm		
Label date	11-53-46 12.10.26	Name	Status
Smallest font on page	8,1 pt	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp invoeren indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.

Inname

Laten braken. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. De mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Symptomatisch behandelen.

Contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (alleen professionele hulpverleners) voor bijkomende inlichtingen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, CtgB juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Appel	Gewasbehandeling	Schurft ¹	0,2% (200 mL per 100 L water)	1,1 L/ha ¹	15 per 12 maanden	24,1 L/ha per 12 maanden	7	28
			0,25% (250 mL per 100 L water)	1,47 L/ha ²	10 per 12 maanden		10	
		Bewaarrot ³ Bewaar-schurft ¹	0,25% (250 mL per 100 L water)	1,1 L/ha ³	4 per 12 maanden		7	
	Gewasbehandeling na de oogst	Vruchtboomkanker ⁴	0,4% (400 mL per 100 L water)	1,57 L/ha ⁴	2 per 12 maanden		7	-
Peer	Gewasbehandeling	Schurft ⁵ Zwartvruchtrot ¹⁵	0,2% (200 mL per 100 L water)	1,1 L/ha ¹	15 per 12 maanden	24,1 L/ha per 12 maanden	7	28
			0,25% (250 mL per 100 L water)	1,47 L/ha ²	10 per 12 maanden		10	
		Bewaarrot ³ Bewaar-schurft ⁵	0,25% (250 mL per 100 L water)	1,1 L/ha ³	4 per 12 maanden		7	
	Gewasbehandeling na de oogst	Vruchtboomkanker ⁴	0,4% (400 mL per 100 L water)	1,57 L/ha ⁴	2 per 12 maanden		7	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot (grauwe schimmel) ⁶	0,25% (250 g per 100 L water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	10	14
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot (grauwe schimmel) ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden	6,0 L/ha per 12 maanden	10	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aalbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden	9,0 L/ha per 12 maanden	7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-
Aalbes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	6 per 12 maanden	27,0 L/ha per 12 maanden	7	7
	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden		7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-
Kruisbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden	9,0 L/ha per 12 maanden	7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-
Kruisbes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	6 per 12 maanden	27,0 L/ha per 12 maanden	7	7
	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden		7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-
Blauwe bes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden	9,0 L/ha per 12 maanden	7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Blauwe bes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	6 per 12 maanden	27,0 L/ha per 12 maanden	7	7
	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	2 per 12 maanden		7	-
	Gewasbehandeling na wintersnoei		0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	-
Braam (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	3 per 12 maanden	9,0 L/ha per 12 maanden	7	-
Braam (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot einde bloei	Bloesemrot ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	6 per 12 maanden	27,0 L/ha per 12 maanden	7	7
	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	3 per 12 maanden		7	-
Framboos (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶ Didimella-stengelziekte ²	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	3 per 12 maanden	9,0 L/ha per 12 maanden	7	-
Framboos (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot einde bloei	Bloesemrot ⁶	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	6 per 12 maanden	27,0 L/ha per 12 maanden	7	7
	Gewasbehandeling na de oogst	Botrytis-stengelziekte ⁶ Didimella-stengelziekte ²	0,25% (250 mL per 100 L water)	3,0 L/ha	3 per 12 maanden		7	-
Anemonen, wol	Gewasbehandeling (BBCH 12-39, 2 ^{de} blad zichtbaar – knolvorming begint)	Colletotrichum ¹⁹	1,65 L/ha	1,65 L/ha	5 per teeltcyclus	8,25 L/ha per teeltcyclus	7	-
Ranonkels, wol	Gewasbehandeling (BBCH 12-39, 2 ^{de} blad zichtbaar – knolvorming begint)	Colletotrichum ¹⁹	1,65 L/ha	1,65 L/ha	5 per teeltcyclus	8,25 L/ha per teeltcyclus	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Bloembollen van tulp (vermeerderingsteelt)	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	1,4% (1,4 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bolbloemen van tulp (bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	0,55% (0,55 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloemknollen van gladiool (vermeerderingsteelt van kralen) m.u.v. <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i>	Dompelbehandeling na warmwaterbehandeling of	Schimmelziekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	2,2% (2,2 L per 100 L water)	-		-	-	-
Bloemknollen en knolbloemen van gladiool (vermeerderingsteelt van pitten en bloementeelt), m.u.v. <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i>	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen van <i>Gladiolus nanus</i> en <i>Gladiolus colvillii</i>	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	2,2% (2,2 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembollen van lelie (vermeerderingsteelt)	Dompelbehandeling voor of na warmwaterbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	2,2% (2,2 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
	Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	0,5% (0,5 L per 100L water)	-		-	-	-
Bolbloemen van lelie (niet-grondgebonden bedekte bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Bolbloemen van lelie (onbedekte bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembollen van grofbollige narcis (vermeerderingsteelt)	Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	0,28% (0,28 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembollen van miniatuur narcis (vermeerderingsteelt)	Dompelbehandeling tijdens de warmwaterbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bolbloemen van miniatuur narcis (bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bolbloemen van grofbollige narcis (niet grondgebonden bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembollen en bolbloemen van hyacint (vermeerderingsteelt en bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen van iris (vermeerderingsteelt en bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloemknollen en knolbloemen van krokus (vermeerderingsteelt en bloementeelt)	Dompelbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	1,1% (1,1 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Bloemknollen van Anemoon (vermeerderingsteelt van wol)	Plantgoedbehandeling	Schimmelsekten ¹⁶	545 mL per 10 kg wol	-	1 per teeltcyclus	-	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Bloemknollen en knolbloemen van Anemoon (vermeerderingsteelt m.u.v. wol en bloementeel)	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	1,65% (1,65 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Overige bloembol- en bloemknolgewassen (bijgoed), die in het voorjaar geplant worden (vermeerderingsteelt en bloementeel)	Dompelbehandeling	Schimmelziekten ¹⁶	1% (1,0 L per 100 L water)	-	1 per teeltcyclus	-	-	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Blad- en twijgziekte ⁷ Schurft ⁸ Roetdauw ^{9,10,11} Oortjesziekte ¹²	0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water)	3,5 L/ha	5 per 12 maanden	17,5 L/ha per 12 maanden	10	-
Vaste planten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹³ Vlekkenziekte ¹⁴	0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water)	3,5 L/ha	5 per 12 maanden	17,5 L/ha per 12 maanden	10	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹³ Oortjesziekte ¹² Kiemplantenziekten ¹⁷ Voetrot ¹⁸ Krulbladziekte ¹⁹ Kroonrot ²⁰	0,25 – 0,35% (250-350 mL per 100 L water)	4,2 L/ha	5 per 12 maanden	21,0 L/ha per 12 maanden	10	-

¹ Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 550 L/ha

² Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 588 L/ha

³ Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 440 L/ha

⁴ Bij deze concentratie en dosering is het maximale spuitvolume 393 L/ha

¹ *Venturia inaequalis*

² *Didymella applanata*

³ *Gloeosporium*

- ⁴ *Nectria*
⁵ *Venturia pirina*
⁶ *Botryotinia fuckeliana*
⁷ *Venturia macularis*
⁸ *Venturia* spp.
⁹ *Dematiaceae*
¹⁰ *Exobasidium vaccinii*
¹¹ *Exobasidium rhododendri* (Rododendronbladgast)
¹² *Exobasidium vaccinii* var. japonicum
¹³ *Ramularia agrestis* (bladvlekkenziekte)
¹⁴ *Mycocentrospora acerina* (vlekkenziekte)
¹⁵ *Stemphylium vesicarium*
¹⁶ Complex van *Penicillium* spp., *Colletotrichum* spp., *Pythium* spp.
¹⁷ *Botrytis* spp., *Thielaviopsis* spp., *Rhizoctonia* spp.
¹⁸ *Fusarium* spp., *Phytophthora* spp., *Cantorspora acerina*
¹⁹ *Colletotrichum acutatum*
²⁰ *Sclerotium* spp.

Het gebruik in de grondgebonden bolbloementeel van lelie, en de teelt van vruchtbomen en struiken en *Buxus* is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxici-teitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepas-sing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toe-passing	Maxima-le dosering (middel) per toe-passing	Maximaal aantal toe-passin-gen per 12 maanden	Maximaal aantal li-ter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tus-sen toepas-singen in dagen
Bolbloemen van lelie (grondgebonden be-dekte bloementeel)	Dompelbehan-deling	Schimmelziek-ten ¹⁶	0,55% (550 ml per 100 L water)	-	1 per teelt-cyclus	-	-
Vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt); moerbedden, 1 ^{ste} , 2 ^{de} en 3 ^{de} jaars teelt van vruchtbomen	Gewasbehan-deling (neerwaarts spuiten)	Schurft ¹	0,2% (200 ml per 100 L water)	2,0 L/ha	15	38 L/ha	7
		Vruchtboom-kanker ²	0,4% (400 ml per 100 L water)	4,0 L/ha	2		7
<i>Buxus</i> (onbedekte teelt)	Gewasbehan-deling	Blad- en tak-sterfte ³	0,2% (200 ml per 100 L water)	2,0 L/ha	15	30 L/ha	7

¹ *Venturia* spp.

² *Nectria galligena*

³ *Cylindrocladium buxicola*

¹⁶ Complex van *Penicillium* spp., *Colletotrichum* spp., *Pythium* spp.

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Het middel in vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt) tegen schurft niet toepassen na BBCH 85 (gevoerde afrijping).

In de teelt van boomkwekerijgewassen van vruchtbomen (onbedekte teelt) dient het middel verspoten te worden met een volume van 500-1400 L water/ha.

In de teelt van buxus dient het middel verspoten te worden met een volume van 500-1000 L water/ha.

Dit middel mag niet in een tankmix samen met enig ander toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van captan worden toegepast.

Binnen het aangegeven minimum interval voor toepassing van dit middel mag geen ander toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van captan toegepast worden.

Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet in oppervlaktewater terechtkomt.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van appels en peren op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel in de periode vóór 1 mei en vanaf 50% bladval gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien

- dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelmiddel plaatsvindt;
- Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt;
- Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer.
- Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosecc) verwerkt worden conform wetgeving.

Om in het water levende organismen, zoogdieren en bijen te beschermen in de teelt van appel en peer het middel in het onder de tabel aangegeven maximale spuitvolume toepassen. Gebruik hiervoor geschikte spuitapparatuur die de precisie van de toepassing verhoogt.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product in de onbedekte teelt niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.