



GOLTIX® SC



ADAMA

©Adama Agricultural Solutions Ltd.



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Metamitron 700 g/L (58,3 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.7)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L12629NIPFR_01



Scan voor gebruik



Lege, schone
en droge
verpakking kan
bij STORL
worden
ingeleverd.



NO VARNISH
AREA

5 L e



GOLTIX[®] SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermen-de kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren

GROEP 5 HERBICIDE

naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dieren-voeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082

UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1



NEDERLAND



8 718077 013473

hier openen

WAARSCHUWING



EERSTE HULP



GEBRUIK &
DOSIS

L12881IPBB_01



GOLTIX[®] SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor

GROEP 5 HERBICIDE

gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



WAARSCHUWING

UN3082

UFI: SEQX-7D9C-DV09-EHC1



NEDERLAND



8 718077 013473

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Een arts raadplegen.

Inname

De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5–3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Afrikaantjes (<i>Tagetes</i>) als groenbemester	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–2 L/ha ²	5 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	7
Rode biet	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5–3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	2 per teeltcyclus	4 L/ha per teeltcyclus	7
Lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	7
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 L/ha ⁵	10 per teeltcyclus		
Lelie (bedekte teelt)	Rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1–2 L/ha ⁶	2 per 12 maanden	4 L/ha per 12 maanden	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen

⁵ LDS in combinatie met toegelaten middelen.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

⁷ Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

⁸ Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1007/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aan-nemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal li-ter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tus-sen toepas-singen
Spinazie m.u.v. raapstelen (onbedekte teelt)	voor op-komst	eenjarige breedbla-dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy-clus, 2 per 12 maanden	2 L/ha per teeltcy-clus, 4 L/ha per 12 maan-den	-
Snijbiet (onbedekte teelt)	voor op-komst	eenjarige breedbla-dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy-clus	2 L/ha per teeltcy-clus	-
Tuinmelde (onbedekte teelt)	voor op-komst	eenjarige breedbla-dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy-clus	2 L/ha per teeltcy-clus	-
Knolraap (onbedekte teelt)	voor op-komst	eenjarige breedbla-dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy-clus	2 L/ha per teeltcy-clus	-
Koolraap (onbedekte teelt)	voor op-komst	eenjarige breedbla-dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy-clus	2 L/ha per teeltcy-clus	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aan- nemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teelt- cyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal li- ter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tus- sen toepas- singen
Knolselderij (onbedekte teelt)	voor het planten	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy- clus	2 L/ha per teeltcy- clus	-
	na het plan- ten	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy- clus		-
Mierikswortel (onbedekte teelt)	na het plan- ten	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy- clus	2 L/ha per teeltcy- clus	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	voor op- komst	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy- clus	5 L/ha per teeltcy- clus	-
	na opkomst	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	0,5 L/ha	9 per teeltcy- clus		7
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 L/ha ²	3 per teeltcy- clus	3 L/ha per teeltcy- clus	10
Heide soorten (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 1 L/ha ²	3 per teeltcy- clus	3 L/ha per teeltcy- clus	10
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt (onbedekte teelt)	voor op- komst	eenjarige breedbla- dige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 L/ha ²	1 per teeltcy- clus	2 L/ha per teeltcy- clus	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepas- singsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort.

Overige toepassingsvoorwaarden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazinonen. De Hrac code is 5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



GOLTIX[®] SC

©Adama Agricultural Solutions Ltd.



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Metamitron 700 g/L (58,3 % w/w)

! Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.7)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

Tel.: 033 - 205 68 00

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



UN3082



8 718077 013480



NEDERLAND

with

EASY
CONNECT
easyconnect.tech

GROEP 5 HERBICIDE

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMaatregelen

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-

punt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



ADAMA



WAARSCHUWING

4 x 5 L

L12629N0CFR_01



GOLTIX[®] SC



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



UN3082

L12881PAAR_01

30 x 20 L