


PIRIMOR®

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus



ADAMA

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (500 %w/w)

Formulering: vannløselig granulat (WG)

Registreringsnummer: 2011.19.18

Avgiftsklasse: 2

Virkmåte: IRAC gruppe 1A

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning:

ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederland

www.adama.com

Tilvirker:

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel

Sveits

®ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

1 KG e

ANEPRMNO1KG/01/A

PIRIMOR®

Insektmiddel




FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Farlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED KONTAKT MED ØYENENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



UN 2757



ANEPRMNO1KG/01/B

PIRIMOR®

Insektmiddel



Åpnes her



RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER
OG FØRSTEHJELP

FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Farlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



8 718077 01284 1

UN 2757



NORWAY

ANPRMNOIKG/01/B

BRUK OG DOSERING

BRUKSRETLEDNING

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus.

| Vekst | Skadegørere | Behandlingstid | Konsentrasjon | Maks arealdose | Normal væskemengde | Behandlinger | Dager mellom behandling | Behandlingsfrist, dager |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Tomat, agurk og paprika i veksthus | Bladlus | Ved begynnende angrep | 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann | 75 g per behandling per 1000 m ² nettoareal | Bruk 60-200 liter vann per 1000 m ² nettoareal. Brukes mer enn 150 liter vann per 1000 m ² nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides | 1-2 | 7 | 4 |
| Salat og krydderurter i veksthus | Bladlus | Ved begynnende angrep | 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann | 50 g per behandling per 1000 m ² nettoareal | Bruk 50-100 liter vann per 1000 m ² nettoareal | 1-2 | 7 | 10 |
| Jordbær i veksthus | Bladlus | Ved begynnende angrep | 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann | 50 g per behandling per 1000 m ² nettoareal | Bruk 50-200 liter vann per 1000 m ² nettoareal | 1-2 | 7 | 4 |

VIRKEOMRÅDE

Pirimor® er tillatt brukt i veksthus mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær.

VIRKEMÅTE

Pirimor® har rask virkning mot bladlus-også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler-ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor® gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus.

NYTTEORGANISMER

Pirimor® er godt egnet i integrert plantevern. Pirimor® har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer), og har relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Pirimor® kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus.

RESISTENS

Pirimor® tilhører middelgruppen 1A: Karbamater. Resistens mot Pirimor® er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge.

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor®:

- Pirimor® skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandlinger mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nytteedyr før behandling med Pirimor®.
- Pirimor® bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppe 1B Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.
- Pirimor® bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern og overtrekksklær ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdigt eller avbrytes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved uhell eller mistanke omforgifting kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold till bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk, på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

LAGRING

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette er ingen garanti for at produktet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis produktet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registrert varemerke

Pirimor®-Syngenta Group Company

PIRIMOR®

Insektmedel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat,
krydderurter og jordbær i veksthus

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (500 %w/w)
Formulering: vannløselig granulat (WG)
Registreringsnummer: 2011.19.18
Avgiftsklasse: 2
Virkmåte: IRAC gruppe 1A


Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen
Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederland
www.adama.com

Tilvirker:
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel
Sveits

*ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

10 x 1 KG




ANEPFRMN01KG/01/C1

PIRIMOR®

PIRIMOR®

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus



Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (500 %w/w)
Formulering: vannløselig granulat (WG)
Registreringsnummer: 2011.19.18
Avgiftsklasse: 2
Virkmåte: IRAC gruppe 1A

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen
Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederland
www.adama.com


Tilvirker:
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel
Sveits

©ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

10 x 1 KG

FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Farlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.



Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk


Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



UN 2757




PIRIMOR®



NORWAY

36 x 10 KG



ADAMA

Northern Europe B.V.