



Sammensetning

- Propakvizafof 100 g/L
- Sprede- og emulgeringsmidler 500 g/L
- Fyllstoffer 400 g/L



Bruksområde

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, h  nsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp.



Informasjon

Registreringsnummer: 2016.5. Afgiftsklasse: 2

Innehaver av godkjenning:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederland

www.adama.com

Holdbarhet: minimum 2   r fra produksjonsdatoen



Skann etter informasjon



TRACEABILITY
PRINTING
51/58 x 27 mm

1Le

Kan v  re d  delig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Gir alvorlig   yeirritasjon.

Farlig ved inn  nding.

Mistenkes for    kunne

for  rsake kreft.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares innel  st.

Unng   inn  nding av aerosoler.

VED KONTAKT MED

  YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gj  re. Fortsett skyllingen.

IKKE framkall brekning.

Gjentatt eksponering kan gi t  rr eller sprukket hud.

Inneholder propakvizafof.

Kan gi en allergisk reaksjon

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggj  r tomemballasjen (Se avfallsh  ndtering)

Bruksanvisningen m   f  lges, slik at man unng  r risiko for menneskers helse og milj  et. Det er forbudt    bruke preparatet i strid med godkjent bruksomr  de eller behandlingsfrist, eller    overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

111793IPWB_01

GRUPPE 1 UGRASMIDDEL

FARE



Import  r:

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 K  benhavn S,
Danmark

Tel. +45 32 87 11 00

Tilvirker:

ADAMA Agan Ltd
Northern Industrial
Zone
Ashdod, 77102
Israel

UN3082



UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares innelåst.
Unngå innånding av aerosoler.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
IKKE framkall brekning.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Inneholder propakvizafof.
Kan gi en allergisk reaksjon

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering)

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Agil® 100 EC er tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver- og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær.

VIRKEOMRÅDE

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.
Begrenset virkning mot tunrapp.

Behandlingsfrist

Jordbær: etter høsting

Knollselleri, pastinakk, lin, oljevekster: 90 dager

Rødbete, fôrbete: 60 dager

Potet: 56 dager

Erter, åkerbønne, bønner, rødkløver- og rødsvingelfrøeng: 45 dager

Fôrmargkål, fôrraps: 42 dager

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær, bringebær: 35 dager

Kepaløk, kålrot, gulrot, potet, brokkoli, hodekål: 30 dager

VIRKEMÅTE

Agil® 100 EC virker systemisk og tas opp av grasplantene gjennom bladene. Virkningen inntreffer etter 3-5 dager da grasets tilvekst stopper. Første synlige tegn på virkningen er gul/rødfarging av bladene som inntreffer etter 10-14 dager. Etter ytterligere 3-8 dager foregår en fullstendig nedvisning av grasets. Agil® 100 EC stiller ingen spesielle krav til temperatur. Behandling bør dog ikke foretas ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet (> 70%) og god jordfuktighet. Samt moderat svigninger mellom dag og nattetemperatur. For å få fullgod effekt kreves minst en time uten regn etter sprøyting. Under svært tørre forhold kan virkningen reduseres.

UGRASVIRKNING

Agil® 100 EC er et systemisk ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Virkningen mot tunrapp er begrenset og kan ikke tillegges sikker effekt. Etter 3 bladstadiet oppnås ingen effekt på tunrapp.

Kultur	Ugras	Dosering pr. daa	Sprøyting
Oljeraps (Vår –og høst) oljerybs (Vår –og høst) förmargkål, förraps	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
	Spillkorn, floghavre kne-reverumpe, hönsehir-se m. fl	60-80 mL	Ugraset 2-4 blad
Erter (modning og kon-serves), Åkerbønne, Hagebønne	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
	Spillkorn, floghavre kne-reverumpe, hönsehir-se m. fl	60-80 mL	Ugraset 2-4 blad
Potet ¹	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
	Spillkorn, floghavre kne-reverumpe, hönsehir-se m. fl	60-80 mL	Ugraset 2-4 blad
Lin	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
Rødbete, förbete	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
Rødkløverfrøeng, Rødsvingelfrøeng	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
	Spillkorn/floghavre	60-80 mL	Kornet 2-5 blad
Kepaløk	Kveke	125-150 mL	Kveka 3-5 blad
	Spillkorn, floghavre kne-reverumpe, hönsehir-se m. fl	60-80 mL	Ugraset 2-4 blad
Jordbær på friland etter høsting	Kveke	150 mL	Når kveka har 3-5 blad, straks etter siste høsting.
Bringebær, stikkelsbær, rips, solbær	Kveke	60-80 mL	Etablert felt. mai-juni
Eple, pære, brokkoli, ho-dekål, kålrot, förmargkål, förraps, gulrot, pastinakk, knollselleri, løk	Kveke og annet grasu-gras	2 x 75 mL	Kveka har 3-5 blad Ugraset 2-4 blad Evt. På gjenvekst 2-4 uker sei-nere

¹ Noe vekstreduksjon er påvist i enkelte potetsorter under visse forhold. Bl.a. Redstar. Klorose kan forekomme i potet. Ingen påvirkning på spirevne eller andre kvaliteter

Maksimal dose pr. Vekstseson: 150 mL/daa.

Maksimalt antall behandlinger pr. år: Inntil 2 i angitte kulturer ovenfor.

RESISTENS

Agil® 100 EC tilhører den kjemiske gruppen ACCase-hemmere, HRAC gruppe A. Resistens mot Agil® 100 EC er ikke kjent hos ugrasarter i Norge, men er kjent bl.a. hos floghavre i utlandet. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet for å forebygge resistensutvikling. Agil® 100 EC er resistensbryter til glyfosat ved knereverumpe- og kvekebekjemping og ALS-hemmere ved bekjemping av knereverumpe.

RENGJØRING AV SPRØYTA

Agil® 100 EC kan frigjøre gamle preparatresten i dårlig rengjort sprøyte. For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør sprøyteutstyret rengjøres med et anbefalt rengjøringsmiddel (All Clear Extra!) før og etter sprøyting

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE, BLANDBARHET

Fyll tanken 3/4 med vann. Tilsett Agil® 100 EC under god omrøring. Agil® 100 EC kan blandes med pyretroider. Blanding med tørråtemidler eller andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi redusert ugrasvirkning samtidig som kulturplantene kan ta skade. Det bør være et intervall mellom ugrassprøyting med andre midler på minst 1 uke (før eller etter bruk av Agil® 100 EC). Kortere avstand kan gi skade på kulturveksten.

JORDARBEIDING

Det bør gå minst 1 uke mellom sprøyting med Agil® 100 EC og jordarbeiding.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 12 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Agil® 100 EC lagres ihht. gjeldende regelverk og frostfritt

MERK

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på preparatets virkning. For eksempel vær- og jordforhold, sortsforskjeller, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre preparater, forekomst av resistente ugrasplanter, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt uheldige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i preparatets virkning eller at det kan bli skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Registrert varemerke

Agil®: ADAMA Quena N.V.

¹ All Clear Extra er et produkt fra DuPont de Nemours



AGIL[®] 100 EC

© ADAMA Quena N.V.



UGRASMIDDEL

Emulsjonskonsentrat (EC)



Sammensetning

● Propakvizafof	100 g/L
● Sprede- og emulgeringsmidler	500 g/L
● Fyllstoffer	400 g/L



Bruksområde

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp.



Informasjon

Registreringsnummer: 2016.5 Afgiftsklasse: 2

Innehaver av godkjenning:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederland

www.adama.com

Importør:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S, Danmark

Tel. +45 32 87 11 00

Tilvirker:

ADAMA Agan Ltd

Northern Industrial Zone

Ashdod, 77102

Israel

Holdbarhet: minimum 2 år fra produksjonsdatoen



Skann etter informasjon



UN3082

UFI: QWVN-C2AA-100M-SNEF



8 718077 001838



NORWAY

GRUPPE 1

UGRASMIDDEL

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Farlig ved innånding.

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares innelåst.

Unngå innånding av aerosoler.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Inneholder propakvizafof. Kan gi en allergisk reaksjon

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering)

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



FARE



ADAMA

L11179930CFR_01


12 × 1 L



AGIL[®] 100 EC



ADAMA



NORWAY



FARE



UN3082

L111793PAAR_01

48 x 12 L