

INFORMACIONES GENERALES: Es un herbicida no selectivo para el control post-emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Su acción es sistemática, se absorbe por las hojas y los tallos tiernos de las malezas trasladado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos en un periodo de 4 a 7 días luego de la aplicación ocasionando la muerte total de las malezas emergidas al no dejar residuos en el suelo se puede realizar cualquier tipo de siembra una vez que el producto haya actuado sobre las malezas

MODO DE DOSIS DE APLICACION.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Citricos o citrus	-Altamisa (<i>Ambrosia tenuifolia</i>) -Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>) -Amor seco (<i>Saetilla</i>) -Cien nudos, Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>) - Enredadera anual (<i>Polygonum aviculare</i>) -Nabón (<i>Raphanus sativus</i>)	2.0 - 2.5 kg/ha	Gramineas perennes poco desarrolladas. Con maleza en activo crecimiento, sin sufrir estrés. Se puede hacer una aplicación complementaria con un residual para evitar el nacimiento de malezas provenientes de semilla.
Girasol Maiz Trigo	-Albahaca silvestre (<i>Galinsoga parviflora</i>) -Camalote (<i>Panicum elephantipes</i>) -Cebollín (<i>Cyperus rotundus</i>) -Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>)	3.2 - 3.5 kg/ha	Gramineas perennes desarrolladas. Aplicar cuando comienza el crecimiento activo.
Pasturas	-Albahaca silvestre (<i>Galinsoga parviflora</i>) - Camalote (<i>Panicum elephantipes</i>) -Cebollín (<i>Cyperus rotundus</i>) -Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) - Chufa salvaje (<i>Cyperus esculentus var. Leptostachyus</i>)	2.0 - 2.5 kg/ha	Gramineas perennes poco desarrolladas. Aplicar cuando las malezas tengan 20 a 30 cm de altura, y no sufran estrés.
Soja RG/RR	-Abrojo grande (<i>Xanthium cavanillesii</i>) -Capín (<i>Echinochloa colona</i>) -Capin arroz (<i>Echinochloa crus-galli</i>) – Chamico (<i>Datura ferox</i>)	1.25 kg/ha	Gramineas anuales menores que 4 macollos y hojas anchas con menos de 12 hojas.
		3.2 - 3.5 kg/ha	Gramineas perennes desarrolladas

MODO DE APLICACIÓN: Llenar con agua limpia el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear. Finalmente completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.

EPOCAS DE APLICACIÓN: se aplica en post-emergencia de malezas en activo crecimiento y con suficiente area foliar de exposición al herbicida.

FITOTOXICIDAD: en las condiciones recomendadas al producto no causa fitotoxicidad.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas luego de la aplicación.

PERIODO DE CARENIA: intervalo de seguridad para el cultivo indicado:

Citricos: 30 días. Arroz: / Soja/ Maíz/Trigo: no determinado, debido a la modalidad de empleo, planificado directo y germinación de semillas.

INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, con excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina. Realizar siempre pruebas de compatibilidad física para mezclas con concentrados emulsionables.

