



Gimondo Sebastián Anibal  
DISEÑADOR GRAFICO  
(5411) 46249009 / 15.35068494  
gimondodisen@hotmail.com.ar

producto: Secafol(PY)\_Eti Fte  
fecha:24-4-20

■ PANTONE BLK  
■ PANTONE YELLOW C  
■ PANTONE 368 C

183 mm

ADAMA  
ESSENTIALS

Secafol®

Concentrado Soluble (SL)

Grupo Químico: Bupiridilo

Paraquat: 1,1'-dimetil-4,4'-ion de bupiridilo. . . . . 20%p/v\*  
Coadyuvantes e inherentes c.s.p . . . . . 80%p/v\*  
Equivalente a 27,6 % de sal de dicloruro de Paraquat



HERBICIDA

Herbicida no selectivo, desecante, de post-emergencia, las malezas en viñedos, frutales, cultivos extensivos, plantas ornamentales, hortalizas y cultivos tropicales y subtropicales.

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Reg. Prod. N° 4171

Certificado L.V. N°: 4075

- Producto de uso agrícola
- PRODUCTO NO INFLAMABLE - CORROSIVO A METALES - NO EXPLOSIVO

REGISTRADO POR: ADAMA PARAGUAY S.R.L.:

15 de Agosto n° 1017 e/ Manduvira y Jajui, Asunción - Paraguay.  
Registro A.4-SENAVE-82: A.7-SENAVE-82.

FABRICADO POR: ADAMA LTD.:

No.93 Beijing East Road Jingzhou City, Hubei Province, China.  
Tel: +86-0716-8314802. Origen: China



IMPORTADO Y COMERCIALIZADO :

ADAMA Agriculture Paraguay S.A. Julián de la Herrera, Edif. Loft 21, Paraná Country C. Alto Paraná-Paraguay Tel: 0984-362351. Reg. Senave: A.4 / A.5 / A.7 - N° Senave:1810

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR. **Medidas precautorias:** EN LA PREPARACIÓN Y LA APLICACIÓN: Use ropa protectora adecuada durante la manipulación, ropa con mangas largas, delantal impermeable, botas y guantes impermeables, antiparras y mascarar con filtro adecuado. Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca. Evite comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación del producto. Después de la aplicación, lave cuidadosamente las ropas y partes del cuerpo expuestas al producto **Primeros auxilios:** Solicite atención médica mientras logra: Retirar al paciente del área contaminada. Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llevarlo a un lugar donde respire aire fresco y limpio. Si el producto fue ingerido: Y la persona está consciente déle a beber de 1 a 2 vasos de agua tibia e induzca al vómito. Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica. **Informaciones para el medico:** No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado en dosis de 0.5 a 1.0 g/Kg de peso disuelto en medio vaso de agua. Administre un catártico. **Antídoto:** Ninguno específico - Tratamiento sintomático. **Síntoma de intoxicación:** Algunos efectos por sobre exposición que se pueden presentar son los siguientes: mareos y náuseas, convulsiones, temblores, incremento en la sensibilidad del tacto y de los oídos, dificultad para respirar, dificultad para caminar. El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel. **Consultas en caso de intoxicaciones:** Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mongelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.



Lote N°: ver envase - Fecha de Fabricación: ver envase  
Fecha de vencimiento: ver envase

Contenido Neto: **20 Litros**



NOCIVO



183 mm