



# ExpertGrow

Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.

<b>Tipo de producto:</b>	Bioestimulante foliar
<b>Formulación:</b>	Líquido
<b>Ingrediente activo:</b>	Algas marinas fermentadas 25% + Potasio (K <sub>2</sub> O) 3.5%
<b>Cultivos:</b>	Ver cuadro de recomendaciones de uso
<b>Presentación:</b>	1 litro.
<b>Formulador:</b>	<b>Adama Chile S.A.</b> Camino Catemito 2800 Calera de Tango Santiago, Chile

## Descripción

ExpertGrow es un bioestimulante natural de tercera generación cuya base de formulación son extractos de algas marinas *Ascophyllum nodosum*, reconocidas por su gran calidad en el aporte de elementos bioactivos. Todos sus componentes minerales son quelatados y acomplejados orgánicamente, lo que ayuda a mantener un metabolismo balanceado.

## Precauciones de uso

Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacene junto con comidas o semillas, o cualquier otro producto de consumo animal o humano. Mantenga la etiqueta visible. Almacene entre 5 °C y 43 °C. Almacene en el recipiente original en un área temperada, bien ventilada.

## Instrucciones de uso y aplicación

Agítese bien antes de abrir. Aplicar las dosis recomendadas en etiqueta. En un tanque con agua hasta la mitad de su capacidad, añada el producto. Para mejores resultados, el producto se aplica o muy temprano o muy tarde en el día.

## Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis (l/ha)	Dosis (cc/200 l)	Momento de Aplicación
Uva de mesa		500 - 600	1° En brote de 40 a 50 cm de largo. 2° Pre-floración (Inflorescencia tipo piña) 3° Baya de hasta 10 mm. En aplicaciones dirigidas y asperjadas.
Arroz	0.75 - 1.0		Al inicio del macollamiento y al inicio del espigado.
Manzano, Peral	1.0 - 1.5		En caída de pétalos (repetir 7 y 14 días después).
Cítricos, Palto, Mango		500 - 600	1° En brote o yema verde. 2° Botón floral. 3° Después de caída fisiológica. 4° Inicio de formación de fruto.

## ADAMA



Arándano, Frutilla, Frambuesa		600 – 700	1° En floración 2° Inicio de cuajado 3° Fructificación Distanciado cada 10 días.
Papa y otros tubérculos		500 - 700	1° Brotamiento 2° Floración 3° Inicio de la tuberización
Tomate, Pepino, Pimentón, Berenjenas	1.0 - 1.5		1° Antes de floración. 2° Inicio de formación de fruto. 3° Inicio cambio de color
Maíz		500 – 600	1° 6 a 8 hojas. 2° Formación de espiga.

Elaborado por:  
Área de Asuntos Regulatorios ADAMA

Fecha de actualización:  
23 Julio 2020

FICHA TÉCNICA

**ADAMA**

ADAMA Agriculture Perú S.A. Av. El Derby 254, of 503 Urb. El Derby de Monterrico. Santiago de Surco. Lima. Perú  
Teléfono + (511) 6410000 | [www.adama.com](http://www.adama.com)