

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR  
EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- No provoque el vómito. Lave la boca de la víctima con agua en abundancia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

#### TELÉFONO EMERGENCIA:

SAMU 106

#### TELÉFONO DEL TITULAR:

AGROBIO PERU SAC (+51-01) 578-4082

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ATENA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

*Bacillus subtilis*, CNPSO 2720 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus velezensis*, CNPSO 3602 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus pumilus*, CNPSO 3203 ..... 33.3 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. Nº 0193 - SENASA-PBA-ACBIM

#### TITULAR DEL REGISTRO:



AGROBIO PERU SAC

RUC: 20606336196

Dirección: Jr. Tarma 119 Cercado de Lima, Dpto 402.

Lima, Peru, Teléfono: (+51-1) 578-4082

#### FORMULADOR:



TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

CNPJ: 07.483.401/0001-99 - I.E: 90361453-63

Rua Emílio Romani, Nº 1190 - CIC - Curitiba - PR - Brasil

CEP: 81460-020 - Tel: +55 (41) 3099-7300

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:



ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.

Av. El Derby No. 254 Oficina 306.

Santiago de Surco, Lima, Peru - Teléfono (01) 641-0000

## CONTENIDO: 1L

LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA:

VER IMPRESIÓN SOBRE EL ENVASE.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** ATENA es un Fungicida biológico, formulado a partir de tres especies de *Bacillus* sp. Estos microorganismos producen compuestos antifúngicos que inhiben el crecimiento micelial y la producción de micotoxinas de varios hongos, generando la muerte del patógeno.

**MODO DE APLICACIÓN:** Aplicación por aspersión foliar: Disolver la cantidad necesaria de ATENA con la cantidad suficiente de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda lograr una buena cobertura foliar.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | Plaga                                                     | Dosis<br>L/ha | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Arándano  | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 – 2.0     | n.a          | n.a          |
| Espárrago | Mancha del peral<br>( <i>Stemphylium vesicarium</i> )     | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Mango     | Oidiois<br>( <i>Oidium mangiferae</i> )                   | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Vid       | Oidiois<br>( <i>Erysiphe necator</i> )                    | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Palto     | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 – 2.0     | n.a          | n.a          |
| Vid       | Pudrición ácida<br>( <i>Acetobacter acetii</i> )          | 2.5 – 3.0     | n.a          | n.a          |
| Pimiento  | Oidium<br>( <i>Phyllactinia taurica</i> )                 | 2.0 – 3.0     | n.a          | n.a          |

PC: Periodo de Carenzia; LMR: Límite Máximo de Residuos; n.a: no aplica.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ATENA se puede aplicar en todas las etapas fenológicas del cultivo hasta la cosecha, con un intervalo de 5 a 10 días entre aplicaciones, según la presión de la enfermedad. Se recomienda aplicar la dosis mínima en condiciones favorables o ante los primeros síntomas, y la máxima cuando la presión de la enfermedad sea alta.

**Pimiento:** Para el control de la plaga, realizar dos (2) aplicaciones consecutivas, con un intervalo de 7 días entre cada aplicación. De ser necesario, podrán efectuarse tratamientos adicionales en función de la presión de la plaga y las condiciones del cultivo, respetando un intervalo mínimo de 7 días entre tratamientos.

**PERIODO DE REINGRESO:** El periodo de reingreso es de mínimo 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar junto con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:** No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR  
EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- No provoque el vómito. Lave la boca de la víctima con agua en abundancia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

#### TELÉFONO EMERGENCIA:

SAMU 106

#### TELÉFONO DEL TITULAR:

AGROBIO PERU SAC (+51-01) 578-0082

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ATENA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

*Bacillus subtilis*, CNPSO 2720 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus velezensis*, CNPSO 3602 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus pumilus*, CNPSO 3203 ..... 33.3 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. Nº 0193 - SENASA-PBA-ACBIM

#### TITULAR DEL REGISTRO:



AGROBIO PERU SAC

RUC: 20606336196

Dirección: Jr. Tarma 119 Cercado de Lima, Dpto 402.

Lima, Peru, Teléfono: (+51-1) 578-4082

#### FORMULADOR:



TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

CNPJ: 07.483.401/0001-99 - I.E: 90361453-63

Rua Emílio Romani, Nº 1190 - CIC - Curitiba - PR - Brasil

CEP: 81460-020 - Tel: +55 (41) 3099-7300

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:



ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.

Av. El Derby No. 254 Oficina 306.

Santiago de Surco, Lima, Peru - Teléfono (01) 641-0000

## CONTENIDO: 5L

LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA:

VER IMPRESIÓN SOBRE EL ENVASE.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** ATENA es un Fungicida biológico, formulado a partir de tres especies de *Bacillus* sp. Estos microorganismos producen compuestos antifúngicos que inhiben el crecimiento micelial y la producción de micotoxinas de varios hongos, generando la muerte del patógeno.

**MODO DE APLICACIÓN:** Aplicación por aspersión foliar: Disolver la cantidad necesaria de ATENA con la cantidad suficiente de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda lograr una buena cobertura foliar.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | Plaga                                                     | Dosis<br>L/ha | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Arándano  | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 - 2.0     | n.a          | n.a          |
| Espárrago | Mancha del peral<br>( <i>Stemphylium vesicarium</i> )     | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Mango     | Oidiois<br>( <i>Oidium mangiferae</i> )                   | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Vid       | Oidiois<br>( <i>Erysiphe necator</i> )                    | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Palto     | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 - 2.0     | n.a          | n.a          |
| Vid       | Pudrición ácida<br>( <i>Acetobacter aceti</i> )           | 2.5 - 3.0     | n.a          | n.a          |
| Pimiento  | Oidium<br>( <i>Phyllactinia taurica</i> )                 | 2.0 - 3.0     | n.a          | n.a          |

PC: Periodo de Carenzia; LMR: Límite Máximo de Residuos; n.a: no aplica.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ATENA se puede aplicar en todas las etapas fenológicas del cultivo hasta la cosecha, con un intervalo de 5 a 10 días entre aplicaciones, según la presión de la enfermedad. Se recomienda aplicar la dosis mínima en condiciones favorables o ante los primeros síntomas, y la máxima cuando la presión de la enfermedad sea alta.

**Pimiento:** Para el control de la plaga, realizar dos (2) aplicaciones consecutivas, con un intervalo de 7 días entre cada aplicación. De ser necesario, podrán efectuarse tratamientos adicionales en función de la presión de la plaga y las condiciones del cultivo, respetando un intervalo mínimo de 7 días entre tratamientos.

**PERIODO DE REINGRESO:** El periodo de reingreso es de mínimo 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar junto con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:** No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR  
EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- No provoque el vómito. Lave la boca de la víctima con agua en abundancia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

#### TELÉFONO EMERGENCIA:

SAMU 106

#### TELÉFONO DEL TITULAR:

AGROBIO PERU SAC (+51-01) 578-0082

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ATENA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

*Bacillus subtilis*, CNPSO 2720 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus velezensis*, CNPSO 3602 ..... 33.3 g/L  
*Bacillus pumilus*, CNPSO 3203 ..... 33.3 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. Nº 0193 - SENASA-PBA-ACBM

#### TITULAR DEL REGISTRO:



AGROBIO PERU SAC

RUC: 20606336196

Dirección: Jr. Tarma 119 Cercado de Lima, Dpto 402.

Lima, Peru, Teléfono: (+51-1) 578-4082

#### FORMULADOR:



TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

CNPJ: 07.483.401/0001-99 - I.E: 90361453-63

Rua Emílio Romani, Nº 1190 - CIC - Curitiba - PR - Brasil

CEP: 81460-020 - Tel: +55 (41) 3099-7300

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:



Una marca de AGROMA

ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.

Av. El Derby No. 254 Oficina 306.

Santiago de Surco, Lima, Peru - Teléfono (01) 641-0000

## CONTENIDO: 20L

LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA:

VER IMPRESIÓN SOBRE EL ENVASE.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** ATENA es un Fungicida biológico, formulado a partir de tres especies de *Bacillus* spp. Estos microorganismos producen compuestos antifúngicos que inhiben el crecimiento micelial y la producción de micotoxinas de varios hongos, generando la muerte del patógeno.

**MODO DE APLICACIÓN:** Aplicación por aspersión foliar: Disolver la cantidad necesaria de ATENA con la cantidad suficiente de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda lograr una buena cobertura foliar.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo   | Plaga                                                     | Dosis<br>L/ha | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Arándano  | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 – 2.0     | n.a          | n.a          |
| Espárrago | Mancha del peral<br>( <i>Stemphylium vesicarium</i> )     | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Mango     | Oidio<br>( <i>Oidium mangiferae</i> )                     | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Vid       | Oidio<br>( <i>Erysiphe necator</i> )                      | 2.0           | n.a          | n.a          |
| Palto     | Podredumbre gris/Moho gris<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 1.5 – 2.0     | n.a          | n.a          |
| Vid       | Pudrición ácida<br>( <i>Acetobacter aceti</i> )           | 2.5 – 3.0     | n.a          | n.a          |
| Pimiento  | Oidium<br>( <i>Phyllactinia taurica</i> )                 | 2.0 – 3.0     | n.a          | n.a          |

EN080510/02/29/PE-3

PC: Periodo de Carenzia; LMR: Límite Máximo de Residuos; n.a: no aplica.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ATENA se puede aplicar en todas las etapas fenológicas del cultivo hasta la cosecha, con un intervalo de 5 a 10 días entre aplicaciones, según la presión de la enfermedad. Se recomienda aplicar la dosis mínima en condiciones favorables o ante los primeros síntomas, y la máxima cuando la presión de la enfermedad sea alta.

**Pimiento:** Para el control de la plaga, realizar dos (2) aplicaciones consecutivas, con un intervalo de 7 días entre cada aplicación. De ser necesario, podrán efectuarse tratamientos adicionales en función de la presión de la plaga y las condiciones del cultivo, respetando un intervalo mínimo de 7 días entre tratamientos.

**PERIODO DE REINGRESO:** El periodo de reingreso es de mínimo 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar junto con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:** No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

