



Versión: 01
Fecha de emisión: 21 diciembre 2020

PHYCOFIX FORTE™

Complejo bioestimulante líquido de *Ecklonia maxima* y polipéptidos de cadena larga de L-aminoácidos enzimáticamente hidrolizados

Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Tipo de producto:	Bioestimulante foliar
Formulación:	Suspensión
Ingrediente activo y concentración:	Ver ítem de composición
Presentaciones:	1 litro
Formulador:	SINERIA Holland BV Randwycksingel 20-A015 6229 EE Maastricht, The Netherlands PHYCOFIX FORTE™ es una Marca comercial de Sineria Holland BV

Descripción:

PHYCOFIX FORTE™ es un bioestimulante natural a base de aminoácidos libres y algas marinas (*Ecklonia máxima*) de fácil absorción y alta disponibilidad para la planta.

PHYCOFIX FORTE™ está específicamente diseñado para promover el crecimiento de la planta y mejorar su capacidad de recuperación del estrés ocasionado por factores bióticos y/o abióticos.

PHYCOFIX FORTE™ no contiene cloro y es seguro de usar en todos los cultivos, incluidas plántulas en desarrollo.

Recomendaciones de uso:

Aplicaciones foliares:

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN:
	L/Cil	L/ha	
Arándanos	1 - 2	2 - 4	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo. Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.
Fresa	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.
Cebolla, ajo, zanahoria	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.
Papa, camote	0.5 - 1 0.5 - 1	1 - 2 1 - 2	Aplicar al 80% de emergencia de plantas. Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.
Zapallo, melón, sandía, pepinillo	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.
Maíz	1 - 2	1 - 2	Aplicar de 2 a 3 semanas después de la emergencia y repetir 15 días después.
Vid	0.5 - 1	1 - 3 3 - 5 3 - 5	Aplicar con brotes de 2 a 5 cm de longitud. Repetir 15 días después. Aplicar en bayas de 5 mm.
Hortalizas en general	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby N° 254 Of 306. Edificio "Lima central Tower". Urb. El Derby. Santiago de Surco. Lima - Perú

Teléfono + (511) 641-0000 | www.adama.com



Frijol, arveja	1 - 3 1.5 - 2	1 - 3 3 - 4	Aplicar de 2 a 3 semanas después de la emergencia. Repetir 15 días después.
Piña	0.5 - 1	1 - 3	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo. Repetir 15 días después.
Manzana, durazno	1 - 1.5	3 - 5	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo. Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.
Pimientos, tomates	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.
Caña de azúcar	0.5 - 1	3 - 5	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo. Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.
Banano, palto, mango, cítricos	0.5 - 1	3 - 5	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo. Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.
Arroz	1 - 1.5	1 - 3	Aplicar 15 días después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces desde macollamiento hasta llenado de grano.

Aplicaciones a través del sistema de riego:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
En general	5 - 10	Aplicar desde el inicio del crecimiento vegetativo. Utilizar la dosis menor en plantas jóvenes y la dosis alta para plantas maduras o etapas de mayor estrés. Repetir cada 15 días

Aplicaciones al drench y bandejas de siembra:

CULTIVO	DOSIS (L/cil)	RECOMENDACIONES
Todos los cultivos	4	Para plántines o bandejas de siembra, sumergirlas en la solución entre 5 a 10 minutos antes del trasplante. En plántones (árboles jóvenes) adicionar de 1 a 5 L de la solución en los hoyos de trasplante antes de plantar. A la dosis de 2-4% (2 – 4 litros/ 100 litros de agua)

Para resultados óptimos, **PHYCOFIX FORTE™** debe ser usado como parte de un programa balanceado de nutrición.

Composición:

Complejo de aminoácidos..... 80 % (P/V)
Ecklonia maxima 20 % (P/V)

Recomendaciones:

- Evite realizar aplicaciones cuando la temperatura sea muy alta o cuando la planta se encuentre bajo estrés hídrico.
- Realizar las aplicaciones con equipos limpios. Igualmente, limpie el pulverizador después de su uso.
- El producto puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre.



Versión: 01
Fecha de emisión: 21 diciembre 2020

Compatibilidad:

PHYCOFIX FORTE™ es compatible con la mayoría de los plaguicidas y nutrientes foliares de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de continuar.

PHYCOFIX FORTE™ no es compatible con fungicidas a base de cobre y productos altamente alcalinos. Lea siempre la etiqueta de **PHYCOFIX FORTE™** y del producto asociado antes de realizar la mezcla.

Precauciones de uso:

- El producto es nocivo por ingestión. Si esto sucede póngase en contacto con un médico de inmediato y muéstrela esta etiqueta. **NOTA PARA EL MÉDICO:** Tratar sintomáticamente.
- Puede causar irritación ocular. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, lávese inmediatamente con abundante agua limpia por no menos de 15 minutos y busque atención médica de ser necesario.
- Puede causar irritación dermal. Si el contacto sucede, lávese con abundante agua limpia y jabón. Si la irritación persiste busque recomendación médica.
- Debido a que este tipo de productos normalmente se mezclan con plaguicidas de diferentes perfiles toxicológicos, se recomienda tomar las medidas necesarias que permitan su uso y manipulación de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas.

Almacenamiento:

Conservar en su empaque original lejos del calor o de la luz solar directa, en ambientes secos con buena aireación. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos para animales. No coma, beba ni fume durante su uso o manipulación.

Elaborado por:
Área de Asuntos Regulatorios ADAMA

Fecha de actualización:
21 Diciembre 2020

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby N° 254 Of 306. Edificio "Lima central Tower". Urb. El Derby. Santiago de Surco. Lima - Perú

Teléfono + (511) 641-0000 | www.adama.com