

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- No provoque el vómito. Lave la boca de la víctima con agua en abundancia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

TELÉFONO EMERGENCIA:

SAMU 106

TELÉFONO DEL TITULAR:

AGROBIO PERU SAC (+51-01) 578-4082

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ATENA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

<i>Bacillus subtilis</i> , CNPSO 2720	33.3 g/L
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , CNPSO 3602	33.3 g/L
<i>Bacillus pumilus</i> , CNPSO 3203	33.3 g/L
Aditivos	c.s.p 1L

Reg. N° 0193 - SENASA-PBA-ACBM

TITULAR DEL REGISTRO:



AGROBIO PERU SAC

RUC: 20606336196

Dirección: Jr. Tarma 119 Cercado de Lima, Dpto 402, Lima, Peru

Teléfono: (+51-1) 578-4082

FORMULADOR:



TOTAL BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 07.483.401/0001-99 - I.E: 90361453-63

Rua Emilio Romani, N° 1190 - CIC - Curitiba - PR - Brasil

CEP: 81460-020 - Tel: +55 (41) 3099-7300

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:



ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.

Av. El Derby No. 254 Oficina 306.

Santiago de Surco, Lima, Peru - Teléfono (01) 641-0000

CONTENIDO: 1L

LOTE, FECHA DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA: VER IMPRESIÓN SOBRE EL ENVASE.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES DE USO Y MANEJO

ATENA es un fungicida biológico, formulado a partir de tres especies de *Bacillus* spp. Estos microorganismos producen compuestos antifúngicos que inhiben el crecimiento micelial y la producción de micotoxinas de varios hongos, generando la muerte del patógeno.

MODO DE APLICACIÓN:

- Aplicación por aspersión foliar. Disolver la cantidad necesaria de **ATENA** con la cantidad suficiente de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea.
- Se recomienda lograr una buena cobertura foliar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	PC (Días)	LMR (ppm)
Arándano	Podredumbre gris/Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 - 2.0	n.a	n.a
Espárrago	Mancha del peral (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	2.0	n.a	n.a
Mango	Oidio (<i>Oidium mangiferae</i>)	2.0	n.a	n.a
Vid	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	2.0	n.a	n.a
Palto	Podredumbre gris/Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 - 2.0	n.a	n.a
Vid	Pudrición ácida (<i>Acetobacter aceti</i>)	2.5 - 3.0	n.a	n.a

PC: Periodo de Carenza; LMR: Límite Máximo de Residuos; n.a: no aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

ATENA se puede aplicar en todas las etapas fenológicas del cultivo hasta la cosecha, con un intervalo de 5 a 10 días entre aplicaciones, según la presión de la enfermedad. Se recomienda aplicar cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo del patógeno o durante los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso es de mínimo 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar junto con otros productos.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

