



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

ExelGrow®

Versión: 3

Fecha de actualización: 09/01/2026

Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Tipo de producto:	Bioestimulante foliar
Formulación:	Líquido soluble
Composición:	Extracto de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> 35% + Potasio (K ₂ O) 4.0% p/v + Carbono orgánico 11% p/v + Potasio (K ₂ O) 4.0% p/v + Manitol 0.41% p/v + Fucoidano 6.06% + Alginato 35%
Clasificación por peligrosidad:	No aplica
Presentaciones:	1 L y 15 L
Formulador:	ADAMA Chile S.A. Camino Catemito 2800 Calera de Tango Santiago. Chile

Descripción:

EXELGROW® es un producto 100% natural cuya base de formulación son extractos de algas marinas *Ascophyllum nodosum*, reconocidas por su gran calidad en el aporte de elementos bioactivos que son utilizadas como materia prima en un proceso de fermentación desarrollado por ADAMA y que permite potenciar el crecimiento de frutos y brotes aumentando el rendimiento. Además todos sus componentes minerales son complejados orgánicamente lo que ayuda a mantener un metabolismo balanceado. EXELGROW® es un bioestimulante capaz de promover el metabolismo de las plantas haciéndolas más fuertes, mejorando su capacidad fotosintética e impactando en el metabolismo del nitrógeno.

Precauciones de uso:

Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacene junto con comidas o semillas, o cualquier otro producto de consumo animal o humano. Mantenga la etiqueta visible. Almacene entre 5 °C y 43 °C. Almacene en el recipiente original en un área temperada, bien ventilada.

Instrucciones de uso y aplicación:

Exel Grow® es compatible con la mayoría de los fertilizantes y bioestimulantes comunes del mercado. Para una mejor preparación de la mezcla agitar bien el envase antes de abrir, vaciar el producto en un recipiente para realizar una pre-dilución, por cada litro de producto se requieren al menos 10 litros de agua, para prediluirlo, el recipiente debe estar completamente limpio antes de vaciar el producto, revolver durante 5 minutos, asegurándose de que el producto ha sido completamente disuelto. Llenar el tanque aplicador hasta la mitad, asegúrese de que el pH no sea superior a 7.0 luego de esto vaciar el producto diluido en el tanque aplicador el cual debe estar siempre con su agitador funcionando. Se recomienda realizar una prueba antes de aplicar en mezcla con productos azufrados. **Exel Grow®** puede ser aplicado vía aérea o terrestre.

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

ExelGrow®

Versión: 3

Fecha de actualización: 09/01/2026

Parámetros fisicoquímicos

Solubilidad en agua a 20°C: 100%

Densidad a 20°C: 1150 g/L

pH al 0.1%: 7.5

pH a 20°C 10%: 5.4

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	(L/200L)	(L/ ha)	
Uva de mesa	-	1.0 – 1.5	1° En brote de 40 a 50 cm de largo. 2° Pre-floración (inflorescencia tipo piña) 3° Baya de hasta 10 mm Aplicar en aspersión dirigida
Arroz	0.5 – 1.0	-	Al inicio del macollamiento y al inicio del espigado
Manzano, Peral, Durazno, Melocotón	-	1.0 – 1.5	En caída de pétalos (repetir 7 y 14 días después)
Cítricos, Palto, Mango	-	1.0 – 1.5	1° En brote o yema verde 2° Botón floral 3° Después de caída fisiológica 4° Inicio de formación del fruto
Arándano, Fresa, Frambuesa	-	1.0 – 1.5	1° En floración 2° Inicio de cuajado 3° Fructificación Aplicaciones Distanciadas cada 10 días
Papa y otros tubérculos	0.5 – 1.0	-	1° Brotamiento 2° Floración 3° Inicio de la tuberización
Tomate, Pepino, Pimentón, Páprika, Aji	0.5 – 1.0	-	1° Antes de floración 2° Inicio de formación de fruto 3° Inicio del cambio de color
Maiz	0.5 – 1.0	-	1° Cuando tenga 6 a 8 hojas verdaderas 2° En formación de espiga
Ajo, Cebolla	0.5 – 1.0	-	1° Brotamiento 2° Inicio de bulbificación 3° Crecimiento de bulbo
Piña	-	1.0 – 1.5	1° Antes de floración 2° Inicio de cuajado
Cacao, Café	-	1.0 – 1.5	1° Inicio de floración

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos

ExelGrow®

Versión: 3

Fecha de actualización: 09/01/2026

Quinoa	0.5 – 1.0	-	1° Brotamiento 2° Crecimiento vegetativo 3° Floración
Caña de azúcar	-	0.5	1. Aplicación en el surco de siembra 2. Aplicación en el corte de la soca 3. Aplicación vía foliar cuando la planta alcance 60 cm de altura
	0.2	-	Aplicación en plántula prebrotada 14 días antes del trasplante, 7 días antes del trasplante y el día del trasplante
Banano	-	1 – 1.5	4 aplicaciones vía foliar a partir de la oración con intervalos de 7 días entre aplicaciones
Melón, Pepino, Sandía, Calabacita, Calabaza	0.5	-	3 aplicaciones vía foliar durante el desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo, con intervalo de 15 días entre aplicaciones
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor.	0.5 - 1	-	Realizar 3 aplicaciones vía foliar durante el desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo, con intervalo de 15 días entre aplicaciones
Leguminosas	0.5 - 1	-	Realizar 3 aplicaciones vía foliar durante el desarrollo vegetativo y reproductivo, del cultivo con intervalos de 15 días

Nota: La información aquí proporcionada es referencial y válida a la fecha de emisión de este documento.

Fin del documento