



## FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

[ADAMA.COM/PERU/ES](http://ADAMA.COM/PERU/ES)

# TIMOREX<sup>PRO</sup>



Versión: 01

Fecha de emisión: 01/12/2025

Reg. N° 0434-SENASA-PBUA-EV

Titular del Registro: STOCKTON PERU S.A.C.

### 1. GENERALIDADES:

- |    |                     |   |                                                                  |
|----|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| a) | Nombre comercial    | : | <b>TIMOREX PRO</b>                                               |
| b) | Ingrediente activo  | : | Aceite de árbol de té                                            |
| c) | Clase de uso        | : | Fungicida agrícola                                               |
| d) | Formulación         | : | Concentrado Emulsionable                                         |
| e) | Composición química | : | Aceite de Melaleuca alternifolia 223.0 g/L<br>Aditivos c.s.p 1 L |

### 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

- |    |                        |   |                                                                                                                      |
|----|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Aspecto                | : | Líquido                                                                                                              |
| b) | Color                  | : | Amarillo                                                                                                             |
| c) | Olor                   | : | Característico                                                                                                       |
| d) | Estabilidad en almacén | : | Estable durante 2 años                                                                                               |
| e) | Inflamabilidad         | : | No inflamable                                                                                                        |
| f) | Corrosividad           | : | No corrosivo                                                                                                         |
| g) | Explosividad           | : | No explosivo                                                                                                         |
| h) | Compatibilidad         | : | No se conocen restricciones, antes de utilizar en mezcla con otros productos, realizar una prueba de compatibilidad. |
| i) | pH                     | : | 6 (5 – 8) a 20°C                                                                                                     |
| j) | Densidad               | : | 0.916 g/ml a 20°C                                                                                                    |

### 3. TOXICOLOGÍA:

- |    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) | Categoría toxicológica              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ligeramente toxico |
| b) | Antídoto en caso de Intoxicaciones: | No hay un antídoto específico. El tratamiento será sintomático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| c) | Precauciones para su uso:           | No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en un lugar fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacenar en casa habitada. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Evite su |                    |

**Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos**

# TIMOREX<sup>®</sup> PRO

Versión: 01

Fecha de emisión: 01/12/2025



Una marca de innovación, el contacto con la piel y los ojos. No re envasar el contenido en otros envases. Evite la ingestión del producto

4. **MECANISMO DE ACCIÓN:** Es un biofungicida para el control de un amplio espectro de hongos, clasificado en el grupo BM01 según FRAC: extracto de plantas con múltiples modos de acción, entre ellos disrupción de la membrana celular, pared celular, inductor de mecanismos de defensa de las plantas. Actúa en distintos puntos de crecimiento del hongo; sobre la germinación de las esporas e inhibe el crecimiento del tubo germinativo, por esto posee una acción preventiva y control de fases iniciales del patógeno.  
Cuando el hongo logra penetrar la epidermis de la hoja, TIMOREX PRO<sup>®</sup> provoca la disrupción de la membrana celular con la consecuente pérdida del citoplasma del hongo causando la muerte del mismo.
5. **MODO DE ACCIÓN:** TIMOREX PRO tiene una acción de contacto y mesostémica, ya que por su tipo de formulación logra penetrar de manera fácil la epidermis de la hoja logrando acción traslaminar. Se caracteriza por poseer actividad preventiva (por inhibir la germinación de las esporas), curativa (por controlar el crecimiento del micelio impidiendo el desarrollo y la expansión de las lesiones) y supresiva (por eliminar las colonias ya instaladas). Estos efectos se obtienen respetando los intervalos y dosis de aplicación recomendados. TIMOREX<sup>®</sup> PRO es indicado para el Manejo Integrado por su baja agresividad sobre el medio ambiente y enemigos naturales. TIMOREX<sup>®</sup> PRO evita la aparición de resistencia al ser intercalado, en los programas fitosanitarios, con productos de síntesis química.
6. **FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
7. **MODO DE APLICACIÓN:** Esperar que el rocío desaparezca antes de aplicar para evitar escurrimiento con pérdida del producto y no disminuir la concentración de uso. Llenar el tanque con agua limpia hasta la mitad, verter la dosis recomendada de TIMOREX PRO, luego completar el llenado del tanque, siempre con los agitadores en marcha. TIMOREX PRO puede aplicarse con bomba de espalda, equipo motorizado y equipo accionado por tractor. Antes de utilizar el equipo de aspersión revise con cuidado que este en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Aplicar en condiciones climáticas favorables.

## TIMOREX<sup>PRO</sup>

### Sugerencias en mezcla:

Dentro de las sugerencias de mezcla en tanque es importante mantener un pH entre 5.5 y 7, con una temperatura óptima de aplicación por debajo de los 24°C.

### 8. USOS Y DOSIS:

| Cultivo  | Plaga                                                                             |                                       | Dosis<br>ml / 200L | Dosis<br>L / ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre común                                                                      | Nombre científico                     |                    |                 |                |                 |
| Arándano | Moho gris                                                                         | <i>Botrytis cinerea</i>               | 600                | 1.5             | N.A.           | N.A.            |
| Arándano | Oidiosis                                                                          | <i>Microsphaera penicillata</i>       | 400 - 500          | 1.5 - 1.75      | N.A.           | N.A.            |
| Palto    | Antracnosis                                                                       | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | 300 - 400          | 1.5 - 2.0       | N.A.           | N.A.            |
| Palto    | Cladosporium                                                                      | <i>Cladosporium cladosporioides</i>   | 300 - 400          | 1.5 - 1.75      | N.A.           | N.A.            |
| Palto    | Muerte regresiva<br>(aplicación foliar por<br>aspersión)                          | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>       | 400                | 2.0             | N.A.           | N.A.            |
| Palto    | Muerte regresiva<br>(aplicación vía sistema<br>de riego o al cuello de<br>planta) | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>       | 400                | 2.0             | N.A.           | N.A.            |
| Vid      | Moho gris                                                                         | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300 - 400          | 1.5-2.0         | N.A.           | N.A.            |
| Vid      | Oidiosis                                                                          | <i>Erysiphe necator</i>               | 300 - 400          | 1.5-2.0         | N.A.           | N.A.            |

P.C.= Período de carencia en días / L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm / N.A. = No aplica

9. **MOMENTOS DE APLICACIÓN:** TIMOREX PRO puede ser utilizado en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad en la planta. Aplicar durante su desarrollo vegetativo, desde la floración a pre-cosecha. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo entre aplicaciones de 7 a 14 días. Realizar las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde.



## FICHA TÉCNICA

**ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

[ADAMA.COM/PERU/ES](http://ADAMA.COM/PERU/ES)

# TIMOREX<sup>®</sup>PRO



Versión: 01

Fecha de emisión: 01/12/2025

**11. FORMULADOR :** STOCKTON (Israel) Ltd.  
17 Ha' Mefalsim St. Petach Tikva  
P.O.B. 3517, 4951447, ISRAEL



**12. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR:** ADAMA Agriculture Peru S.A.  
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco. Lima -Perú Teléfono: (01) 641 - 0000

**Nota:** La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador.

**Fin del documento**