



FICHA TÉCNICA



ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 04

Fecha de emisión: 30 Marzo 2026

1. GENERALIDADES :

- a) Nombre comercial : **CARBOXY® L**
- b) Clase de uso : Bioestimulante para traslocar azúcares
- c) Formulación : Líquido
- d) Composición química : Ácidos ECCA Carboxy® expresados como:
Carbono Orgánico Oxidable Total.....53.0 g/L
- e) Almacenamiento : No exponer a temperaturas mayores a 80°C
- f) Ambientales : No residual, de muy bajo impacto
- g) Certificado orgánico : No
- h) Clasificación por toxicidad: Ligeramente tóxico

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

- a) Aspecto : Líquido
- b) Color : Café
- c) Olor : Característico
- d) Inflamabilidad : No inflamable
- e) Corrosividad : No corrosivo
- f) pH : 5.5 – 6.5 (25°C)
- g) Densidad : 1.09 – 1.12 g/cm³ (20°C)
- h) Punto de ebullición : 100.1 – 100.5 °C
- i) Solubilidad en agua : Total
- j) Compatibilidad : No mezclar con agentes oxidantes fuertes.
Siempre haga una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

3. MODO DE ACCIÓN :

Provoca una mayor eficiencia en la traslocación de fotosintatos hacia frutos y órganos de almacenamiento.

Los ácidos *ECCA Carboxy® contenidos en Carboxy® L, influyen en los procesos del metabolismo primario que conducen a un incremento en la fijación fotosintética del carbono y a la mayor translocación de carbohidratos de las zonas de donde se producen hacia las zonas en donde se demandan (frutos, tubérculos, tallos y coronas) en la planta, a través de los tejidos de conducción.

- 4. **MODO DE APLICACIÓN:** Carboxy® L está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 04

Fecha de emisión: 30 Marzo 2026



5. USOS Y DOSIS:

CULTIVO		DOSIS/ APLICACIÓN (L/ha)	Época y Número de aplicaciones
FRUTALES	Vid, Palto, Mango, Cítricos, Manzano, Duraznero, Peral	2 – 3	Realizar 2 a 3 aplicaciones: En brotación y maduración de frutos.
	Olivo, Café, Fresa	1 – 2	Realizar 1 a 2 aplicaciones en maduración de frutos
HORTALIZAS	Apio, Lechuga, Col, Tomate, Ají, Ajo, Páprika, Pimiento, Frijol, Espárrago, Melón, Alcachofa, Papa, Pepino, Haba, Sandía, Zapallo, Brócoli, Coliflor, Cebolla, Arveja,	1 – 2	1 a 2 aplicaciones a intervalo quincenal, en la última etapa del cultivo.
OTROS	Trigo, Maíz, Arroz,	1 – 2	1 a 2 aplicaciones, 10 a 15 días antes de cosecha.
	Caña de Azúcar.	3 - 4	1 aplicación de 12 a 14 semanas antes de cosecha.

6. BENEFICIOS :

- Disminuye Mayor acumulación de reservas en raíces y madera para mejor brotación en frutales, berries y rosales.
- Translocación de azúcares a coronas de espárrago para mejorar la calidad de los turiones.
- Madurante no fitotóxico ni residual para caña de azúcar.

7. FORMULADOR :



INNOVAK GLOBAL

Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 Col. La Concordia C.P. 31375 Chihuahua, Chihuahua, México
Telf: +52(614) 436 0138 info@innovakglobal.com

Escuchamos ► Aprendemos ► Solucionamos



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 04

Fecha de emisión: 30 Marzo 2026



8. **DISTRIBUIDOR** :
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador.

Fin del documento