



¿QUÉ HACE?

Previene y corrige desórdenes fisiológicos como: fiebre de primavera, baya acuosa (waterberry), partidura de grano (hair line) y palo negro. Puede ser utilizado en frutas y hortalizas para una nutrición integral.

¿CÓMO LO HACE?

Los ácidos **ECCA Carboxy®** de tipo alifáticos de **Carboxy® Max** forman quelatos con N, K, Ca, Mg, B, de estabilidad intermedia, es decir, los protege de las barreras de la cutícula y epidermis, estableciendo la función clorofílica de las hojas acompañantes del fruto y permitiendo su fácil flujo a través de los tejidos de conducción y su eficaz ingreso a las células de los frutos y racimos.

BENEFICIOS:

- Evita pérdidas de rendimiento por desbalance de K, Ca, B al inicio de la etapa de floración en capsicum, papa, hortalizas, entre otros.
- Previene y corrige desórdenes del fruto como: baya acuosa (waterberry), partidura de grano (hair line), o fruta blanda.
- Disminuye la incidencia de fiebre de primavera y palo negro en vid.
- Respuesta rápida y prolongada.

CARACTERÍSTICAS:

FÍSICAS	
Olor	Característico
Forma	Líquido
Color	Café
Inflamable	No inflamable
Corrosividad	No corrosivo
QUÍMICAS	
pH	3.5 – 4.5 a 25°C
Densidad	1.42 – 1.52 g/cm ³ a 20 °C
Incompatibilidad	No mezclar con agentes oxidantes fuertes. No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.
GENERALES	
Almacenamiento	No exponer a temperaturas mayores a 80°C
Ambientales	No residual, de muy bajo impacto
Certificado Orgánico	No



Toxicidad	Ligeramente Tóxico
-----------	--------------------

RECOMENDACIONES DE USO:

Carboxy® Max está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

CULTIVO		DOSIS/ APLICACIÓN (L/ha)	Época y Número de aplicaciones
FRUTALES	Vid	2 – 3	Prevención de fiebre de primavera: 2 a 3 aplicaciones semanales iniciando en brotes de 10 a 20 cm.
		2 – 3	Prevención de desórdenes del fruto: 3 aplicaciones: - Baya de 3 a 5 mm - Baya de 15 a 17 mm - Inicio de envero (repetir si se presentan síntomas)
	Berries (Arándano, Cerezo)	1 - 2	- Desde brotación, de 2 a 3 aplicaciones quincenales. - Desde inicio de floración, de 2 a 3 aplicaciones quincenales.
	Palto, Duraznero, Cítricos, Peral, Manzano, Mango	2 – 3	Desde brotación, de 2 a 3 aplicaciones quincenales.
HORTALIZAS	Apio, Acelga, Lechuga, Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Papa, Melón, Pe- pino, Ajo, Frijol, etc.	1.5 – 2	Desde siembra o trasplante, de 2 a 3 aplicaciones quincenales.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

ESPECIFICACIONES:

Ácidos ECCA Carboxy®

expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total 21.9 g/L

Nitrógeno (N) 148.0 g/L



FICHA TÉCNICA

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby 254, Int. 306,

Santiago de Surco,

Lima – Perú.

ADAMA.COM/PERU/ES

Versión: 03

Fecha de emisión: 24-09-2025



Potasio (K ₂ O)	72.07 g/L
Calcio (CaO)	81.84 g/L
Magnesio (MgO)	25.90 g/L
Boro (B ₂ O ₃)	1.48 g/L

PROVEEDOR:



Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por Innovak Global S.A. de C.V.