

# Pendigan Strong<sup>®</sup> 400 SC

Wygrywa w pierwszej rundzie!

Sprawdzony i niezawodny herbicyd o szerokim zastosowaniu.



herbicyd

**NOWOŚĆ!**



ADAMA

## Pendigan Strong 400 SC

- ▶ jeszcze bardziej skoncentrowany,
- ▶ długotrwały efekt herbicydowy,
- ▶ ogranicza zachwaszczenie wtórne,
- ▶ wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych,
- ▶ doskonały partner do mieszanki zbiornikowej.

■ Pendigan Strong 400 SC dzięki pendimetalinie oddziałuje najskuteczniej na chwasty w okresie ich kiełkowania oraz podczas wschodów, dzięki czemu może być zastosowany doglebowo lub dolistnie.



## Pendigan Strong 400 SC – jeszcze bardziej skoncentrowany

Wysoka koncentracja substancji czynnej w litrze produktu niesie za sobą korzyści w postaci:

- ▶ oszczędności czasu przy przygotowaniu cieczy roboczej dzięki obniżonym dawkom produktu,
- ▶ oszczędności powierzchni magazynowej.

## Pendigan Strong 400 SC – długotrwały efekt herbicydowy

Okres połowicznego rozpadu pendimetaliny w glebie ( $DT_{50}$ ), czyli czas, w ciągu którego ilość substancji czynnej zmniejsza się o połowę, wynosi 64-86 dni. Oznacza to, że Pendigan Strong 400 SC pozostaje

skuteczny w glebie przez kilka tygodni, ograniczając zachwaszczenie wtórne poprzez oddziaływanie na chwasty później kiełkujące.



*chwastnica jednostronna*



*gwiazdnica pospolita*



*jasnota różowa*



*jasnota purpurowa*



*komosa biała*



*tasznik pospolity*



*miotła zbożowa*



*fiolatek polny*



*psianka czarna*



*szałłat szorstki*



*łoboda*



# Pendigan Strong 400 SC – wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych

**Pszenvica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime**

Termin stosowania: stosować jesienią, po wschodach zbóż od początku fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Zalecana dawka: 4 l/ha.

Pendigan Strong 400 SC 4 l/ha




Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych.

## Ziemniak

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Pendigan Strong 400 SC 3-4 l/ha














W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować Pendigan Strong 400 SC w mieszaninie zbiornikowej z Racer® 250 EC.

Zabieg wykonać na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, na wilgotną glebę.


Racer 250 EC 1,5 l/ha + Pendigan Strong 400 SC 2 l/ha



Uprawa	Termin stosowania	Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
 Kukurydza	wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha
 Marchew	po siewie, do fazy gdy kiełek przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior	przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu	3,0-4,0 l/ha
 Cebula uprawiana z siewu	wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liście przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Cebula uprawiana z dymki	wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki	3,0-4,0 l/ha
 Cebula szalotka uprawiana z siewu*	bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści	2,5-3,5 l/ha
 Czosnek*	bezpośrednio po sadzeniu ząbków, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12)	2,5-3,5 l/ha
 Brokuł*	od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady	3,0-4,0 l/ha
 Sorgo zwiste, proso zwyczajne*	doglebowo, do 3 dni po siewie, ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05)	3,5-4,0 l/ha
	po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)	
 Słonecznik zwyczajny*	wiosną po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)	4,0 l/ha
 Plantacje nasienne traw*	jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha

\*Uprawy małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pobierz aplikację  
Agro Porada



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com), [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)