

Mavrik VITA® 240 EW

Weż szkodniki na celownik!

 INSEKTYCYD



Zajestrowany w 20 uprawach!

Selektywnie zwalcza
szkodniki ssące i gryzące
w szerokim zakresie upraw.


ADAMA

Uprawa	Agrofag	Termin stosowania	Dawka/ha
Rzepak ozimy	chowacz brukwiaczek	gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęzli (BBCH 39)	0,2 l/ha
Rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska	słodyszek rzepakowy (zabieg zwalczający również chowacza czterozębego)	kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63)	0,2 l/ha
	chowacz podobnik, przyszcza kapustnik	w fazie rozwoju owoców (tuszczyń) tj. gdy od 10% do 80% tuszczyń osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78)	0,2 l/ha
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	mszyce jako wektory wirusów – zastosowanie jesienne	od 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30)	0,2 l/ha
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	mszyce – zastosowanie wiosenne	od pełni fazy kłoszenia do pełnej dojrzałości młecznicy (BBCH 55-75)	0,2 l/ha
Burak cukrowy	mszyca burakowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana	od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 10-49)	0,25 l/ha
	szarek komosnik	od fazy widocznych 2 liści buraka do fazy gdy powierzchnia liści buraka pokrywa 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35)	0,2 l/ha
Ziemniak	stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	na początku rozwoju pierwszych liści do fazy dojrzenia owoców, gdy jagody pierwszego owocostanu brązowieją (BBCH 10-85)	0,2 l/ha
Jabłoń, grusza	mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa.	od fazy pęknięcia pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74)	0,15-0,4 l/ha
Jabłoń, grusza, grusza azjatycka	kwiecień jabłkowiec	w fazie pęknięcia pąka, widoczne są zielone końce liściowe ostających kwiaty (BBCH 53)	0,15-0,2 l/ha
Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita	owocówka jabłkoweczka	od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79)	0,15 – 0,3 l/ha
Kalafior, brokuł zwyczajny,	mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tanioś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica	od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do fazy gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 10-39)	0,3 l/ha
Kapusta brukselska			0,2-0,3 l/ha
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona,		od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do osiągnięcia przez główkę typowej wielkości i kształtu (BBCH 10-49)	0,2-0,3 l/ha
Kalarepa			0,2l/ha

© zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ADAMA Polska Sp. z o.o.,

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska